

صبح جمعه
۸۷/۱۱/۲۵

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان منجذب آموزش کشور



آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۸

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
(کد ۱۳۱۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۲۰	۱	۳۰
۲	الودگی‌های محیط زیست	۲۰	۳۱	۶۰
۳	اکولوژی حیات وحش	۲۰	۶۱	۹۰
۴	شناخت و حمایت محیط زیست	۲۰	۹۱	۱۲۰
۵	ارزیابی محیط زیست	۲۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری	۲۰	۱۵۱	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The rise in unemployment was just a further ----- of the government's incompetence.
 1) inclination 2) approximation 3) modification 4) manifestation
- 2- The country's most valuable agricultural ----- include wheat and rice.
 1) revenues 2) attributes 3) proportions 4) commodities
- 3- These changes are a(an)----- to wide-ranging reforms.
 1) prelude 2) allocation 3) schedule 4) implication
- 4- Honesty is a very attractive character -----.
 1) trait 2) prospect 3) conviction 4) outcome
- 5- The driver was found guilty on ----- the speed limit.
 1) pursuing 2) enhancing 3) exceeding 4) surpassing
- 6- The members of the committee will be ----- on October 25.
 1) restoring 2) locating 3) convening 4) accompanying
- 7- The region needs housing which is strong enough to ----- severe wind and storms.
 1) object 2) recline 3) diminish 4) withstand
- 8- Two decades ----- between the completion of the design and the operation of the dam.
 1) overlapped 2) intervened 3) transferred 4) overwhelmed
- 9- The ----- goal of this research is to gather data on the process of first language acquisition.
 1) principal 2) successive 3) continual 4) insightful
- 10- Flexibility is ----- to creative management.
 1) intrinsic 2) compatible 3) forthcoming 4) contemporary

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The computer evolved from mechanical calculating machines that could do arithmetic by having cogs and levers that turned and moved (11) ----- numbers. The first one was built by the French inventor Blaise Pascal in 1642. Pascal's calculating machine was improved over the next 200 years, and in 1833 the British mathematician Charles Babbage designed a machine (12) ----- be "programmed" to carry out different mathematical operations. This machine was called the Analytical Engine. It (13) ----- to have the mechanical equivalent of the input, processing, memory, and output units found in today's electronic computers.

Over a hundred years (14) -----, in 1944, a mechanical computer, powered by electricity, was completed in the United States on Babbage's principle. (15) -----, in the previous year, the first electronic computer had been built in Britain. It was called Colossus and was used to crack enemy codes during World War II.

- | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 11- 1) representing | 2) to represent | 3) for representing | 4) from representing |
| 12- 1) which can | 2) that could | 3) where it can | 4) where it could |
| 13- 1) meant | 2) was meant | 3) had the meaning | 4) was the meaning |
| 14- 1) subsequent | 2) next | 3) later | 4) following |
| 15- 1) Since then | 2) Therefore | 3) However | 4) Afterwards |

PARDAZESH.PUB.COM
PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

As cold-blooded predators, crocodiles are lethargic, therefore survive long periods without food, and rarely need to actively go hunting. Despite their slow appearance, crocodiles are top predators in their environment, and various species have been observed attacking and killing sharks. A famous exception is the Egyptian plover which is said to enjoy a symbiotic relationship with the crocodile. According to unauthenticated reports, the plover feeds on parasites that infest the crocodile's mouth and the reptile will open its jaws and allow the bird to enter to clean out the mouth. Many large crocodilians swallow stones and they are believed to be of use in acting as ballast to balance their body. Other suggestions have been made that they may have a function similar to that of grit in birds, which is in crushing food. Salt glands are present in the tongues of most crocodylids and they have a pore opening on the surface of the tongue. They appear to be similar to those in marine turtles, however these seem to be absent in Alligatoridae. Crocodilians can produce sounds during distress and in aggressive displays. They can also hear well and the tympanic membranes are concealed by flat flaps that may be raised or lowered by muscles. Crocodiles are protected in many parts of the world, but they also are farmed commercially. Their hide is tanned and used to make leather goods such as shoes and handbags, whilst crocodile meat is also considered a delicacy. The most commonly farmed species are the Saltwater and Nile crocodiles. Farming has resulted in an increase in the Saltwater crocodile population in Australia, as eggs are usually harvested from the wild, so landowners have an incentive to conserve crocodile habitat.

- 16- It is stated in the passage that crocodiles are -----.
- very slow when hunting
 - extremely active predators
 - able to top sharks as predators
 - symbiotic with the Egyptian plover
- 17- The passage mentions that -----.
- crocodiles crush birds before eating them
 - crocodiles crush birds before eating them
 - salt glands open into a crocodile's mouth
 - plovers can live in a crocodile's inner mouth
- 18- We may understand from the passage that -----.
- crocodiles can produce distressed sounds
 - crocodiles are most numerous in Australia
 - crocodiles' skin is usually hidden to be tanned
 - crocodiles' ears are, in fact, hidden from view
- 19- The word 'they' in the passage (underlined) refers to -----.
- 'tongues'
 - 'salt glands'
 - 'crocodylids'
 - 'marine turtles'
- 20- The word 'display' in the passage (underlined) is best related to the word -----.
- 'show'
 - 'quarrel'
 - 'moment'
 - 'behaviour'

Nuisance wildlife management is the term given to the process of selective removal of problem individuals or populations of certain species of wildlife. Some species of wildlife may become habituated to man's presence causing property damage or risk transfer of disease to humans or pets. Many wildlife species coexist with humans very successfully. In fact, commensal rodents have become more or less dependent on people. Typically, species that are most likely to be considered a nuisance by humans have the following characteristics. First, they are adaptable to fragmented habitat. Animals such as Canada geese love ponds with low sloping banks leading to lush green grass. Unsurprisingly, humans love this sort of landscaping too. Thus it is perfectly understandable that Canada geese have thrived. Second, these animals are not tied to eating a specific type of food. For example, lynx do not thrive in human impacted environments because they rely so heavily on snowshoe hares. In contrast, raccoons have been incredibly successful in urban landscapes because they can live in attics, chimneys, and even sewers and can sustain themselves with food gained from trashcans. Third, successful animals must not pose a significant risk to human health and safety. Animals perceived as grave threats will incur the incredible ire of humans and be under constant threat of humans seeking their demise. Finally, successful animals in humanized landscapes are often perceived as cute, at least until they become so numerous that their preferential status becomes diminished. Many wildlife species have the potential of becoming a nuisance species. Whether or not a species becomes a pest can be directly correlated to the degree at which that animal can be tolerated by humans.

21- We understand from the passage that -----.

- 1) pets usually transfer dangerous diseases to humans
- 2) Canada geese are able to adapt to a fragmented habitat
- 3) species of rodents coexist very successfully with people
- 4) man's presence is quite habitual with species of wildlife

22- It is stated in the passage that -----.

- 1) geese feed on the green grass near the ponds
- 2) lynx is regarded as a common nuisance species
- 3) nuisance species can survive on a specific food
- 4) raccoons are not tied to eating a specific type of food

23- The passage points to the fact that -----.

- 1) nuisance species are not a very serious threat to human life
- 2) snowshoe hares are found only in compacted environments
- 3) food gained from trashcans can put human life at great risk
- 4) humans are normally after the extinction of nuisance species

24- The passage suggests that -----.

- 1) we don't often regard nuisance species as ugly
- 2) humanized landscapes are considered to be cute
- 3) a pest is a developed species of nuisance species
- 4) nuisance species have a great potential as wildlife

25- The word 'ire' in line 16 (underlined) is best related to -----.


- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| 1) 'pain' | 2) 'anger' | 3) 'threat' | 4) 'attention' |
|-----------|------------|-------------|----------------|

Warm water typically decreases the level of dissolved oxygen in the water. The decrease in levels of dissolved oxygen can harm aquatic animals such as fish, amphibians and copepods. Thermal pollution may also increase the metabolic rate of aquatic animals, as enzyme activity, resulting in these organisms consuming more food in a shorter time than if their environment were not changed. An increased metabolic rate may result in food source shortages, causing a sharp decrease in a population. Changes in the environment may also result in a migration of organisms to another, more suitable environment, and to in-migration of organisms that normally only live in warmer waters elsewhere. This leads to competition for fewer resources; the more adapted organisms moving in may have an advantage over organisms that are not used to the warmer temperature. As a result one has the problem of compromising food chains of the old and new environments. Biodiversity can be decreased as a result. It is known that temperature changes of even one to two degrees Celsius can cause significant changes in organism metabolism and other adverse cellular biology effects. Principal adverse changes can include rendering cell walls less permeable to necessary osmosis, coagulation of cell proteins, and alteration of enzyme metabolism. These cellular level effects can adversely affect mortality and reproduction. Primary producers are affected by warm water because higher water temperature increases plant growth rates, resulting in a shorter lifespan and species overpopulation. This can cause an algae bloom which reduces the oxygen levels in the water. The higher plant density leads to an increased plant respiration rate because the reduced light intensity decreases photosynthesis. This is similar to the eutrophication that occurs when watercourses are polluted with leached agricultural inorganic fertilizers.

- 26- It is stated in the passage that -----.
- 1) decreased levels of oxygen make for high temperature waters
 - 2) number of aquatic animals can depend on their metabolic rate
 - 3) thermal pollution does not always lead to food source shortages
 - 4) amphibians, fish and copepods are harmed by dissolved oxygen
- 27- The passage mentions that -----.
- 1) algae bloom may be the result of higher water temperatures
 - 2) warm aquatic environments affect the biodiversity adversely
 - 3) in-migration can only happen in thermal pollution conditions
 - 4) migrating organisms quickly adapt to high water temperatures
- 28- We may understand from the passage that -----.
- 1) oxygen levels in primary producers is an index of growth in warm waters
 - 2) higher growth rates alter the enzyme metabolism and balance of protein
 - 3) aquatic animals' cellular biology functions best at low temperatures
 - 4) speed of plant respiration is related to the amount of photosynthesis
- 29- Which of the following is NOT affected as a result of higher water temperature in water?
- 1) 'plant density'
 - 2) 'oxygen levels'
 - 3) 'eutrophication'
 - 4) 'plants' lifespan'
- 30- The word 'leached' in the passage is best related to the word -----.
- 1) 'consumed'
 - 2) 'dissolved'
 - 3) 'warmed'
 - 4) 'leaked'

- ۴۱- به فرآیندی که در آن از میکرووارگانیزم‌ها برای تجزیه و کاهش مواد آلاینده خاک استفاده می‌کنند چه می‌گویند؟
- ۴۲- غلظت بعضی از عناصر و ترکیبات در بدن موجودات زنده در امتداد زنجیره غذایی افزایش می‌یابد. به این پدیده چه می‌گویند؟
- ۴۳- ۱) تجزیه زیستی ۲) بزرگنمایی زیستی ۳) رشد ناهنجار بیولوژیکی ۴) یوتریفیکاسیون
- ۴۴- کدام یک از اکسیدهای نیتروژن خاصیت سمی بودن بیشتری را دارد هستند؟
- ۴۵- ۱) NO_x (۴) N₂O (۳) NO (۲) NO₂ (۱)
- ۴۶- در بحث پیرامون ذرات، کدام گروه از ذرات ذیل از نظر تأثیر بر سلامتی انسان بیشترین اهمیت را دارد؟
- ۴۷- ۱) PM_{2,5} (۴) PM₁₀ (۳) PM₅ (۲) PM_{2,5} (۱)
- ۴۸- کدام یک از آلاینده‌ها به خصوص در قصل تابستان برای بسیاری از انواع آبزیان سمی و خطرناک است؟
- ۴۹- ۱) فسفات‌ها ۲) گاز آمونیاک محلول در آب ۳) مواد آلی معلق ۴) یون آمونیوم
- ۵۰- کدام یک از آلاینده‌ها از نظر تأثیر بر سلامتی انسان‌ها، اثر هم بیشی دارد؟
- ۵۱- ۱) منواکسید ازت و دی‌اکسید کربن و دی‌اکسید کربن ۲) دی‌اکسید گوگرد و منواکسید ازت ۳) ذرات معلق و دی‌اکسید گوگرد
- ۵۲- هرگاه کاهش درجه حرارت اتمسفر نسبت به ارتفاع از سرعت کاهش آدیباپاتیک کمتر باشد، وضعیت ثبات و پایداری اتمسفر و در نتیجه پراکنش آلاینده‌ها چگونه خواهد بود؟
- ۵۳- ۱) تغییرات درجه حرارت اتمسفر تأثیری بر پراکنش آلاینده‌ها ندارد. ۲) اتمسفر باتبات و پایدار است و پراکنش آلاینده‌ها محدود می‌شود. ۳) اتمسفر بسیار بی ثبات است و پراکنش آلاینده‌ها به نحو مطلوبی انجام می‌پذیرد. ۴) اتمسفر بی ثبات است اما به دلیل کاهش درجه حرارت با افزایش ارتفاع، آلاینده‌ها به نحو مطلوب پراکنده نمی‌شوند.
- ۵۴- بیشترین ماده آلاینده که در نتیجه ترافیک وسایط نقلیه بنزینی و گازوئیلی به ترتیب وارد هوا می‌شوند کدام است؟
- ۵۵- ۱) NO_x-HC (۴) NO_x-CO (۳) HC-CO (۲) CO-NO_x (۱)
- ۵۶- بیشترین و تنها راه از بین بردن آلودگی نفتی در مناطق قطبی کدام روش است؟
- ۵۷- ۱) احتراق ۲) استفاده از مواد جاذب ۳) به تعليق در آوردن نفت ۴) تشکیل سدهای شیمیایی
- ۵۸- در پایش آلودگی هوا، کدام یک بعنوان PSI تعیین و اعلام می‌شود؟
- ۵۹- ۱) بالاترین PSI محاسبه شده برای یک آلاینده ۲) مجموع PSI‌های محاسبه شده برای آلاینده‌ها ۳) میانگین PSI‌های محاسبه شده برای آلاینده‌ها
- ۶۰- سمیت کدام یک از فرم‌های کروم (Cr) و آرسنیک (As) بیشتر است؟
- ۶۱- ۱) As(V), Cr(VI) (۴) As(III), Cr(VI) (۳) As(III), Cr(III) (۲) As(V), Cr(III) (۱)
- ۶۲- کدام یک از عناصر سنگین دارای ویژگی بزرگنمایی زیستی در زنجیره غذایی است؟
- ۶۳- ۱) آرسنیک ۲) سرب ۳) جیوه ۴) کروم
- ۶۴- بیشترین و مهمترین آلاینده‌های الی در اثر ترکیب مواد الی با کدام عنصر تشکیل می‌شوند؟
- ۶۵- ۱) فلزات سنگین ۲) فلورور ۳) گوگرد ۴) کلر
- ۶۶- سهم کدام یک از منابع در الودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی بیشتر است؟
- ۶۷- ۱) روان آب‌های شهری ۲) زه آب‌های کشاورزی ۳) فاضلاب‌های شهری ۴) فاضلاب‌های صنعتی
- ۶۸- در فرایند نیترات‌سازی، تبدیل نیتریت به نیترات به وسیله کدام گروه از میکرووارگانسیم‌ها انجام می‌گیرد؟
- ۶۹- ۱) باکتری‌های نیتروباکتر ۲) باکتری‌های ترموفیل ۳) باکتری‌های نیتروزوموناس ۴) باکتری‌های بی‌هوایی
- ۷۰- استعمال دخانیات در افزایش جذب کدام عنصر به وسیله بدن نقش دارد؟
- ۷۱- ۱) ارسنیک ۲) جیوه ۳) سرب ۴) کادمیوم
- ۷۲- میزان کل جامدات محلول (TDS) یک نمونه فاضلاب برابر $\frac{mg}{L}$ ۲۵۰۰ اندازه‌گیری شده است. این مقدار بیانگر غلظت در نمونه می‌باشد.
- ۷۳- ۱) مجموع آئیون‌ها ۲) مجموع کاتیون‌ها ۳) مجموع آئیون‌ها و کاتیون‌ها ۴) مجموع کاتیون‌های دو ظرفیتی
- ۷۴- حضور کدام یک از آلاینده‌ها در آب باعث تغییر طعم و مزه آن می‌شود؟
- ۷۵- ۱) نیترات ۲) الاینده‌های میکروبی
- ۷۶- هدف از ارایه استانداردهای کیفیت هوا تعیین کدام است؟
- ۷۷- ۱) PSI ۲) میزان حداقل نشر آلاینده‌ها
- ۷۸- کدام گاز ناشی از تجزیه زباله در قسمت‌های زیرین محل دفن بهداشتی متراکم می‌شود و چه تأثیری بر کیفیت آب‌های زیرزمینی دارد؟
- ۷۹- ۱) آمونیاک - افزایش اسیدیته و قلیانیت ۲) متان - افزایش مواد معدنی و سختی
- ۸۰- ۳) سولفید هیدروژن - ایجاد بو و طعم نامطبوع ۴) ارتفاع - دما
- ۸۱- جهت رسم نمودار وارونگی هوا دو پارامتر مورد نیاز به ترتیب از راست به چپ در دو محور افقی و عمودی کدامند؟
- ۸۲- ۱) ارتفاع - دما ۲) رطوبت - دما ۳) دما - ارتفاع ۴) دما - رطوبت

- کدام یک معیار لازم برای یک آفت‌کش خوب نیست؟ -۵۲
 ۱) انتخابی عمل کردن آن
 ۲) پایداری زیاد آن در محیط‌زیست
 ۳) عدم قابلیت تجمع آن در زنجیره غذایی
 ۴) پایداری کم آن در محیط‌زیست
- فعالیت‌های کدام یک از بخش‌های زیر موجب تولید آلوودگی‌های غیرمتصرکز (بی‌کانون) می‌شود؟ -۵۳
 ۱) کشاورزی
 ۲) صنعتی
 ۳) منازل و مسکن
 ۴) معادن
- کدام یک روشی مناسب‌تر برای حل مشکل زباله‌های شهری است؟ -۵۴
 ۱) جمع‌آوری و دفن زباله‌ها در زیر خاک
 ۲) ریختن آن‌ها در دره‌های عمیق و پرکردن آنها
 ۳) سوزاندن زباله‌ها در کوره‌های زباله‌سوز
 ۴) مدیریت در جهت کاهش میزان تولید زباله
- مقاومت کدام یک در برابر دی‌اکسید‌گوگرد (SO_2) بیشتر است؟ -۵۵
 ۱) صنوبر
 ۲) نرآد
 ۳) نوئل
 ۴) نمدار
- نقش کدام یک در کاهش آلوودگی نفتی دریا بیشتر است؟ -۵۶
 ۱) اشعه ماوراء بنفش
 ۲) افزایش میزان بارندگی
 ۳) میکروارگانیسم‌ها
 ۴) کاهش میزان بارندگی سالیانه
- عایق‌بندی حرارتی و کاهش تبادل هوا در منازل و اماکن بسته مهمترین عامل افزایش در آنها است. -۵۷
 ۱) دی‌اکسین
 ۲) رادون
 ۳) گاز کربنیک
 ۴) متان
- پان و ازن حاصل واکنش هیدروکربن‌ها و با کمک اشعه ماوراء بنفش خورشید در بالای جو است. -۵۸
 ۱) اکسیدهای کربن
 ۲) اکسیدهای گوگرد
 ۳) اکسیدهای سرب
 ۴) اکسیدهای نیتروژن
- زمینه فعالیت پروتکل کیوتو کدام است؟ -۵۹
 ۱) کاهش آلوودگی نفتی در دریاها
 ۲) مدیریت پایدار مواد زائد و جامد و دفع زباله‌ها
- کدام یک در کاهش پایداری آفت‌کش‌های موجود در خاک موثرتر است؟ -۶۰
 ۱) افزودن خاک رس
 ۲) افزودن مواد آلی
 ۳) شخم زدن زمین
 ۴) افزودن مواد آلی و معدنی به نسبت مساوی

- ۶۱ استفاده از کدام تله موثرترین روش برای صید پرنده‌گان آبزی و کنار آبزی محسوب می‌گردد؟
 Rocket net (۴) Mist net (۲) Drop net (۲) Clap net (۱)
- ۶۲ کدام مورد در تبدیل رانش ژنتیکی (Genetic drift) در جمیعت‌های کوچک بیشترین تأثیر را دارد؟
 (۱) سازش (Adaptation) (۲) برونو کوچی (Emigration) (۳) درون کوچی (Immigration) (۴) جهش (Mutation)
- ۶۳ اثر Allee چیست؟
 (۱) یک جمیعت فقط از چند فرد شکل گرفته و خلوص ژنتیکی بالایی دارد.
 (۲) بدیلیل کاهش تنوع ژنتیکی جمیعت، حساسیت به بیماری‌ها افزایش می‌یابد.
 (۳) کارکردهای اجتماعی در گونه‌های اجتماعی زی بدلیل کوچک شدن جمیعت دچار اختلال می‌گردد.
 (۴) گونه‌های همبوم برای کاهش رقابت با یکدیگر در آشیان بوم شناختی خود متخصص می‌شوند.
- ۶۴ پناه (Cover) برای حیات وحش به چه معنی است؟
 (۱) مکانی که طعمه خوار برای حمله سریع و غافلگیرانه در آنجا کمین می‌کند.
 (۲) مکانی که طعمه برای مخفی شدن یا در امان ماندن از طعمه خوار به آنجا می‌رود.
 (۳) مکانی که حیوان به کمک آن می‌تواند شرایط سخت آب و هوایی را پشت سریگذارد.
 (۴) هر عامل فیزیکی زیستگاه که بتواند هر یک از عملکردهای طبیعی حیوان را تأمین یا حمایت کند.
- ۶۵ کدام یک از شاخص‌های زیر به مفهوم تعداد گونه‌های موجود در یک مکان یا اکوسیستم می‌باشد؟
 (۱) Alpha diversity (۲) Beta diversity (۳) Gamma diversity (۴) تنوع گاما
- ۶۶ روش تجزیه و تحلیل فاکتوری آشیان اکولوژیک (ENFA) به کمک کدام نرم‌افزار قابل اجراست؟
 Ramas Ecolab (۴) SPSS (۳) Vortex (۲) Biomapper (۱)
- ۶۷ کدام یک از موارد زیر شرط نهایی در انتخاب زیستگاه برای گونه‌هایی است که به شکل دسته جمعی زادآوری می‌کنند؟
 (۱) مطلوبیت بالای زیستگاه (۲) حضور سایر افراد از همان گونه (۳) عدم حضور طعمه خواران به ویژه طعمه خواران زمینی (۴) دسترس پذیری به منابع غذایی فراوان برای تغذیه جوجهها
- ۶۸ بیشترین میزان تولید آب متابولیک در جانوران از اکسیداسیون کدام ماده بدست می‌آید؟
 (۱) چربی‌ها (۲) پروتئین (۳) کربوکسیدرانها (۴) نشاسته
- ۶۹ کدام یک از آزمون‌های زیر برای سنجش ناهمگنی واریانس‌ها بکار می‌رود؟
 (۱) بار تله (۲) کای مرربع (۳) همبستگی اسپیرمن (۴) کولموگروف - اسمیرنوف
- ۷۰ نسبت مساحت ۳ زیستگاه A، B و C برای گور در منطقه بهرام گور به ترتیب ۴۲٪، ۴۲٪ و ۴۰٪ است. کدام زیستگاه را ترجیح می‌دهد؟
 در ۳ زیستگاه یاد شده مذکور شمارش شدند. گور کدام زیستگاه را ترجیح می‌دهد؟
 (۱) C و A (۴) (۲) B (۳) C (۱) A (۲)
- ۷۱ در معادله لوتكا و ولترا، اثر رقابت گونه دوم بر گونه اول را با نشان می‌دهیم.
- ۷۲ الگوی مکانی توزیع جانداران در یک منطقه را می‌گویند.
 (۱) انتشار (Migration) (۲) توزیع (Dispersion) (۳) پراکندگی (Distribution)
- ۷۳ واحد نرخ قطعی رشد (λ) و واحد نرخ ذاتی رشد (۳) به ترتیب از راست به چپ عبارتند از:
 (۱) یک سال - یک سال (۲) یک سال - یک ماه (۳) یک سال - فاصله زمانی بین دو زادآوری
- ۷۴ در معادله رشد منطقی $\frac{dN}{dT} = rN(\frac{k-N}{k})$ در صورتی که N خیلی کوچک باشد (نزدیک به صفر)، شکل منحنی رشد به کدام یک از اشکال زیر نزدیکتر خواهد بود؟
- 
- ۷۵ رقابت درون گونه‌ای و بین گونه‌ای به ترتیب باعث و بهمنای آشیان بوم شناختی (Niche) گونه می‌گردد.
 (۱) افزایش س افزایش (۲) افزایش کاهش (۳) کاهش س افزایش (۴) کاهش کاهش
- ۷۶ با توجه به اصل جارمن بلکجه در کدام گروه از نشخوارکنندگان زیر بزرگتر است؟
 (۱) علف‌چرها (۲) میوه‌خوارها (۳) سرشاخه‌خوارهای انتخابی (۴) تغذیه کنندگان حد وسط (علف‌چر و سرشاخه‌خوار)

-۷۷ در صورتی که تراکم لانه‌های یک پرنده در سه زیستگاه یک منطقه متفاوت باشد، کدامیک از طرح‌های نمونه‌گیری زیر برآورد دقیق‌تری از تراکم لانه‌ها (که در واحدهای نمونه‌گیری شمارش می‌شوند) بدست خواهد داد؟

- (۱) تصادفی ساده (Cluster sampling) (۲) خوشای (Simple random sampling)

(۳) سیستماتیک (Systematic sampling) (۴) اشکوبندی شده تصادفی (Stratified random sampling)

-۷۸ کدامیک از پارامترهای زیر برای بدست آوردن تراکم حیوان براساس تراکم گروه‌های سرگین (که در پلات‌های تمیز شده تجمع یافته‌اند) ضروری است؟

- (۱) تعداد دفعات دفع در شباهه روز (۲) نرخ تجزیه گروه‌های سرگین

(۳) متوسط تعداد سرگین در یک گروه سرگین و تعداد دفعات دفع در شباهه روز


-۷۹ در صورتی که محدوده آشیان بوم شناختی (Niche) یک گونه (S_1) در داخل محدوده آشیان بوم شناختی گونه رقیب (S_2) باشد، با توجه به نمودار مقابل نتیجه رقابت چه خواهد شد؟

- (۱) گونه اول (S_1) گونه دوم (S_2) را از میدان بدر می‌کند.

(۲) گونه اول (S_1) می‌تواند در مناطقی که گونه دوم (S_2) حضور ندارد زندگی کند.

- (۳) گونه دوم (S_2) گونه اول (S_1) را از میدان بدر می‌کند.

(۴) هر دو گونه می‌توانند در محدوده آشیان بوم شناختی گونه دوم (S_2) حضور داشته باشند.



گرادیان محیطی

-۸۰ اگر فقط چند فرد از یک جمعیت به زیستگاهی جدید منتقل شوند نحوی که برقراری ارتباط آنها با سایر جمعیت‌ها غیر ممکن شود، کدامیک از موارد زیر بروز خواهد نمود؟

- (۱) اثر علی (Allee effect) (۲) اثر بروس (Bruce effect)

(۳) اثر حاشیه (Edge effect) (۴) اثر بنیان‌گذار (Founder effect)

-۸۱ بنیان‌گذار علم زیست‌شناسی حفاظت چه کسی است؟

- (۱) جان التون (۲) جمیز هاتون

در مورد پرنده‌گانی مثل گاو چرانک که از انگل‌های بیرونی سمداران تغذیه می‌کنند کدامیک از روابط زیر صدق می‌کند؟

- (۱) انگلی (۲) رقابتی (۳) همیاری (۴) همسفرگی

-۸۲ کدامیک از تله‌های زیر کشنده است؟

- (۱) Tomahawk (۲) Sherman (۳) Havahart (۴) Conibear

-۸۳ در روش کلداال میزان نیتروژن موجود در یک ماده غذایی $4/5$ گرم محاسبه شده است. مقدار پروتئین موجود در آن حدوداً چند گرم است؟

- (۱) ۲۵/۰ (۲) ۲۱/۵ (۳) ۲۸/۱ (۴) ۲۶/۵

-۸۴ کدامیک از موارد زیر معرف اصل جابجایی صفات (Character displacement) است؟

- (۱) طول منقار دو گونه پرنده هنگام همجایی (Sympatry) متفاوت و هنگام دگر جایی (Allopatry) مشابه است.

(۲) رنگ دو گونه حلوون هنگام همجایی (Sympatry) مشابه و هنگام دگر جایی (Allopatry) متفاوت است.

- (۳) طول منقار دو گونه پرنده هنگام همجایی (Sympatry) مشابه و هنگام دگر جایی (Allopatry) متفاوت است.

(۴) رنگ دو گونه حلوون هنگام همجایی (Sympatry) متفاوت و هنگام دگر جایی (Allopatry) مشابه است.

برای محاسبه حدود اعتماد میانگین یک برآورد، به کدام گروه از داده‌های زیر نیاز است؟

- (۱) میانه و انحراف استاندارد (۲) مقدار ۱ از جدول و اشتباہ معیار

(۳) مقدار F از جدول و انحراف استاندارد

-۸۵ مفهوم آشیان بوم شناختی بنیادی (Fundamental Niche) به کدامیک از پارامترهای دموگرافیک زیر نزدیک‌تر است؟

- (۱) R_m (۲) N_o (۳) T (۴) r_m

-۸۶ در شرایط مشابه اندازه آشیان بوم شناختی (Niche) یک گونه در کدامیک از محیط‌های مشخص شده در زیر می‌تواند کوچکتر باشد؟

- (۱) ناپایدار (۲) غیرقابل پیش‌بینی

-۸۷ در کدامیک از روش‌های برآورد جمعیت زیر هر حیوان صید شده باید دارای نشانه ویژه باشد؟

- (۱) Mark - resighting (۲) Jolly-Seber (۳) Schnabel (۴) Petersen

-۸۸ تراکم گروه‌های سرگین شوکا در یک منطقه ۱۰ کیلومتر مربعی ۶ گروه در 100×100 متر مربع برآورد شده است. در صورتی که مدت زمان تجمع

گروه‌های سرگین در پلات‌های تمیز شده ۲ ماه و تعداد دفعات دفع در یک شباهه روز ۲۰ بار باشد، فراوانی شوکا در این منطقه چقدر است؟

- (۱) ۱۲۰ (۲) ۱۵۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۱۵۰۰

-۹۱

نقش بوم‌شناختی وجود درختان دار خشک در داخل جنگل کدام است؟

۱) افزایش تنوع زیستی جانوران

۲) کاهش زادآوری و تجدید حیات طبیعی

بالاترین میزان مصرف و هدرروی آب مربوط به کدام بخش است؟

۱) آب شرب ۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۹۲

Upnlittoral (۴) Supralittoral (۳)

Eulittoral (۲)

Epilittoral (۱)

۲) نجاری

-۹۳

۳) صنعت

۴) کشاورزی

۱) آب شرب

-۹۴

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۹۵

۱) آب شرب

-۹۶

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۹۷

۱) آب شرب

-۹۸

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۹۹

۱) آب شرب

-۱۰۰

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۰۱

۱) آب شرب

-۱۰۲

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۰۳

۱) آب شرب

-۱۰۴

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۰۵

۱) آب شرب

-۱۰۶

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۰۷

۱) آب شرب

-۱۰۸

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۰۹

۱) آب شرب

-۱۱۰

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۱۱

۱) آب شرب

-۱۱۲

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۱۳

۱) آب شرب

-۱۱۴

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۱۵

۱) آب شرب

-۱۱۶

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۱۷

۱) آب شرب

-۱۱۸

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۱۹

۱) آب شرب

-۱۲۰

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۲۱

۱) آب شرب

-۱۲۲

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۲۳

۱) آب شرب

-۱۲۴

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۲۵

۱) آب شرب

-۱۲۶

۲) تجارتی

۳) صنعت

۴) کشاورزی

-۱۲۷

- گونه‌های گیاهی سازگار با شوری خاک را گویند.
- ۱) اپیفیت ۲) هالوفیت ۳) تالوفیت ۴) کرزوفیت
- نتیجه عمل فتوسنتز در گیاهان سبز در اتمسفر است.
- ۱) افزایش میزان CO_2 ۲) کاهش میزان O_2 ۳) افزایش میزان NO_2
- حفاظت و حمایت از محیط‌زیست دریایی در برابر آلودگی از وظایف کدام کنوانسیون است؟
- ۱) کویت ۲) تنوع زیستی ۳) تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر
- کدام یک گسترده‌ترین زیستگاه محسوب می‌شود؟
- ۱) آبهای سور ۲) آبهای شیرین ۳) زیرزمینی ۴) خاکی
- اگر نرخ رشد یک جمعیت به میزان ۵ درصد کاهش یابد، زمان دو برابر شدن آن جمعیت چه تغییری می‌کند؟
- ۱) به نصف کاهش می‌یابد. ۲) تغییری نمی‌کند. ۳) دو برابر می‌شود. ۴) چهار برابر می‌شود.
- تشکیل ذخیره گاه بیوسفری با شکل گیری کدام یک از سازمان‌های بین‌المللی همراه بود؟
- ۱) FAO ۲) MAB ۳) IUCN ۴) UNDP
- کدام یک موجب حفظ پایداری و تنوع در اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی می‌شود؟
- ۱) آتش‌سوزی طبیعی ۲) بذرپاشی و گوددهی ۳) حذف گونه‌های خوش خوراک ۴) جلوگیری کامل از ورود دام
- کدام یک به عنوان اساس پایداری اکوسیستم‌ها محسوب می‌شود؟
- ۱) مدیریت نهاده‌های ورودی و خروجی از اکوسیستم به وسیله انسان ۲) بزرگی و وسعت اکوسیستم ۳) تغیرات آب و هوای در محدوده اکوسیستم

- ۱۲۱- ارزیابی چند متغیره کامپیوتروی و یا همان MCE یک روش است و برای مناسب است.
- (۱) سیستمی، ارزیابی آبها
 - (۲) مختص استرالیا، ارزیابی جنگل‌ها
 - (۳) سیستمی، مناطق متعدد بوم‌شناختی
 - (۴) غیرسیستمی، ارزیابی حداکثر نیمی از ایران برای کاربری‌های کلان بطور جداگانه
- ۱۲۲- در تعیین تناسب یک یگان محیط‌زیستی برای آبزی پروری گدام یک از عوامل زیر مهم‌ترند؟
- (۱) ارتفاع، سنگ مادر
 - (۲) جهت دامنه، ارتفاع
 - (۳) شیب، سنگ مادر
 - (۴) پوشش گیاهی، سنگ مادر
- ۱۲۳- در ارزیابی بیشتر به گدام یک از موضوعات زیر بهداشت می‌شود؟
- (۱) ساختار اکوسیستم
 - (۲) عملکرد اکوسیستم
 - (۳) فرایندهای اکولوژیک
 - (۴) فرایندهای اکولوژیک و عملکرد اکوسیستم
- ۱۲۴- در ارزیابی کلی هم زمان ۲۰ استان ایران برای کاربری‌های مختلف از گدام روش استفاده می‌کنیم؟
- (۱) دو عامله
 - (۲) فقط از پوشش گیاهی به عنوان مبنای ارزیابی
 - (۳) چند عامله براساس منابع کلیدی و شاخص
- ۱۲۵- دورکاوی و GIS در ارزیابی محیط‌زیست به ترتیب چه نقشی دارند؟
- (۱) مدیریت - منبع تامین داده‌ها
 - (۲) مدیریت - ادغام نقشه‌ها
 - (۳) منبع تامین داده‌ها - تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات
 - (۴) منبع تامین داده‌ها - ادغام نقشه‌ها
- ۱۲۶- وجود گونه آندمیک در یک منطقه اولویت گدام کاربری زیر را بیشتر می‌کند؟
- (۱) جنگلداری
 - (۲) حفاظت
 - (۳) کشاورزی
 - (۴) مرتعداری
- ۱۲۷- واحد کاری در منابع طبیعی برای ارزیابی محیط‌زیست گدام است؟
- (۱) سامان عرفی
 - (۲) حوزه آبخیز
 - (۳) محدوده شهرستان
 - (۴) محدوده حفاظت شده
- ۱۲۸- دفتر آمایش سرزمین برای اولین بار در گدام سازمان و در چه سالی ایجاد شد؟
- (۱) سازمان برنامه و بودجه - ۱۳۵۳
 - (۲) سازمان برنامه و بودجه - ۱۳۶۵
 - (۳) سازمان حفاظت محیط‌زیست - ۱۳۵۳
 - (۴) سازمان حفاظت محیط‌زیست - ۱۳۶۵
- ۱۲۹- از مدل رقومی ارتفاع می‌توان نقشه را بدست آورد.
- (۱) تراکم آبراهه‌ها
 - (۲) تراکم چشممه‌های منطقه
 - (۳) زیستگاه حیات وحش
 - (۴) سنگ‌شناصی منطقه
- ۱۳۰- اگر فاصله منحنی‌های میزان بر روی زمین ۴۰ متر و مقیاس نقشه $\frac{1}{50000}$ باشد، شیب ۵ تا ۱۵ درصد بر روی نقشه چند میلی‌متر خواهد بود؟
- (۱) بیش از ۱۶
 - (۲) بین ۱۶ و ۵۲
 - (۳) بین از ۱۶ و ۵۲
 - (۴) بین ۵۲ و ۱۶
- ۱۳۱- در ارزیابی چند متغیره کامپیوتروی (MCE) یک منطقه ۱۰۰ هزار هکتاری برای جنگلداری با ابعاد ۱۰۰ ستون و ۱۰۰ ردیف استفاده شده است. در این صورت حداکثر پس از ترکیب شیب ۷ طبقه‌ای و ارتفاع ۸ طبقه‌ای چند قطعه جهت ارزیابی خواهیم داشت؟
- (۱) ۵۶۰۰۰
 - (۲) ۱۰۰۰۰۰
 - (۳) ۵۶۰۰
 - (۴) ۱
- ۱۳۲- روش شبکه‌ها برای ارزیابی به روش مناسب است.
- (۱) ترکمن صحرا، کامپیوتروی
 - (۲) سلسله کوه‌های زاگرس، دسته
 - (۳) کل ایران، کامپیوتروی
 - (۴) نیمرخ شمالی البرز، کامپیوتروی
- ۱۳۳- برای تهیه نقشه طبقات شیب محدوده شهرستان تهران نیاز به نقشه توپوگرافی با مقیاس داریم.
- (۱) $\frac{1}{5000}$
 - (۲) $\frac{1}{50000}$
 - (۳) $\frac{1}{100000}$
 - (۴) $\frac{1}{250000}$
- ۱۳۴- در گام اول ارزیابی به روش دستی، منابع براساس انتخاب و نقشه‌سازی می‌شوند.
- (۱) ایجاد حساسیت برای اکوسیستم‌های ارزشمند، تعیین کنندگی میزان توسعه
 - (۲) تأثیرگذاری بر تناسب و یا حساسیت و جداسازی اکوسیستم‌ها
 - (۳) قابلیت مدیریت، موجود بودن منابع نقشه‌ای، هزینه
 - (۴) عدم همبستگی، تناسب برای جنگلداری و حفاظت و توسعه
- ۱۳۵- با گدام یک از روش‌های زیر می‌توان ارزش پدیده‌های موجود در یک نقشه را از طریق عملیات ریاضی به طور یکسان تغییر داد؟
- (۱) ایجاد حاشیه
 - (۲) روی هم گذاری
 - (۳) تبدلات
 - (۴) توابع Scaler
- ۱۳۶- در لایه‌های اطلاعاتی برداری، اطلاعات توصیفی کجا ذخیره می‌شوند؟
- (۱) پیکسل‌ها
 - (۲) پایگاه داده
 - (۳) فراداده
 - (۴) لایه‌های برداری فاقد اطلاعات توصیفی هستند.
- ۱۳۷- برای مطالعات چند مقیاسی گدام یک از داده‌های ماهواره‌ای زیر مناسب است؟
- (۱) MSS
 - (۲) NOAA
 - (۳) Aster
 - (۴) Liss III
- ۱۳۸- نقشه تراکم درصد پوشش گیاهی با ۳ طبقه تراکمی کم، متوسط و زیاد نشان دهنده چه نوع داده‌ای می‌باشد؟
- (۱) نسبی
 - (۲) فاصله‌ای
 - (۳) اسامی
 - (۴) رتبه‌ای
- ۱۳۹- به صحت موقعیت یک پدیده بر روی نقشه در مقایسه با موقعیت روی زمین چه گفته می‌شود؟
- (۱) صحت هندسی
 - (۲) صحت موضوعی
 - (۳) همسانی
 - (۴) مقیاس

-۱۴۰

- کدام یک از ویژگی‌های مدل‌های اکولوژیک ایران هستند؟
 ۱) برای ارزیابی یک عامله ساخته شده‌اند.

۲) طبقه‌بندی توان سرزمین براساس شرایط محلی است.

۳) مدل‌های اکولوژیک فقط توان سرزمین را نشان می‌دهند و سرزمین را طبقه‌بندی نمی‌کنند.

۴) بودن چند رخداد در واحد زیست محیطی نشان داشتن توان سرزمین برای کاربری مورد نظر است.

-۱۴۱

در مدل اکولوژیک توسعه شهری و روستایی اولویت کدام پارامتر از سایرین بیشتر است؟

- ۱) ارتفاع از سطح دریا ۲) پوشش گیاهی ۳) سرعت باد ۴) هیدرولوژی

-۱۴۲

مطابق مدل ارزیابی توان اکولوژیک چنانچه جهت جغرافیایی و آب با طبقه ۲ تفرج مرکز مطابقت داشته باشد و شیب و خاک با طبقه ۱ تفرج

- ۱) تفرج مرکز طبقه ۱ ۲) تفرج گسترده طبقه ۲ ۳) تفرج گسترده طبقه ۱ ۴) تفرج گسترده طبقه ۲

-۱۴۳

کدام گروه از فعالیت‌ها تماماً جزو تفرج مرکز محسوب می‌شوند؟

- ۱) اردوزدن، کوه نورده، ماهیگیری، شکار ۲) اسب‌سواری، ماهیگیری، شکار

- ۳) کوهنوردی، خورگشی، شکار ۴) کوهنوردی، خورگشی، شکار

-۱۴۴

حساسترین سنگ نسبت به فرسایش کدام مورد است؟

- ۱) گرانیت ۲) مارن ۳) ماسه سنگ ۴) سنگ رس

-۱۴۵

نقشه یگان‌های زیست محیطی از تلفیق کدامیک از منابع زیر بدست می‌آیند؟

- ۱) منابع اکولوژیکی ۲) منابع فیزیکی ۳) منابع زیست محیطی

-۱۴۶

روش ایان مک هارگ کدام یک از روش‌های ارزیابی را در بر می‌گیرد؟

- ۱) ارزیابی یک عامله ۲) ارزیابی دو عامله ۳) ارزیابی چند عامله

-۱۴۷

زمین سیما بیان فیزیکی کدام سطح از تنوع زیستی است؟

- ۱) تنوع ژنتیکی ۲) تنوع گونه‌ای ۳) تنوع اکوسیستمی

-۱۴۸

حداقل مساحت یگان‌های زیست محیطی در یک مطالعه با مقیاس $\frac{1}{100,000}$ چند هکتار خواهد بود؟

- ۱) ۱۰ ۲) ۲۵ ۳) ۵۰ ۴) ۱۰۰

-۱۴۹

در ارزیابی محدوده شهرستان نور برای کاربری دفن زباله کدام یک از عوامل زیر مهم‌ترند؟

- ۱) ارتفاع، جهت، پوشش گیاهی ۲) شیب، پوشش گیاهی، ارتفاع ۳) شیب، جهت، ارتفاع

-۱۵۰


مطابق اصول جبر بولین، کدام گزینه با وضعیت شکل مقابل هماهنگی دارد؟

- A or B or C (۱)

- A and B and C (۲)

- A not B not C (۳)

- A xor B xor C (۴)



- ۱۵۱ - کدام یک از گونه‌های زیر در زیر راسته *Ruminantia* قرار دارد؟
 ۱) در پهنه و ساقه شاهپرها اولیه و ثانویه
 ۲) در حاشیه خارجی و حاشیه داخلی انتهای شاهپرها اولیه
 ۳) در حاشیه داخلی و حاشیه خارجی انتهای شاهپرها اولیه
 ۴) کدام یک از خانواده‌های زیر در زیر راسته *Ruminantia* قرار دارد؟
 Suidae (۴) Camelidae (۲) Giraffidae (۲) Equidae (۱)
- ۱۵۲ - کدام یک از موارد زیر معمولاً در پرندگان صحیح است؟
 ۱) گلbul های قرمز خون دارای هسته و ماده‌ها دارای تخمدان و تخم راهه چپ هستند.
 ۲) گلbul های قرمز خون فقد هسته و ماده‌ها دارای تخمدان و تخم راهه چپ هستند.
 ۳) مثانه معمولاً موجود نیست و ماده‌ها دارای تخمدان و تخم راهه راست هستند.
 ۴) مثانه معمولاً موجود و گلbul های قرمز خون دارای هسته هستند.
- ۱۵۳ - استخوان‌های *Metapodials* در کدام گروه از پستانداران زیر بیش از بقیه طویل شده است?
 ۱) پنجه رو (Digitigrade)
 ۲) سم رو (Unguligrade)
 ۳) کف رو (Plantigrade)
 ۴) نیمه پنجه رو (Semi-digitigrade)
- ۱۵۴ - کدام یک از گونه‌های زیر در مناطق دشتی تر و با پوشش (پناه) کمتر دیده می‌شود?
 ۱) آهوی ایرانی
 ۲) گور ایرانی
 ۳) مرال
 ۴) نر آلفا
- ۱۵۵ - در یک گروه گرگ، غالباًترین فرد کدام است?
 ۱) نر بتا
 ۲) ماده بتا
 ۳) ماده آلفا
 ۴) اولین دندان آسیا در آرواره بالا و پایین
- ۱۵۶ - دندان‌های گوشت بر (Carnassial) شامل کدام دندان‌ها می‌گردند?
 ۱) آخرین دندان پیش آسیا در آرواره بالا و پایین
 ۲) اولین دندان آسیا در آرواره بالا و پایین
 ۳) آخرین دندان پیش آسیا در آرواره بالا و اولین دندان آسیا در آرواره پایین
 ۴) اولین دندان آسیا در آرواره بالا و آخرین دندان پیش آسیا در آرواره پایین
- ۱۵۷ - ظرفیت دریافت نور از نسبت به چشم محاسبه شده و برای پرندگان شب پرواز این ظرفیت است.
 ۱) مساحت شبکیه - مساحت قرنیه - بالا
 ۲) مساحت قرنیه - مساحت شبکیه - بالا
 ۳) مساحت قرنیه - مساحت شبکیه - پایین
 ۴) مساحت شبکیه - مساحت قرنیه - پایین
- ۱۵۸ - کدام یک از گربه‌سانان زیر با محیط‌های آبی سازش یافته‌تر است?
 ۱) پلنگ
 ۲) ببر
 ۳) گربه پلاس
 ۴) گربه جنگلی
- ۱۵۹ - کدام یک گستره خانگی (Home range) وسیع‌تری دارد?
 ۱) شاه روباه
 ۲) شغال
 ۳) روباه شنی
 ۴) گرگ
- ۱۶۰ - کوچکترین گله‌ها مربوط به کدام است?
 ۱) آهو
 ۲) بز و پازن
- ۱۶۱ - از نظر تکاملی کدام به سگ‌سانان نزدیک‌تر است?
 ۱) پلنگ
 ۲) بز و پازن
 ۳) شوکا
- ۱۶۲ - کدام گونه از نظر ساختمان دستگاه گوارش با بقیه متفاوت است?
 ۱) بز و پازن
 ۲) شوکا
- ۱۶۳ - کدام گونه بیشتر از مواد گیاهی تغذیه می‌کند?
 ۱) خرس قهوه‌ای
 ۲) روباه معمولی
- ۱۶۴ - غدد تولید بو در سعداران در چه محل‌هایی قرار گرفته است?
 ۱) پشتی - شکمی
 ۲) پیش چشمی - بین سمی
 ۳) پشتی - بین سمی
 ۴) شکمی - پیش چشمی
- ۱۶۵ - کدام یک از گونه‌های زیر در مناطق با تنوع زیستگاهی بیشتری دیده می‌شود?
 ۱) پلنگ
 ۲) روباه شنی
 ۳) خرس
- ۱۶۶ - چه سازگاری در شکل تخم و شکل آشیانه پرندگان مناطق دشتی خشک و نیمه خشک شکل گرفته است?
 ۱) تخم‌ها سفید و آشیانه کاسه‌ای متراکم از خار و خاشاک در بوته‌های انبوه می‌باشد.
 ۲) تخم‌ها تیره رنگ و آشیانه درون سوراخ‌های جوندگان بنا می‌شود.
 ۳) تخم‌ها سفید با لکه‌های روشن فراوان و در زیر سنگها و بوته‌ها بنا می‌شود.
 ۴) رنگ‌آمیزی روی تخم شبیه به قلوه سنگ‌ها و آشیانه چاله‌ای کوچک با مواد و مصالح بسیار اندک است.
- ۱۶۷ - چند جمعیت از اردک سرسفید (*Oxyura leucocephala*) در جهان وجود دارد و جمعیت ایران جزو کدام یک از آنهاست?
 ۱) ۳ جمعیت - جمعیت آسیایی
 ۲) ۴ جمعیت - جمعیت آسیایی
 ۳) ۳ جمعیت - جمعیت آسیایی
 ۴) ۴ جمعیت - جمعیت آسیایی
- ۱۶۸ - در کدام پرنده زیر نیم نوک بالایی متحرک است و غذا را به درون دهان می‌ریزد?
 ۱) پلیکان سفید
 ۲) فلامینگو
 ۳) کفچه نوک
 ۴) اردک نوک بین

- ۱۷۰- بین کدام زیر گونه‌های قرقاول (*Phasianus colchicus*) در نوار شمالی ایران گزارش‌های مشکوکی از بروز هیبریداسیون وجود دارد؟
 P.c. persicus × P.c. talischensis (۲) P.c. principalis × P.c. colchicus (۱)
 P.c. colchicus × P.c. talischeusis (۴) P.c. persicus × P.c. principalis (۳)
- ۱۷۱- منطقه جغرافیای جانوری Holoarctic شامل کدام یک از مناطق جغرافیایی زیر می‌گردد؟
 Oriental و Palearctic (۴) Oriental و Australian (۳) Palearctic و Nearctic (۲) Australian و Nearctic (۱)
- ۱۷۲- کامل‌ترین نوزاد در کدام گروه از پستانداران زیر بدنیا می‌آید؟
 Prototheria (۴) Monotremata (۳) Metatheria (۲) Eutheria (۱)
- ۱۷۳- کدام گونه زندگی انفرادی دارد؟
 (۱) روباه معمولی (۲) قوچ و میش
 (۳) گرگ (۴) یوز
- ۱۷۴- کدام یک از پرنده‌گان زیر قبل از پرواز کمی روی آب می‌دوند؟
 (۱) اردک سرخنایی و فیلوش (۲) خوتکا و اردک سرخنایی
- ۱۷۵- غدد نمکی در کدام پرنده رشد بیشتری دارد؟
 (۱) اگرت کوچک (۲) باکلان
- ۱۷۶- انگشتان پا در کدام یک از گونه‌های زیر زرد رنگ است و با رنگ پاهای تباين دارد؟
 (۱) اگرت کوچک (۲) حواصیل ارغوانی
 (۳) حواصیل خاکستری (۴) گاو چرانک
- ۱۷۷- به کدام یک از پرهای زیر، پرهای دهانی گفته می‌شود؟
 (۱) رشته پر (۲) شاهپر
 (۳) کرک پر (۴) موی پر
- ۱۷۸- با توجه به پراکنش جغرافیایی و زیستگاه، کدام گروه از گونه‌های زیر می‌توانند با هم در یک منطقه حضور داشته باشند؟
 (۱) تیهو، خرس سیاه، گراز، کبک چیل
 (۲) مرا، کبک چیل، خرس قهوه‌ای، شاه روباه
 (۳) حشره‌خوار کوتاه (۴) هوبره
- ۱۷۹- روده کوچک در پرنده‌گان است.
 (۱) گیاه خوار کوتاه (۲) گوشت خوار بلند
- ۱۸۰- جوجه‌های کدام پرنده زودرس (Precocial) است?
 (۱) بحری (۲) کبوتر چاهی