


# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد



۲۴۵

245

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

عصر پنج شنبه  
۹۵/۰۲/۱۶جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»  
امام خمینی (ره)

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۵

### مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – کد ۱۲۸۵

مدت یاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۵

#### عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	سینتیک و طراحی راکتور	۱۵	۲۱	۴۵
۳	پدیده‌های انتقال (انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)	۲۰	۴۶	۶۵
۴	بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی	۲۰	۶۶	۸۵
۵	ترمودینامیک	۲۰	۸۶	۱۰۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص خلیلی و خلوقی تنها با مجوز این سازمان عجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات دخالت می‌شود.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- This evening's meeting is one in which important issues would be discussed; your attendance is -----.  
1) obligatory      2) didactic      3) relevant      4) explicit
- 2- After a long ----- between the former husband and wife over the custody of the child, the court finally decided to grant the custody to the mother.  
1) contradiction      2) cruelty      3) squabble      4) hesitation
- 3- In Australia, animals are reared on crop residue. Without the animals, these residues would have to be ----- by other means before another crop can be grown—often by burning.  
1) deprived of      2) disposed of      3) resorted to      4) alluded to
- 4- Unable to ----- the tyrannical rules and regulations at the hostel, young Vivian thought of escaping in the dark of the night.  
1) scold      2) acclaim      3) bear      4) treat
- 5- Why do some animals, such as humans, ----- to sleep, whereas others, such as elephants and giraffes, stand?  
1) require      2) snore      3) set up      4) lie down
- 6- With sixteen victories in a row, the Australian cricket team was looking quite unassailable, but they were finally ----- at the hands of the Indians.  
1) dispersed      2) vanquished      3) confronted      4) disregarded
- 7- The salesboy tried to persuade the old man to buy goods from him, but had to give up when the old man told him ----- that he would not buy anything from him.  
1) arbitrarily      2) haphazardly      3) unequivocally      4) necessarily
- 8- But he had become ----- to the rush and whirr of missiles, and now paid no heed whatever to them.  
1) inured      2) rendered      3) constrained      4) affirmed
- 9- The judge openly associated with racist organizations; nevertheless, he showed no ----- in his decisions during his career.  
1) uniqueness      2) dexterity      3) gratitude      4) prejudice
- 10- I don't have any explanation for his ----- behavior at last night's party, though I'm sure that he is quite apologetic about it.  
1) credible      2) resolute      3) distinct      4) bizarre

## PART B: Cloze Passage

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Where do such creative sparks come from? How can we conjure them whenever we want? And why can that be (11) ----- anyway? A complete understanding isn't here yet, (12) ----- neuroscientists are already on the trail of (13) ----- . They also have some good news for each of us (14) ----- to ignite those inventive fires. As it turns out,

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳

245F

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

(15) ----- our own muse may be easier than we think, especially if we learn to make a habit of it.

- |     |                                                                              |                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 11- | 1) infernally difficult so to do<br>3) difficult infernally to do so         | 2) so infernally difficult to do<br>4) to do so infernally difficult            |
| 12- | 1) in spite of      2) however                                               | 3) nonetheless      4) but                                                      |
| 13- | 1) where and how does creativity arise<br>3) where and how creativity arises | 2) creativity how and where it arises<br>4) creativity does arise where and how |
| 14- | 1) who has ever struggled<br>3) have ever struggled                          | 2) struggled ever<br>4) ever to struggle                                        |
| 15- | 1) we tap      2) when we tap                                                | 3) and taps      4) tapping                                                     |

## PART C: Reading Comprehension:

**Directions:** Read the following four passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

### PASSAGE 1:

Genetics is the study of mechanisms of the hereditary process. Modern genetics began with the experiments of Gregor Mendel in 1865. He studied the inheritance of different factors in peas, and found that some traits were "dominant" and some "recessive", the "dominant" appearing in a ratio of very nearly three to one. Mendel's results were ignored for many years until their discovery at the beginning of the twentieth century.

- 16- According to the passage -----.
- 1) modern genetics owes very little to Mendel's experiments
  - 2) the purpose of Mendel's experiments was primarily agricultural
  - 3) the mechanisms of heredity were known prior to Mendel
  - 4) genetics is essentially concerned with heredity
- 17- Clearly, in the field of genetics, -----.
- 1) Mendel is the pioneer
  - 2) certain traits have been given too much importance
  - 3) Mendel's experiments have received and used attention
  - 4) new dominant and recessive traits are constantly being discovered
- 18- Mendel discovered that -----.
- 1) recessive traits exceeded the dominant ones
  - 2) in peas, nearly one-third of the traits were dominant
  - 3) in peas, dominant traits appear in a ratio of three to one
  - 4) by 1865 the theory of heredity had been convincingly formulated

### PASSAGE 2:

Although the term "biotechnology" has been in existence for a considerable time since it was first used in 1919, and again in 1938, the term was only recognized much later. Probably the first recognition by the wider scientific community was with the publication of the Journal of Biotechnology and Bioengineering and the Journal of

Biotechnology in 1979. The general public may have first heard of biotechnology with the publication of the Spinks report in 1980. In this report biotechnology was defined as, "The application of biological organisms, systems or processes to manufacturing and service industries". More recently the European Federation of Biotechnology (EFB) defined biotechnology as "the integrated use of biochemistry, microbiology and engineering sciences in order to achieve applications of the capabilities of microorganisms, cultured animal cells or plant cells or parts thereof in industry, agriculture, health care and in environmental processes"

**19- The term "biotechnology":**

- 1) has been known by the scientific community since 1919
- 2) was introduced to ordinary people relatively recently
- 3) was coined by the Journal of Biotechnology
- 4) was known before 1919

**20- In the phrase "the wider scientific community", the word "wider" means:**

- 1) distinguished
- 2) expert
- 3) famous
- 4) larger

**21- Compared to the definition of biotechnology proposed by the EFB, the definition in the Spinks report:**

- 1) is more correct
- 2) is more concise
- 3) was stated at a later time
- 4) is preferred by the general public

**22- In biotechnology, the basic and engineering sciences are used in:**

- 1) combination
- 2) isolation
- 3) parallel
- 4) sequence

**23- In the definition of biotechnology proposed by EFB, the term "parts thereof" refers to, parts of:**

- 1) all cultured cells
- 2) only plant cells
- 3) capabilities of microorganisms
- 4) only animal and plant cells

**PASSAGE 3:**

Before the industrial revolution the sewage disposed in canals, rivers, and at sea was sufficiently diluted so that the organic content of the waterway did not reach too high a value. Natural waterways contain indigenous population of microorganisms that can use the dissolved organic compounds, and are in turn part of the food chain for protozoa, insects, worms and fish. Under normal conditions in a waterway, the population of microorganisms is part of a balanced ecosystem and small quantities of organic compounds will not disturb this balance. However, this balanced system can be destabilized if excess metabolisable organic materials, such as high levels of sewage, are released into the waterway. The addition of metabolizable organic compounds will cause a considerable increase in the growth and metabolism of the aerobic microbial population of the waterway.

**24- Before the industrial revolution:**

- 1) sewage was dilute
- 2) the organic content of the waterway was excessive
- 3) there were no industries to pollute canals, rivers and seas
- 4) sewage disposed in the waterway did not cause pollution

**25- Indigenous population of microorganisms are microorganisms that:**

- 1) are specific
- 2) cause pollution
- 3) dilute the waterways
- 4) inhabit the waterways

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

**26- In waterways microorganisms:**

- 1) eat protozoa
- 2) cause disease to fish
- 3) are eaten by insects and worms
- 4) increase the dissolve oxygen concentration

**27- The addition of high levels of sewage to waterways will:**

- 1) metabolize organic materials
- 2) enhance the growth of anaerobic microorganisms
- 3) make the ecosystem of the waterway less stable
- 4) result in slight reduction in dissolved oxygen concentration

**Passage 4:****Which choice best fits each space?**

One of the more promising viscosity enhancer is a polymer produced by the bacterium *Xanthamonas campestris*. The (28) ----- is a high molecular weight polyelectrolytic polysaccharide. It must retain its (29) ----- at temperatures up to 80°C and at salinities from 0 to 15 percent and must be protected from biodegradation. The polymer must be stable in underground formations for periods (30) ----- from months to years.

- |                    |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 28- 1) bacterium   | 2) polymer    | 3) mixture    | 4) structure |
| 29- 1) ambiguities | 2) properties | 3) rigidities | 4) shape     |
| 30- 1) accepted    | 2) equivalent | 3) ranging    | 4) starting  |

**سینتیک و طراحی راکتور:**

-۳۱- اگر سرعت تجزیه آنزیمی A برابر  $r_A = \frac{V_{max} C_A}{K_M + C_A}$  باشد، با غلظت اولیه  $C_{A_0}$  در داخل یک راکتور ناپیوسته

(batch) زمان رسیدن به درجه تبدیل x چقدر می شود؟

$$t = \frac{K_M}{V_{max}} \ln \frac{1}{1-x} + \frac{C_{A_0} x}{V_{max}} \quad (1)$$

$$t = \frac{K_M}{V_{max}} \ln \frac{C_{A_0}}{1-x} + \frac{C_{A_0} x}{V_{max}} \quad (2)$$

$$t = \frac{V_{max}}{K_M} \ln(1-x) + \frac{C_{A_0} x}{V_{max}} \quad (3)$$

$$t = \frac{K_M}{V_{max}} \ln \frac{1}{1-x} + \frac{V_{max}}{C_{A_0} x} \quad (4)$$

-۳۲- واکنش  $R \rightarrow A$  در فاز مایع در یک راکتور انجام می گیرد. اگر تغییرات تابع تشکیل کل R ( $\phi_R$ ) نسبت به غلظت

A به صورت نزولی باشد، چه نوع راکتوری را باید انتخاب کرد تا حداکثر مقدار R تولید گردد؟

(۱) لوله‌ای

(۲) مخلوط شونده

(۳) ناپیوسته

(۴) نیمه پیوسته



# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

245F

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

- ۳۳- واکنش‌های زیر در یک راکتور در شرایط همدما انجام می‌گیرد.



اگر  $k_1 = 2k_2$  باشد تعیین کنید  $\Phi_{R/A}$  برابر کدام یک از موارد زیر است؟

$$\frac{C_B}{C_B + \gamma} \quad (1)$$

$$\frac{C_B}{\gamma C_B + \gamma} \quad (2)$$

$$\frac{\gamma C_B}{1 + C_B} \quad (3)$$

$$\frac{C_B + \gamma}{1 + C_B} \quad (4)$$

- ۳۴- واکنش موازی  $A \xrightarrow[k_2]{k_1} R$  و  $A \xrightarrow{k_2} S$  مفروض است.

حداکثر مقدار R که در راکتور لوله‌ای می‌تواند حاصل شود چیست؟

۰/۰۵ (۱)

۰/۳۲ (۲)

۰/۶۶ (۳)

۰/۷ (۴)

- ۳۵- واکنش سری A  $\xrightarrow{k_1} R \xrightarrow{k_2} S$  در راکتور مخلوط شونده به حجم ۱۰۰ لیتر با دبی ورودی قابل تغییر و با

غلظت اولیه  $C_{A_0} = 1 \frac{\text{mol}}{\text{lit}}$  انجام می‌گیرد. دبی حجمی بهینه برای ماقزیم تولید ماده R چند لیتر بر دقیقه

$$k_1 = k_2 = 1^{\text{min}^{-1}} \left( \frac{\text{lit}}{\text{min}} \right) \text{ است.} \quad (1)$$

۴۰ (۱)

۷۵ (۲)


۹۰ (۳)

۱۰۰ (۴)

- ۳۶- ضریب استوکیومتری ماده C در واکنش فاز گازی زیر نامشخص است و با غلظت‌های اولیه داده شده شروع و تا ۵۰

در صد تبدیل ماده A پیش می‌رود. اگر در انتهای غلظت ماده A برابر ۰/۶۷ باشد، کدام مقدار ضریب استوکیومتری

ماده C را به درستی نشان می‌دهد؟



۴ (۱)

۳ (۲)

۲ (۳)

۱ (۴)

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۳۷- یک مثال برای واکنش تخمیری میکروبی تولید چه محصولی است؟

- (۱) تجزیه حرارتی دی متیل اتر
- (۲) تبدیل اوره به آمونیاک و  $\text{CO}_2$
- (۳) تولید پنیسیلین
- (۴) تولید فسفین


۳۸- خوراک گازی با ترکیب ۵۰٪ A، ۵۰٪ ماده بی‌اثر و غلظت اولیه  $C_A = \frac{\text{mol}}{1}$  وارد یک راکتور مخلوط شونده به

حجم ۲L شده و طبق معادله  $-r_A = \frac{\text{mol}}{2 C_A \frac{1}{\text{s}}}$  واکنش می‌دهد. اگر غلظت A در خروجی راکتور به نصف

مقدار اولیه کاهش یابد، دبی حجمی خوراک بر حسب  $\frac{\text{mol}}{\text{s}}$  چقدر است؟

- (۱) ۰/۸
- (۲) ۰/۷
- (۳) ۰/۶
- (۴) ۰/۵



۳۹- واکنش سری - موازی در فاز مایع در یک راکتور انجام می‌شود.





ترکیب نسبی A در ضمن واکنش یکنواخت نگاه داشته می‌شود. تعیین کنید نحوه توزیع محصولات شبیه الگوی اختلاط با کدام یک از موارد زیر تطبیق دارد؟

(۱) غلظت B (کم یا زیاد) اثری در مسیر واکنش و نحوه توزیع محصولات ندارد.

(۲) ماده واسطه R تولید نمی‌شود.



۴۰- واکنش موازی زیر در فاز مایع را در نظر بگیرید



اگر P محصول مطلوب و R محصول نامطلوب باشد، چه نوع راکتوری باید انتخاب نمود تا حداقل محصول مطلوب P تولید گردد؟

(۱) لوله‌ای

(۲) مخلوط‌شونده

(۳) نیمه‌پیوسته

(۴) ناپیوسته

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۴۱- در اتصال دو راکتور مخلوط شونده با اتصال سری غیر هم حجم اگر واکنش از درجه اول باشد، ترتیب قرار دادن راکتورها چگونه است؟

- (۱) اول راکتور کوچکتر بعد راکتور بزرگتر  
(۲) اول راکتور بزرگتر بعد راکتور کوچکتر  
(۳) اتصال موازی راکتورها ارجحیت دارد  
(۴) تفاوتی ندارد

- ۴۲- برای واکنش مرتبه اول برگشتی کدام جمله درست است؟

- (۱) رسم  $\frac{k}{X_{Ae}} - \ln(1 + \frac{X_A}{X_{Ae}})$  - نسبت به زمان خط مستقیم با شیب  $\frac{k}{X_{Ae}}$  است.  
(۲) رسم  $\frac{k}{X_{Ae}} - \ln(1 - \frac{X_A}{X_{Ae}})$  - نسبت به زمان خط مستقیم با شیب  $\frac{k}{X_{Ae}}$  است.  
(۳) رسم  $\frac{X_A}{X_{Ae}} - \ln(1 - \frac{X_A}{X_{Ae}})$  - نسبت به زمان خط مستقیم با شیب  $k$  است.  
(۴) رسم  $\frac{X_A}{X_{Ae}} - \ln(1 + \frac{X_A}{X_{Ae}})$  - نسبت به زمان خط مستقیم با شیب  $k$  است.

- ۴۳- تغییرات غلظت یک واکنش از درجه صفر در زمان‌های مختلف:

- (۱) خطی است با شیب  $-k$   
(۲) خطی است با شیب صفر  
(۳) خطی است با شیب  $\frac{k}{C_{A_0}}$   
(۴) خطی است با شیب  $kC_{A_0}$

- ۴۴- زمان نیمه عمر ماده A در واکنش زیر چه مقدار است؟

$$-r_A = \frac{2C_A}{1+C_A}, C_{A_0} = 2, \ln 2 = 0.693$$

- ۰/۳۵ (۱)  
۰/۸۵ (۲)  
۱/۴ (۳)  
۳/۴ (۴)

- ۴۵- یک واکنش درجه اول فاز مایع در دو راکتور مخلوط شونده سری انجام می‌شود. اگر  $C_{A_0} = 10$  و  $C_{A_1} = 5$  و حجم راکتور اول برابر  $100$  واحد باشد، حجم راکتور دوم چند واحد باشد تا در خروجی راکتور دوم به تبدیل  $90\%$  بررسیم؟

- ۱۰۰ (۱)  
۲۰۰ (۲)  
۳۰۰ (۳)  
۴۰۰ (۴)

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


پدیده‌های انتقال (انتقال جرم، مکانیک سیالات ، انتقال حرارت):

- ۴۶- در یک واحد دفع، معادله خط تعادلی به صورت  $Y = 2X + 0/15$  و خط عملیاتی  $Y = -X + 0$  می‌باشد. حد اکثر Y در

فاز گاز چقدر است؟

- (۱) ۰/۰۵
- (۲) ۰/۱
- (۳) ۰/۱۵
- (۴) ۰/۲

- ۴۷- فیلم مایع در حال ریزش روی دیواره عمودی منجر به رابطه زیر شده است:



$$\frac{C_{Ai} - \bar{C}_{AL}}{C_{Ai} - C_{A0}} = 0/287 e^{-5/12137} + \dots$$

$$\eta = \frac{\tau_{DL}}{3\delta^2 \cdot \bar{u}_y}$$

به نظر شما طول مشخصه در رابطه فوق کدام است؟

(۱) همان ارتفاع دیواره یعنی L می‌باشد.

(۲) حاصل تقسیم  $\frac{D}{\bar{u}_y}$  می‌باشد.

(۳) نسبت  $\frac{L}{\delta}$  می‌باشد.

(۴) همان ضخامت فیلم مایع در حال ریزش یعنی δ می‌باشد.

- ۴۸- در واکنش‌های کاتالیستی دو فازی که در بسترها آکنده انجام می‌شوند، از آرایش هم‌جهت استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین مزیت استفاده از آرایش هم‌جهت نسبت به آرایش متقابل چیست؟

(۱) رخ ندادن طغیان

(۲) افزایش زمان تماس دو فاز

(۳) کمتر شدن قابل توجه افت فشار

- ۴۹- ماده حل شدنی خالص به شکل کره و مکعب موجود است. مقدار ماده در هر دو شکل مساوی است. با فرض اینکه شکل و اندازه بر انتقال جرم تأثیر ندارد نسبت نرخ انحلال در آب و در زمان  $t = 0$  شکل مکعبی به شکل کروی چقدر است؟

$$\sqrt{\frac{6}{\pi}} \quad (۴)$$

$$\sqrt[3]{\frac{6}{\pi}} \quad (۳)$$

$$\pi \quad (۲)$$

$$\frac{6}{\pi} \quad (۱)$$

- ۵۰- کدامیک از گزینه‌های زیر بیان کننده فلاکس A در گاز بر طبق واکنش (غاز) B + (جامد) C → (غاز) ۲A می‌باشد؟

$$N_A = -\frac{D_{AB}}{RTZ} P_t \ln \frac{P_t + P_{A2}}{P_t + P_{A1}} \quad (۲)$$

$$N_A = -\frac{D_{AB} P_t}{RTZ} \ln \frac{P_t - P_{A2}}{P_t - P_{A1}} \quad (۱)$$

$$N_A = -\frac{\gamma P_t D_{AB}}{RTZ} \ln \frac{\gamma + P_{A2}}{\gamma + P_{A1}} \quad (۴)$$

$$N_A = \frac{\gamma P_t D_{AB}}{RTZ} \ln \frac{\gamma P_t - P_{A2}}{\gamma P_t - P_{A1}} \quad (۳)$$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

$$J_A = -CD_{AB} \nabla x_A \quad (1)$$

$$J_A = -\rho D_{AB} \nabla w_A \quad (2)$$

$$J_A = N_A - x_A \sum_{i=1}^n N_i \quad (3)$$

- ۵۱- کدام یک از روابط زیر بیانگر قانون اول فیک است؟

(۱) رابطه (۱)

(۲) رابطه (۳)

(۳) رابطه (۲) و (۳)

(۴) تمام رابطه‌های فوق

- ۵۲- کدام دسته از فرایندهای نام برده شده به عنوان فرایندهای جداسازی مستقیم است؟

(۱) تقطیر، تبخیر، میعان

(۲) تمعید، استخراج مایع - مایع

(۳) تقطیر، تمعید، جذب گاز - مایع

(۴) رطوبتدهی، استخراج جامد - مایع

- ۵۳- در یک بستر شناور، چگالی دانه‌های بستر ۲ برابر چگالی سیال است. اگر سیال بستر با یک سیالی که چگالی آن ۸/۸ برابر چگالی سیال اول است جایگزین شود، با فرض ثابت بودن تخلخل بستر ( $\epsilon_M$ )، افت فشار بستر در صورت شناورسازی چه تغییری خواهد کرد؟

(۱) افت فشار بستر  $8/8$  برابر می‌شود.

(۲) افت فشار بستر  $1/2$  برابر می‌شود.

(۳) افت فشار  $1/5$  برابر می‌شود.

(۴) تغییری نمی‌کند.

- ۵۴- به هنگام عبور سیال از روی ذرات کروی جامد اگر عدد رینولدز جریان افزایش یابد، ضریب و نیروی درگ، به ترتیب چه تغییری خواهند کرد؟


(۱) کاهش، افزایش می‌یابد.

(۲) کاهش، کاهش می‌یابد.

(۳) افزایش، افزایش می‌یابد.

(۴) کاهش، تقریباً ثابت می‌ماند.

- ۵۵- در محل نصب پیزومتر به دیواره لوله زانه‌ای در لبه جلویی محل اتصال، به صورت نشان داده شده در شکل ایجاد شده است. پیزومتر موجود فشار استاتیک را چگونه نشان می‌دهد؟



(۱) فشار را بیشتر از فشار واقعی نشان می‌دهد.

(۲) فشار را کمتر از فشار واقعی نشان می‌دهد.

(۳) خطای چندانی ایجاد نمی‌کند و همان فشار واقعی را نشان می‌دهد.

(۴) در این شرایط فشار سکون را نشان می‌دهد، نه فشار استاتیک را.


# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱


245F

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

- ۵۶- صفحه‌ای در عمق مشخص از یک مایع نیوتانی به صورت موازی با افق با سرعت ثابت  $U$  حرکت می‌کند. توزیع سرعت بالای صفحه به کدام صورت زیر است؟



- ۵۷- دو مخزن A و B همانند شکل زیر را در نظر بگیرید. سیالی با دمای  $1 \frac{m^3}{s}$  از مخزن A به مخزن B با نیروی وزن جریان دارد. اگر بخواهیم دمای را سه برابر نمائیم استفاده از پمپ ضروری است. با فرض ثابت بودن ضریب اصطکاک در لوله هد مورد نیاز پمپ چندمتر است؟



- ۵۸- یک لوله افقی باریک به طول ۴ متر در زمان گردش تا نیمه پر است و تحت سرعت زاویه‌ای  $\omega$  مطابق شکل، در صفحه افق دوران می‌کند. فشار در انتهای بسته لوله بر حسب مترآب چقدر است؟



# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۵۹- در یک بستر آگنده (Packed bed) با دو برابر کردن سرعت جریان سیال اگر تمامی مشخصات بستر ثابت بمانند، افت فشار جریان‌های آرام و درهم به ترتیب چند برابر می‌شوند؟

- (۱) دو، چهار
- (۲) دو، دو
- (۳) چهار، دو
- (۴) چهار، چهار


-۶۰- پارامتر  $k$  در اعداد بدون بعد ناصلت و بیو (Biot) چگونه است؟

- (۱)  $k$  نشان‌دهنده ضریب هدایت حرارت جامد در هر دو عدد می‌باشد.
- (۲)  $k$  نشان‌دهنده ضریب هدایت حرارتی سیال در هر دو عدد می‌باشد.
- (۳)  $k$  نشان‌دهنده ضریب هدایت حرارتی جامد در عدد ناصلت و ضریب هدایت حرارتی سیال در عدد بیو می‌باشد.
- (۴)  $k$  نشان‌دهنده ضریب هدایت حرارتی سیال در عدد ناصلت و ضریب هدایت حرارتی جامد در عدد بیو می‌باشد.

-۶۱- ارتباط بین ضریب هدایت حرارتی آجر مرطوب ( $k_w$ ) با آجر خشک ( $k_d$ ) چگونه است؟

- (۱)  $k_d = k_w$
- (۲)  $k_d < k_w$
- (۳)  $k_d > k_w$
- (۴)  $k_w = 2k_d$

-۶۲- تغییرات دمای دو سیال در یک مبدل حرارتی به صورت زیر است. کدام عبارت صحیح است؟



طول مبدل

- (۱) در این مبدل سیال گرم سیال حداقل بوده و مبدل دارای بیشترین بازده است.
- (۲) در این مبدل سیال سرد سیال حداقل بوده و مبدل دارای کمترین بازده است.
- (۳) در این مبدل سیال گرم سیال حداقل بوده و مبدل دارای کمترین بازده است.
- (۴) در این مبدل سیال سرد سیال حداقل بوده و مبدل دارای بیشترین بازده است.

-۶۳- از یک لوله فین‌دار برای تهیه آب شیرین استفاده می‌شود. آب دریا داخل لوله و هوای شرجی بر روی فین‌ها می‌وزد. کدام روش زیر به صورت تقریبی برای محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت مناسب است؟  $h_i$  ضریب داخل لوله و  $h_o$  ضریب طرف فین‌ها است.

- (۱)  $U = h_o$
- (۲)  $U = h_i$
- (۳)  $U \approx \frac{h_i h_o}{h_i + h_o}$
- (۴)  $U \approx \frac{h_i h_o}{h_i - h_o}$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۶۴- در یک مبدل حرارتی ناهمسو رابطه  $NTU = \frac{1}{C-1} \ln\left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon C-1}\right)$  به صورت NTU - ε است. اگر در یک حالت خاص  $C_{min} = C_{max}$  باشد، مقدار NTU برابر کدامیک از موارد زیر است؟

$$\frac{1}{\varepsilon} \quad (1)$$

$$\frac{1}{1-\varepsilon} \quad (2)$$

$$\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} \quad (3)$$

$$\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \quad (4)$$

۶۵- در حرکت سیال از روی صفحه، در کدام گزینه ضخامت لایه‌های مرزی سرعتی و حرارتی تقریباً یکسان است؟

(۱) حاصل ضرب عدد رینولدز و پرانتل برابر  $10^4$  باشد.

(۲) عدد رینولدز برابر  $10^5$  باشد.

(۳) عدد گراشوف برابر  $10^9$  باشد.

(۴) عدد پرانتل برابر ۱ باشد.

## بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی:

۶۶- کدام یک از گزینه‌های زیر، قادر هستند در شرایط نامساعد اسپور تولید کنند؟

(۱) قارچ‌ها

(۲) پروتوزوا

(۳) باکتری‌ها

(۴) قارچ‌ها و باکتری‌ها

۶۷- ترکیب درصد دیواره سلولی (Cell membrane) میکروارگانیسم‌ها به طور متوسط حاوی چه ترکیباتی است؟

(۱) ۱۰٪ لیپید - ۲۰٪ پروتئین

(۲) ۵٪ لیپید - ۹۵٪ پروتئین

(۳) ۱۰۰٪ فسفولیپید - ۲۰٪ پروتئین

(۴) ۸٪ فسفولیپید - ۹۲٪ پروتئین

(۴) فاقد دیواره سلولی هستند.

(۲) از بروکاریوت‌ها کوچک‌ترند.

(۳) تک سلولی هستند و توانایی حرکت دارند.

(۴) از یوکارت‌های تک یاخته‌ای

(۴) معادله هندرسون هاسل باخ برای تراکم بی‌کربنات و فشار  $CO_2$  کدام است؟

$$PH = PK + \log \left[ \frac{[CO_2]}{[HCO_3^-]} \right] \quad (2)$$

$$PH = PK \quad (1)$$

$$PH = PK + \log \left[ \frac{[HCO_3^-]}{[CO_2]} \right] \quad (4)$$

$$PH = PK + \ln \left[ \frac{[CO_2]}{[HCO_3^-]} \right] \quad (3)$$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۷۰- ترکیبی که، فاکتور رشد است و میکروارگانیسمی که به فاکتور رشد نیاز دارد کدام است؟  
(۱) آب ، اتوتروف  
(۲) اسیدآمیته ، تمامی اتوتروفها  
(۳) چربی ، تمامی فتوتروفها  
(۴) ویتامین ، اکسوتروف
- ۷۱- کدام یک از موارد زیر، در خصوص سیانور باکترها درست است؟  
(۱) فتوستنتیک حاوی هسته با غشاء  
(۲) شامل مواد هسته‌ای در غشاء  
(۳) جلبک آبی فتوتروف  
(۴) اتوتروف بی‌هوایی
- ۷۲- کدام یک از موارد زیر در سیستم‌های تخمیر پیوسته درست است؟  
(۱) در یک نرخ رقيق‌سازی که کمتر از نرخ رقيق‌سازی بحرانی باشد، میزان محصول دهی (Productivity) حداقل می‌گردد.  
(۲) هنگامی که سرعت رقيق‌سازی برابر سرعت مخصوص رشد باشد ( $D = \mu$ ) غلظت میکروارگانیسم‌ها افزایش می‌یابد.  
(۳) هنگامی که نرخ رقيق‌سازی بیشتر از نرخ تولید محصول باشد، سیستم دچار شستگی (شسته شدن) می‌شود.  
(۴) هنگامی که نرخ رقيق‌سازی بیشتر از نرخ تولید محصول باشد، سیستم دچار انباشتگی باکتری می‌گردد.
- ۷۳- کدام یک از موارد زیر، جزء مراحل کلون‌سازی یک ژن نیست؟  
(۱) اتصال ژن به حامل  
(۲) برش دادن DNA  
(۳) نسخه‌برداری از ژن  
(۴) شناسایی سلول میزبان حاوی ژن
- ۷۴- کدام یک از گروه‌های زیر در تقسیم‌بندی، جزء گروه باکتری‌ها نمی‌باشد?  
(۱) آرکی‌ها  
(۲) اکتینومیست‌ها  
(۳) ایوبکاریوت‌ها  
(۴) سیانو باکتری‌ها
- ۷۵- چه مدت زمانی طول می‌کشد تا یک سلول با سرعت رشد مخصوص  $16\text{ h}^{-1}$  به یک میلیون سلول تکثیر شود؟  
(۱)  $\ln 10 \cdot h$   
(۲)  $\ln 10 \cdot h$   
(۳)  $\frac{\ln 10}{16} h$   
(۴)  $\ln 10 \cdot h$
- ۷۶- با توجه به واکنش معمول آنزیمی، کدام عبارت برای واکنش‌های آنزیمی درست است؟  
(۱) سرعت لحظه‌ای واکنش با غلظت مجموعه ES متناسب است.  
(۲) سرعت لحظه‌ای واکنش با غلظت کل آنزیم متناسب است.  
(۳) حداقل سرعت واکنش آنزیمی با غلظت مجموعه ES متناسب است.  
(۴) ثابت  $k_m$  را می‌توان همانند ثابت  $k_s$  در رابطه «مونود» تعریف نمود.
- ۷۷- در تبدیل پیروات به اگزالواستات کدام واکنش آنزیمی به طور همزمان انجام می‌شود؟  
$$\text{اگزالواستات} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{پیروات}$$
  
$$\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} \quad (۱)$$
  
$$\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P} \quad (۴)$$
  
$$\text{NADH}_7 \rightarrow \text{NAD} \quad (۳)$$
- ۷۸- در کدام نوع مهارکننده آنزیمی افزایش غلظت سوبسترا موجب کاهش مهار می‌شود؟  
(۱) غیررقابتی  
(۲) رقابتی  
(۳) نارقابتی  
(۴) آنزیم الستریکی

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۷۹- کدام ساختمان پروتئین‌ها نشان دهنده چگونگی بسط و گسترش زنجیره پلی‌پیتیدی است که از برقراری پیوند هیدروژنی بین اسیدهای آمینه نتیجه می‌شود؟
- (۱) اول  
(۲) دوم  
(۳) سوم  
(۴) چهارم
- ۸۰- کدام ترکیب در دوره تنفسی حضور دارد ولی در مسیر گلیکولیز وجود ندارد؟
- (۱) اگزالواستات  
(۲) پیروات  
(۳) ۳-فسفوگلیسرات  
(۴) گلیسر آلدید ۳-فسفات
- ۸۱- کدام عبارت در مورد آمیلوز و آمیلوپیکتین درست است؟
- (۱) آمیلوپیکتین پلیمری خطی از واحدهای D-glucose-D- $\alpha$  است.  
(۲) آمیلوز پلیمری خطی از واحدهای D-glucose-D- $\beta$  است.  
(۳) آمیلوز در آب محلول است و توسط آنزیم آلفا آمیلاز تجزیه می‌شود.  
(۴) آمیلوپیکتین در آب نامحلول است و توسط آنزیم بتا آمیلاز تجزیه می‌شود.
- ۸۲- کدام عبارت زیر در مورد فتوسنتر با تولید اکسیژن درست است؟
- (۱) جذب نور توسط مولکول‌های کلروفیل و شکست مولکول‌های آب، جابجایی الکترون‌ها را از موقعیت پتانسیل اکسیداسیون احیا مثبت به پتانسیل منفی اکسیداسیون احیا موجب می‌شود.  
(۲) جذب نور توسط مولکول‌های کلروفیل و شکست مولکول‌های آب، تولید مولکول‌های گیرنده الکترون با پتانسیل مثبت اکسیداسیون احیا را به دنبال دارد.  
(۳) جذب نور توسط مولکول‌های دهنده الکترون و شکست مولکول‌های آب، جابجایی کلروفیل را از موقعیت پتانسیل اکسیداسیون احیا موجب می‌شود.  
(۴) در فتوسنتر تشییت کربن، توسط  $CO_2$  به انجام می‌رسد.
- ۸۳- تعداد ATP حاصل از اسید چرب  $C_{18}$  اشباع کدام است؟
- (۱) ۱۴۷ (۲)  
(۲) ۲۷۰  
(۳) ۱۵۹  
(۴) ۱۱۲
- ۸۴- عدد صابونی برای چربی دی‌پالمیتین با وزن ملکولی ۵۶۸ چه میزان است؟
- $KOH = ۵۶ \quad O = ۱۶ \quad H = ۱ \quad K = ۳۹$
- (۱) ۱۰  
(۲) ۱۹۷  
(۳) ۵۰۷۱  
(۴) ۱۱۲
- ۸۵- کربوهیدرات‌ها در سلول‌ها کدام نقش را ندارد و کدام یک از قندهای زیر یک کتوهگزوز است؟
- (۱) ذخایر مقاومت در برابر آسیب‌های سلولی، فروکتوز  
(۲) ترکیبات واسطه متابولیکی، گالاكتوز  
(۳) جزئی از ساختمان اسیدهای نوکلئیک، گلوكز  
(۴) ایجاد مقاومت در برابر آسیب‌های سلولی، فروکتوز

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

245F

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

ترمودینامیک:

- ۸۶- ۵ گرم مول از یک گاز کامل در دمای  $500\text{ K}$  و فشار  $10\text{ atm}$  اتمسفر در زیر یک پیستون درون یک سیلندر به صورت آدیاباتیک رورسیبل تا فشار  $1\text{ atm}$  منبسط می‌شود مقدار تقریبی کارگرفته شده چند کالری می‌باشد؟

$$R = \frac{\text{cal}}{\text{gmolK}}, \frac{c_p}{c_v} = 1/5$$

$$\frac{1}{10^3} = 2/25, \quad \frac{1}{10^2} = 3/2, \quad 10^0/25 = 1/8, \quad 10^0/7 = 5$$

۱۱۰۰ (۱)

۲۸۰۰ (۲)

۳۲۰۰ (۳)

۵۶۰۰ (۴)

- ۸۷- مخزنی که ابتدا تحت خلاء می‌باشد به خط لوله‌ای متصل است که در آن یک گاز ایده‌آل در شرایط  $300\text{ K}$  و  $150\text{kPa}$  جریان دارد. شیر متصل به مخزن را باز کرده تا طی یک فرایند آدیاباتیک (Adiabatic) فشار داخل مخزن به  $150\text{kPa}$  برسد. دمای گاز داخل مخزن در پایان فرایند چقدر است؟

$$R = 0.5 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}, \quad C_p^{ig} = 1/5 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

۳۰۰ (۱)

۴۰۰ (۲)

۴۵۰ (۳)

۶۰۰ (۴)

- ۸۸- گاز کاملی با دمای  $400\text{ K}$  و سرعت  $10\text{ m/sec}$  به صورت کاملاً یکنواخت (پایدار) وارد یک شیپوره (نازل) عایق می‌شود.

در صورتی که سرعت خروجی از شیپوره برابر  $20\text{ m/sec}$  باشد دمای خروجی گاز از شیپوره تقریباً چند درجه کلوین است؟

$$R = 0.5 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}, \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1/5$$

۳۵۴ (۱)

۳۶۵ (۲)

۳۷۷ (۳)

۳۸۷ (۴)

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۸۹- یک گاز ایده‌آل از شرایط  $700\text{ K}$  و  $800\text{kPa}$  در یک توربین که به صورت آدیاباتیک (Adiabatic) و برگشت‌پذیر

کار می‌کند به فشار  $100\text{kPa}$  انبساط می‌باید. کار توربین بر حسب  $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$  چقدر است؟

$$C_p^{\text{ig}} = 0.75 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \quad C_v^{\text{ig}} = 0.5 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

- (۱) ۲۷۲/۵  
(۲) ۲۶۲/۵  
(۳) ۲۵۰  
(۴) ۲۲۵

-۹۰- جریانی با شدت ۳ و انتروپی ۵ از یک ماده خالص به طور کاملاً یکنواخت وارد یک مخزن اختلاط شده و با جریان دیگری از همان ماده با شدت ۲ و انتروپی ۲۰ مخلوط می‌شود. آنتروپی جریان خروجی ۱۵ می‌باشد. شدت انتقال حرارت از مخزن اختلاط ناچیز است. شدت تغییر خالص انتروپی کدامیک از موارد زیر است؟ واحدها همان‌گونه و اختیاری است.

- (۱) صفر  
(۲) ۱۰  
(۳) ۲۵  
(۴) ۶۵

-۹۱- مخزن صلبی حاوی مایع و بخار اشباع آب در حال تعادل است به طوری که حجم مخصوص مولی آن کمتر از حجم مخصوص بحرانی می‌باشد. اگر مخزن گرم شود، کیفیت:

- (۱) کاهش می‌باید.  
(۲) افزایش می‌باید.  
(۳) تغییری نمی‌کند.  
(۴) ممکن است افزایش و یا کاهش باید.

-۹۲- در یک تحول ابیوتومال روسیبل برای یک سیستم بسته تک فازی کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

- (۱) مقدار کار با تغییر انرژی آزاد هلمهولتز برابر است.  
(۲) مقدار گرمای منتقله با تغییر انتالپی برابر است.  
(۳) مقدار کار با تغییر انرژی آزاد گیبس برابر است.  
(۴) مقدار گرمای منتقله با تغییر انرژی آزاد هلمهولتز برابر است.

-۹۳- بالنی حاوی هوا (گاز کامل) از فشار  $P_1$  و حجم  $V_1$  تغییر حالت می‌دهد. اگر به فرض فشار بالن متناسب با قطر بالن به توان ۲ باشد مقدار کار انجام شده در این فرایند چقدر است؟

- (۱)  $\frac{2}{3}(P_2V_2 - P_1V_1)$   
(۲)  $\frac{3}{5}(P_2V_2 - P_1V_1)$   
(۳)  $\frac{3}{2}(P_2V_2 - P_1V_1)$   
(۴)  $2(P_2V_2 - P_1V_1)$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۹۴- در مخزن صلبی آب مایع و بخار در حال تعادل وجود دارد. با توجه به اطلاعات زیر برای آنکه در اثر گرم کردن، مخزن از نقطه بحران بگذرد چگونه است؟

$$V_f = 0.001044 \frac{m^3}{kg} \quad V_g = 1.67185 \frac{m^3}{kg} \quad V_c = 0.0571 \frac{m^3}{kmol}$$

$$M_{H_2O} = 18 \frac{kg}{kmol}$$

(۱)  $2.47 \times 10^{-2}$ (۲)  $2.35 \times 10^{-3}$ (۳)  $1.22 \times 10^{-3}$ (۴)  $1.07 \times 10^{-2}$ 

-۹۵- ضریب انبساط حجمی مایع A در  ${}^{\circ}\text{C}$  برابر  $18 \times 10^{-5} \text{ }({}^{\circ}\text{C})^{-1}$  و ضریب متراکم ایزوترمال آن برابر  $1 \times 10^{-9} \text{ bar}^{-1}$  است. اگر به آن از  ${}^{\circ}\text{C}$  تا  ${}^{\circ}\text{C}$  در سیستمی با حجم ثابت حرارت داده شود، تغییر فشار حاصل چند bar است؟

(۱) +۲

(۲) +۳

(۳) +۱۰

(۴) ۳۰

-۹۶- اگر دو سیستم مایع بخار در حالت تعادل داشته باشیم (VLE) کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟

(۱) فوگاسیتۀ فاز مایع با فوگاسیتۀ فاز بخار با هم برابر خواهند بود.

(۲) فوگاسیتۀ تک تک سازنده‌ها در دو فاز با هم برابر خواهند بود.

(۳) فوگاسیتۀ فاز مایع با فوگاسیتۀ فاز بخار ممکن است با هم برابر باشند.

(۴) ضریب فوگاسیتۀ تک تک سازنده‌ها در هر دو فاز همیشه با هم برابر خواهند بود.

-۹۷- یک مخلوط دو جزئی با کسر مولی کلی  $Z_1 = 0.5$  تحت فشار  $72 \text{ kPa}$  می‌باشد. اگر مخلوط از قانون رائولت پیروی کند حالت مخلوط کدام است؟

$$P_1^{\text{sat}} = 8 \text{ kPa} \quad P_2^{\text{sat}} = 6 \text{ kPa}$$

(۱) مایع اشباع

(۲) مایع متراکم

(۳) بخار فوق داغ

(۴) مخلوطی از مایع و بخار اشباع

-۹۸- برای واکنش گومازای  $2B \rightleftharpoons A$  در فاز گاز کامل راجع به کسر تبدیل A در حالت تعادل کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

(۱) با کاهش دما افزایش و با کاهش فشار افزایش می‌یابد.

(۲) با کاهش دما افزایش و با کاهش فشار کاهش می‌یابد.

(۳) با کاهش دما کاهش و با کاهش فشار افزایش می‌یابد.

(۴) با کاهش دما کاهش و با کاهش فشار کاهش می‌یابد.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۹۹- ضریب فوگاسیته جزء A در محلول ایدهآل برابر است با:

$$\hat{\Phi}_i^{id} = \Phi_i \quad (2)$$

$$\hat{\Phi}_i^{id} = 1 \quad (1)$$

$$\hat{\Phi}_i^{id} = x_i f_i \quad (4)$$

$$\hat{\Phi}_i^{id} = x_i \quad (3)$$

۱۰۰- در صورتی که یک مخلوط دو جزئی ایدهآل باشد در این صورت مقدار  $\lim_{x_1 \rightarrow 1} \hat{f}_1$  برابر کدامیک از موارد زیر است؟

فشار بخار جزء A در این سیستم زیاد است.

$$P_i^{\text{sat}} \quad (2)$$

$$P \quad (\text{فشار سیستم}) \quad (1)$$

$$\Phi_i^{\text{sat}} P_i^{\text{sat}} \quad (4)$$

$$P_i^{\text{sat}} \quad (3)$$

۱۰۱- در یک فاز مایع دوگانه (دوتائی) برمبنای حالت استاندارد هنری داریم:  $\left(\frac{G^E}{RT}\right)^* = 5(x_1 x_2 - 1)$  در این صورت

$\ln \gamma_2^*$  برابر است با:

$$5x_1^2 \quad (1)$$

$$5x_1 x_2 \quad (2)$$

$$5x_1^2 - 5 \quad (3)$$

$$5(x_2^2 - 1) \quad (4)$$

۱۰۲- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

(۱) اگر دو سازنده خالص ۱ و ۲ در فاز مایع به صورت آدیباتیک با هم مخلوط شوند تغییر انتروپی برابر صفر است.

(۲) اگر دو سازنده خالص ۱ و ۲ در فاز مایع به صورت آدیباتیک با هم مخلوط شوند تغییر انرژی آزاد گیبس برابر صفر است.

(۳) نقطه حاصل از اختلاط غیرآدیباتیک رور سیبل در محلول A و B از دو سازنده یکسان در نمودار انتالپی غلظت بر روی خطی است که مختصات مخلوط اول را به مختصات محلول دوم وصل می‌کند.

(۴) نقطه حاصل از اختلاط آدیباتیک در محلول A و B از دو سازنده یکسان در نمودار انتالپی غلظت بر روی خطی است که مختصات مخلوط اول را به مختصات محلول دوم وصل می‌کند.

۱۰۳- رفتار حجمی بخار نیتروژن در دمای  $K = 100$  طبق رابطه  $Z = 1 + B'P + C'P^2$  به صورت تابعی از فشار توصیف می‌شود. فوگاسیته بخار خالص در  $K = 100$  و فشار P از کدام رابطه زیر به دست می‌آید؟

$$\ln f^V = B'P + C' \frac{P^2}{2} \quad (1)$$

$$\ln f^V = \ln P + B'P \quad (2)$$

$$\ln f^V = \ln P + B'P + C' \frac{P^2}{2} \quad (3)$$

$$\ln f^V = \exp(B'P) + C' \frac{P^2}{2} \quad (4)$$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۰۴ در یک مخلوط دو جزئی حجم مولی مخلوط از رابطه  $V = x_1 x_2 (40x_1 + 20x_2)$  به دست می‌آید. اگر در مخلوط ۵٪  $x_1 = 0.1$  باشد و ۱۰٪ مول از جزء ۱ به این مخلوط اضافه کنیم تغییر حجم کل مخلوط کدام است؟ تعداد مول‌های مخلوط خیلی زیاد است.

حجم مولی جزء ۱ خالص  $V_1 = 12$

۱ (۱)

۱/۲ (۲)

۷ (۳)

۷/۵ (۴)

- ۱۰۵ در یک سیستم دو جزئی در دما و فشار ثابت، انتالپی جزئی دو جزء از فرمول‌های  $\bar{H}_1 = a_1 + b_1 x_1^2$  و  $\bar{H}_2 = a_2 + b_2 x_2^2$  به دست می‌آیند که در آن  $a_1, a_2, b_1$  و  $b_2$  ضرایب ثابت و  $x_1$  و  $x_2$  کسر مولی هستند. بین این ضرایب کدام یک از روابط زیر برقرار است؟

$a_1 = a_2$  (۱)

$b_1 = -b_2$  (۲)

$b_1 = b_2$  (۳)

$a_1 + b_1 = a_2 + b_2$  (۴)