


# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد



415F

415

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

عصر جمعه  
۹۵/۰۲/۱۷«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح عی شود.»  
امام خمینی (ره)جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۵

### مجموعه مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری – کد ۱۳۰۱

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۲۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۲۰
۲	حافظت خاک و آبخیزداری	۳۰	۳۱	۶۰
۳	مرتع داری	۳۰	۶۱	۹۰
۴	هیدرولوژی کاربردی	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	رُزومورفولوژی و زمین‌شناسی	۳۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	جامعه‌شناسی روسنایی	۳۰	۱۵۱	۱۸۰
۷	اصلاح و توسعه مرتع	۳۰	۱۸۱	۲۱۰
۸	شناسایی گیاهان مرتعی	۳۰	۲۱۱	۲۴۰
۹	ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع	۳۰	۲۴۱	۲۷۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حلبی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات دقتار عی شود.

## آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

**PART A: Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- With the pace of life in Indian metros getting faster by the day, many of the old Indian traditions have fallen into ----- and are no longer practiced.  
1) indifference    2) equilibrium    3) abeyance    4) annoyance
- 2- We thought he was reliable till we realized that he had given us a ----- address.  
1) dishonest    2) fake    3) skeptical    4) vulnerable
- 3- His expression was gloomy at every game; I don't think I saw him smile even when his team ----- a hundred points.  
1) scored    2) connected    3) achieved    4) displayed
- 4- The approaching rain gave us a ----- excuse to escape the boring party.  
1) harmless    2) monotonous    3) secret    4) plausible
- 5- The relationship between the earthworm and the garden is -----: the garden provides a home for the earthworm, while the earthworm provides manure for the garden and keeps it fertile.  
1) impractical    2) symbiotic    3) latent    4) paradoxical
- 6- When it was discovered that he had been operating as a spy, he was badly ----- in the press as being a traitor.  
1) incorporated    2) censured    3) concerned    4) constrained
- 7- Contemporary research into the origins of DeLong culture indicates that a hunter-gatherer society was established about 2,000 years earlier than was ----- thought.  
1) similarly    2) sufficiently    3) previously    4) accurately
- 8- An attempt was made to ignore this brilliant and irregular book, but in -----; it was read all over Europe.  
1) jeopardy    2) chaos    3) contempt    4) vain
- 9- He strictly warned him that if he did not take the medicine in time, the pain would not -----.  
1) subside    2) degrade    3) avoid    4) collapse
- 10- To reduce -----, the company will no longer mail monthly paper statements to those with access to online statements.  
1) fright    2) hesitation    3) conflict    4) waste

**PART B: Cloze Passage**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Becoming a mother is a major transition, points out clinical psychologist Ann Dunnewold, (11) ----- in Dallas, Tex., provides support for mothers. New mothers give up autonomy, sleep and relationships (12) ----- to the relentless needs of a baby. On top of that, they are also expected to be in a constant state of bliss and fulfillment (13) ----- their new role. "There's a lot of pressure to be the perfect mother, (14) ----- they're not coping," Leahy-Warren says.

Making matters worse, research that demonstrates the importance of early childhood experiences in determining future success and happiness (15) ----- on moms to get it right.

- |     |   |                                  |               |                  |
|-----|---|----------------------------------|---------------|------------------|
| 11- | 1) practices                            | 2) whose practice                | 3) practicing | 4) she practices |
| 12- | 1) with tending                         | 2) tend                          | 3) to tend    | 4) that tend     |
| 13- | 1) of                                   | 2) by                            | 3) in         | 4) with          |
| 14- | 1) and they are afraid to say           | 2) while afraid to say           |               |                  |
|     | 3) but they say they are afraid of what | 4) then they say afraid they are |               |                  |
| 15- | 1) and additional pressure              | 2) add pressure                  |               |                  |
|     | 3) puts additional pressure             | 4) and added pressure            |               |                  |

## Part C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.

### PASSAGE 1:

The machair refers to a fertile low-lying grassy plain found on some of the north-west coastlines of Ireland and Scotland, in particular the Outer Hebrides. Machair is distinguished from the links on the east coast of Scotland by a lower mineral content, whereas the links are high in silica. Machair plains are highly calcareous, with calcium carbonate concentrations of between 20% to 80% on the beaches, and decreasing further away from the shore. The pH of a machair is typically greater than 7, i.e. it is alkaline. The inner side of a machair is often wet or marshy, and may contain lochs. The modern theory of machair formation was first set out by William MacGillivray in 1830. He worked out that shell fragments are rolled by waves towards the shore, where they are broken up further. The small shell fragments are blown up the beach to form hillocks, which are then blown inland. Human activity has an important role in the creation of the machair. Archaeological evidence indicates that some trees had been cleared for agriculture by around 6000 BC, but there was still some woodland on the coast of South Uist as late as 1549. Seaweed deposited by early farmers provided a protective cover and added nutrients to the soil. The grass is kept short by cattle and sheep, which also add trample and add texture to the sward, forming tussocks that favour a number of bird species. Machair soil is low in a number of key nutrients, including trace elements such as copper, cobalt and manganese, which makes it necessary to feed cattle supplements or take them to summer pastures elsewhere. The sandy soil does not hold nutrients well, making artificial fertilisers ineffective and limiting the crops that can be grown to certain strains of oats and rye, and bere barley.

- 16- The passage mentions that -----.
- 1) artificial fertilisers do not work on machair soil
  - 2) the links on the east coast of Scotland are machairs
  - 3) machairs contain extremely tall species of grass
  - 4) machairs have lochs in both their inner and outer side

- 17- The passage does not include information on -----.
- 1) economical importance of machairs
  - 2) the geology of machairs
  - 3) role of humans in the creation of machairs
  - 4) formation of machairs
- 18- It is stated in the passage that -----.
- 1) shell fragments produced by machairs are rolled into the sea
  - 2) far-from-shore machairs contain less calcium carbonate
  - 3) machairs are fertile grassy plains in Scotland and Ireland
  - 4) Scottish beaches have around 20% calcium compounds
- 19- According to the passage, -----.
- 1) bird species can feed on machair tussocks
  - 2) machair soil contains nearly no copper
  - 3) beach hillocks are formed out of machairs
  - 4) machairs of a pH greater than 7 are very rare
- 20- The word ‘sward’ in the passage (underlined) is best related to -----.
- 1) ‘hills’
  - 2) ‘trees’
  - 3) ‘lakes’
  - 4) ‘grass’

## PASSAGE 2:

An agrarian system is the dynamic set of economic and technological factors that affect agricultural practices. It is premised on the idea that different systems have developed depending on the natural and social conditions specific to a particular region. Political factors also have a bearing on an agrarian system due to issues such as land ownership, labor organization, and forms of cultivation. The basis for a prevailing agrarian system may be derived from one of a number of major types, including agrarian social structure, for example, tribal or ethnic divisions, feudal classes or family based systems. Farming methods such as migratory herding of livestock are a common framework for which an agrarian system may evolve. Other important kinds of system are based on the dominant political ideology such as communism or agrarian socialism. Europe is dominated by mixed farming. This has meant careful management of tillage practices and good tools and implements were important. China developed an agrarian system based on labor-intensive wet rice cultivation where skill was paramount. The Ottoman agrarian system was based around the *tapu*, which involved a permanent lease of state-owned arable land to a peasant family. In Haiti there was a social system based on collective labor teams, called *kounbit*, where farms were run by nuclear families and exchanges. This was replaced by smaller groups, called *eskouad*, who operated on a *reciprocal* basis or conducted collective labor to other peasants for a price. In the 20th century the distribution of land ownership in rural Egypt had become grossly unequal. An overwhelming majority of land owners possessed small parcels of land while a small minority owned large farms. Many of the rural poor were landless. By the middle of the century the calls for agrarian reform grew. Tenancy reforms, including rent control and minimum wage legislation were enacted with mixed results.

21- According to the passage, -----.

- 1) wet rice cultivation took place only in parts of China
- 2) land distribution was generally more equal in the 19th century
- 3) quality of implements is important in mixed farming
- 4) feudal classes consist of several tribal or ethnic divisions

22- The passage implies that -----.

- 1) agricultural practices can stay the same from region to region
- 2) collective labour in Africa used to be called kounbit
- 3) land owners do not usually possess small parcels of land
- 4) tenancy reforms in Egypt did not always have good results

23- It is stated in the passage that -----.

- 1) farms are managed by nuclear families and exchanges in Haiti
- 2) the tapu involved temporary rent of state-owned arable land
- 3) herding of livestock is a very common agrarian system today
- 4) agrarian reform in the 20th century was limited to the rural poor

24- According to the passage, -----.

- 1) eskouads were based on a peasant's labour as an individual
- 2) efficient rent control results in better minimum wage legislation
- 3) agrarian systems may develop based on migratory herding
- 4) communism in the 20th century led to agrarian socialism

25- The word 'reciprocal' in the passage (underlined) is closest to -----.

- 1) 'straight'      2) 'shared'      3) 'exclusive'      4) 'dependent'

### PASSAGE 3:

Arable land is land *capable* of being ploughed and used to grow crops. In modern agriculture, however, as at the Food and Agriculture Organization (FAO), Eurostat, and the World Bank, "arable land" is a term of art meaning land that is *actually* being farmed (at minimum every five years) with crops that are sown and harvested within the same agricultural year. Arable land actually under crops in the present year is known as sown land or cropped land. The amended definition is preferred by the agencies because it distinguishes cultivable land that *could* be used to raise such annual crops but is instead devoted to "permanent cropland": for example, vineyards, orchards, and farms and plantations growing coffee, rubber, or nuts. Land which is unsuitable for arable farming usually has at least one of the following deficiencies: no source of fresh water; too hot (desert); too cold (Arctic); too rocky; too mountainous; too salty; too rainy; too snowy; too polluted; or too nutrient poor. Clouds may block the sunlight plants need for photosynthesis, reducing productivity. Starvation and nomadism often exists on marginally arable land. Non-arable land is sometimes called wasteland, badlands, worthless or no man's land. However, non-arable land can sometimes be converted into arable land. New arable land makes more food, and can reduce starvation. This outcome also makes a country more self-sufficient and politically independent, because food importation is reduced. Making non-arable land arable often involves digging new irrigation canals and new wells, aqueducts, desalination plants, planting trees for shade in the desert, hydroponics, fertilizer, nitrogen fertilizer, pesticides, reverse osmosis water processors, PET film insulation or other insulation against heat and cold, digging ditches and hills for

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

protection against the wind, and greenhouses with internal light and heat for protection against the cold outside and to provide light in cloudy areas.

26- It is stated in the passage that -----.

- 1) most crops are sown and harvested in the same year
- 2) no man's land is the same as non-arable land
- 3) Arctic areas are usually too rocky for farming
- 4) internal light is often used in efficient farming

27- We understand from the passage that -----.

- 1) cultivable land is technically used only for annual crops
- 2) trees are planted near aqueducts in large industrial plantations
- 3) new arable land helps a country become politically independent
- 4) arable land is land that is actually farmed over a five year period

28- Which of the following is NOT mentioned in the passage as a factor leading to making non-arable land arable?

- 1) reverse osmosis water processors
- 2) hydroponics
- 3) desalination plants
- 4) pest-resistant soil

29- The passage mentions that -----.

- 1) land which is too rainy is not suitable for arable farming
- 2) farming productivity may in fact increase with less sunlight
- 3) there can be ditches and hills inside large greenhouses
- 4) nomadism exists only on extremely non-arable land

30- The word 'insulation' in the passage (underlined) is best related to -----.

- 1) 'spread'
- 2) 'mixture'
- 3) 'protection'
- 4) 'nutrition'

## حافظت خاک و آبخیزداری:

- ۳۱- کاربرد رابطه  $y_2 = 16,76k_2$  و پارامترهای تعیین کننده مقدار  $k_2$  به ترتیب کدام موارد است؟

(۱) تعیین عامل خاک در روش MPSIAC درصد سیلت + شن ریز، درصد شن، درصد مواد آلی، ساختمان خاک، قابلیت هدایت آب

(۲) تعیین عامل رواناب در روش PSIAAC. درصد ارتفاع رواناب سالیانه + ۵۰ برابر دبی حداکثر لحظه‌ای سالیانه

(۳) تعیین ضریب فرسایش‌پذیری در معادله MUSLE. بافت، ساختمان، خاک

(۴) تعیین ضریب فرسایش‌پذیری در معادله USLE. بافت، ساختمان، درصد املاح و نفوذپذیری خاک

- ۳۲- کدام جمله در رابطه با تعیین حجم دریاچه سد با استفاده از منحنی مجموع جریان، درست است؟

(۱) منحنی مجموع جریان در تعیین حجم دریاچه سد استفاده نمی‌شود.

(۲) با هر تعداد سال آماری و هر گونه تغییرات دبی از نقاط حداکثر و حداقل خطوط به موازات خط میزان جریان ترسیم و بر اساس آن حجم مخزن سد تعیین می‌شود.

(۳) چنانچه تعداد سال‌های آماری مشخص نباشد و تغییرات دبی نیز محسوس نباشد، از نقاط حداکثر و حداقل متولی خطوطی به موازات خط مصرف تعیین و بزرگترین فاصله قائم دو خط متولی را معادل حجم مخزن سد در نظر می‌گیرند.

(۴) چنانچه در ایستگاه معین تعداد سال‌های آماری مناسب و تغییرات دبی رودخانه در سال‌های متولی محسوس نباشد از نقاط حداکثر و حداقل متولی خطوطی به موازات خط مصرف تعیین و بزرگترین فاصله قائم دو خط متولی را معادل حجم مخزن سد در نظر می‌گیرند.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

- ۳۳- موارد کاربرد معادلات  $Q_s = 18/6 e^{(0.36R)} \cdot 252 e^{(0.36R)}$  و  $Q_s = 18/6 e^{(0.36R)} \cdot 252 e^{(0.36R)}$  به ترتیب کدام است؟

(۱) هر دو یکی هستند.

(۲) هر دو برای محاسبه فرسایش ویژه در روش MPSIAC

(۳) هر دو برای محاسبه رسوب ویژه در روش MPSIAC

(۴) برای محاسبه رسوب ویژه در روش MPSIAC، محاسبه فرسایش ویژه در روش PSIAC

- ۳۴- کدام عوامل در هر دو معادله فورنیه جهت محاسبه هدر رفت خاک مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

$S, P_a, P_w$  (۴)  $P_a, h, S$  (۳)  $h, P_a, P_w$  (۲)  $h, S, P_w$  (۱)

- ۳۵- اندازه‌گیری پارامترهای وزن مخصوص و درصد مقدار رطوبت بعد از عمل متراکم نمودن خاک، جهت تعیین کدام عامل انجام می‌شود؟

(۱) درصد وزن مخصوص حداقل

(۲) درصد تفویض‌ذیری

(۳) درصد رطوبت اپتیمم خاک

- ۳۶- تعیین کاربری اراضی مناسب و ارایه برنامه اصلاحی در آمایش سرزمهین، بر چه اساس صورت می‌گیرد؟

(۱) توان اکولوژیک (۲) بازده اقتصادی (۳) قابلیت خاک (۴) عوامل اقلیمی

- ۳۷- محل عمل نیروی زه در سدهای خاکی، کدام است؟

(۱) عمود بر بدن پایاپ سد

(۲) عمود بر جهت جریان


- ۳۸- با توجه به فرمول محاسبه حجم پشت سد، تغییرات کدام پارامتر، افزایش بیشتری را در حجم پشت سد باعث می‌شود؟

(۱) شب حد رسوبات

(۲) ارتفاع مغاید سد

(۳) عرض آبراهه (کف بستر)

- ۳۹- به منظور محاسبه سرعت در محل نقطه A (دایره توپر) با جریان از نوع متغیر از چه روشی می‌توان استفاده نمود؟



$$\bar{u} = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} \quad (1)$$

$$\bar{u} = \sqrt[3]{u^2 + v^2 + w^2} \quad (2)$$

(۳) دو نقطه‌ای

(۴) یک نقطه‌ای

- ۴۰- کدام مورد، با توجه به قانون ارشمیدس با افزایش وزن مخصوص آب، برای یک قلوه سنگ داخل آب درست نیست؟

(۱) اندازه بردار معرف نیروی وزن افزایش می‌باید. (۲) نیروی عمود بر سطح تماس کاهش می‌باید.

(۳) وزن قلوه سنگ در آب کاهش بیشتری دارد. (۴) وزن آب هم حجم قلوه سنگ افزایش می‌باید.

- ۴۱- معادله Henin در رابطه با کنترل فرسایش، کدام است؟

$$E = \frac{IPS}{KV} \quad (4) \quad E = \frac{KV}{IPS} \quad (3) \quad E = \frac{IPK}{VS} \quad (2) \quad E = \frac{PKS}{VI} \quad (1)$$

- ۴۲- مقدار فشار هیدررواستاتیک در کف سریز یک سد اصلاحی که آب از روی سریز آن عبور می‌کند، کدام است؟

$$\gamma h \quad (4) \quad \gamma e \quad (3) \quad \gamma a \quad (2) \quad \gamma \left( ah - \frac{a^2}{2} \right) \quad (1)$$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۴۳- کدام SDR برای نرخ رسوب دهی حوزه آبخیزی با مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع با پوشش مرتع فقیر و میانگین بارش سالیانه ۲۳۵ میلی‌متر، درست است؟

- (۱) ۰/۷۸ (۲) ۱/۲۲ (۳) ۱/۲۸ (۴) ۱/۲۵

- ۴۴- در یک سد اصلاحی در صورتی که بردار برآیند دقیقاً از انتهای  $\frac{1}{3}$  وسط قاعده عبور کند، در صورتی که عرض قاعده پایینی سد ۲ متر و وزن سد ۳ تن باشد، حداکثر نیروی فشار به خاک چند  $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$  است و همچنین این سد در چه نوع خاک‌هایی پایدار است؟

- (۱) ۳، در هیچ نوع خاکی قابل قبول نیست.  
(۲) ۳۰، در خاک‌های ریز دانه قابل قبول نیست.  
(۳) ۶۰، در خاک‌های رسی غیرقابل قبول نیست.  
(۴) ۲، در خاک‌های شنی قابل قبول است.

- ۴۵- چنانچه در یک واقعه بارش با جرم  $m$  و سرعت حد  $\frac{m}{s}$ ، پنجاه درصد آن به روانابی با سرعت  $\frac{1}{1}$  تبدیل شود، انرژی جنبشی باران نسبت به رواناب، کدام است؟

- (۱) انرژی جنبشی رواناب ۲۵۶ برابر بزرگتر از انرژی جنبشی باران است.  
(۲) انرژی جنبشی باران ۲۵۶ برابر بزرگتر از انرژی جنبشی رواناب است.  
(۳) انرژی جنبشی باران ۱۲۸ برابر بزرگتر از انرژی جنبشی رواناب است.  
(۴) انرژی جنبشی رواناب ۱۲۸ برابر بزرگتر از انرژی جنبشی باران است.

- ۴۶- شب طولی آبراهه در محل ترازیت، در برآورد کدام پارامتر به کار می‌رود؟

- (۱) سرعت آستانه فرسایش  
(۲) شب حد  
(۳) سرعت آستانه رسوب  
(۴) سرعت حد

- ۴۷- مورد استفاده قانون دارسی، کدام است؟

- (۱) تعیین نوع جریان در دبی‌های سیلانی  
(۲) محاسبه ضریب آبگذری  
(۳) تعیین دبی جریان ورودی به خاک  
(۴) محاسبه ضریب نفوذپذیری

- ۴۸- مواد اتحالی بدست آمده از نمونه‌های آب سطحی در یک رودخانه در ۴ فصل به صورت،  $e_1 = ۰/۱۸ \left( \frac{\text{mg}}{\text{lit}} \right)$

$e_2 = ۰/۱۱ \left( \frac{\text{mg}}{\text{lit}} \right)$ ,  $e_3 = ۰/۳۷ \left( \frac{\text{mg}}{\text{lit}} \right)$ ,  $e_4 = ۰/۲۵ \left( \frac{\text{mg}}{\text{lit}} \right)$  نیز در این

فصول به ترتیب ۳، ۵، ۸ و ۴ باشد و مساحت حوزه آبخیز رودخانه بر اساس نقشه‌های با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ ۱۶۱ cm<sup>۲</sup> باشد. میزان آورد سالیانه رسوب رودخانه، کدام است؟

$$\frac{\text{Ton}}{\text{hr} / \text{y}} \quad (۱)$$

$$\frac{\text{Ton}}{\text{y}} \quad (۲)$$

$$\frac{\text{Ton}}{\text{y}} \quad (۳)$$

$$\frac{\text{Ton}}{\text{hr} / \text{y}} \quad (۴)$$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

-۴۹- ارتفاع بادشکن مهمترین پارامتر ..... به حساب می‌آید در حالیکه عرض بادشکن را ..... تعیین می‌کند.

(۱) میزان تلهاندازی - سرعت باد

(۲) افزایش کارآمدی - سرعت باد

(۳) کاهش سرعت باد - نوع حرکت ذرات

(۴) اندازه منطقه حفاظت شده

-۵۰- در یک سد خشکه چین با ارتفاع کل ۲ متر و شبی بدنه پایاب ۲۵٪ اندازه‌های قاعده کوچک و بزرگ مقطع عرضی سد، به ترتیب چند متر است؟

(۱) ۱/۸ و ۱/۴

(۲) ۱/۵ و ۱/۲

(۳) ۱/۹ و ۱/۴

(۴) ۱/۱ و ۰/۶

-۵۱- جهت بدست آوردن محل اثر نیروی F (عرض مختصاتی نیروی وارد بر سد) نسبت به محل اثر کدام نیرو، گشتاور می‌گیریم؟

F<sub>۲</sub>' (۴)

F<sub>۱</sub> (۳)

F<sub>۲</sub> (۲)

F (۱)

-۵۲- کدام مورد، ضریب تناسب مساحت در محاسبه میزان رسوب‌دهی در روش هیدروفیزیکی است؟

۲ (۴)

$\frac{1}{3}$  (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

-۵۳- کدام مورد، مهمترین اثر off-site (خارج از محل) فرسایش است؟

(۱) کاهش کیفیت منابع آب

(۲) پر شدن بندها

(۳) سیلاب

(۴) کاهش حاصلخیزی آب

-۵۴- در رابطه Muller-Meyer-Peter (محاسبه عمق کنده شدن پای سدها)، ارتفاع ریزش آب مطابق با کدام مورد است؟

(۱) از کف سرریز تا کف آبراهه

(۲) از بالای ارتفاع آب سرریز تا کف آبراهه

(۳) از بالای ارتفاع آب سرریز تا روی سطح آبی که در کانال پشت سد حرکت می‌کند.

(۴) از کف سرریز تا روی سطح آب کانالی که در پشت سد حرکت می‌کند.

-۵۵- کدام مورد، ضروری ترین مقوله قابل توجه در طرح‌های آبخیزداری کشور در شرایط فعلی است؟

(۱) مسائل اقتصادی اجتماعی

(۲) مسائل سیاسی و قانون‌گذاری

(۳) لحاظ تنوع اقلیمی و کاربری ارضی

(۴) تخریب تنوع زیستی و تغییر کاربری

-۵۶- در یک منطقه ۵ مخروط افکنه با شبکهای طولی ۳، ۵، ۶، ۴ و ۳ درصد وجود دارد، برای احداث سدهای اصلاحی در این منطقه، شبی حد رسوبات را چند درصد می‌توان در نظر گرفت؟

(۱) ۱/۳

(۲) ۴/۲

(۳) ۱/۴

(۴) ۲/۱

-۵۷- کدام مورد، مهمترین ماده غذایی قابل هدررفت در اثر فرسایش خاک در حوزه‌های آبخیز است؟

(۱) آهن

(۲) پتاسیم

(۳) فسفر

(۴) ازت

(۱) آهن

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

- ۵۹- در یک سد بتُنی L شکل به ارتفاع ۶ متر، ضخامت سد، طول پاشنه پایاب، ارتفاع زانده عمودی و ارتفاع دیواره تحاتی به ترتیب چند متر است؟
- (۱) ۱، ۰/۸، ۱، ۰/۹، ۱، ۰/۶  
(۲) ۱، ۰/۹، ۱، ۰/۸، ۱، ۰/۷  
(۳) ۱، ۰/۷، ۱، ۰/۸، ۱، ۰/۹  
(۴) ۱، ۰/۹، ۱، ۰/۸، ۱، ۰/۷
- ۶۰- کدام عوامل در تعیین فاصله بین دو ردیف بادشکن دخالت دارد؟
- (۱) فقط ارتفاع بادشکن  
(۲) ارتفاع بادشکن و سرعت باد غالب منطقه  
(۳) سرعت باد غالب منطقه، ارتفاع بادشکن، ضریب زیری خاک، عمق خاک  
(۴) ارتفاع بادشکن، میزان تقلیل سرعت باد، شیب و زاویه دامنه تپه‌ها، سرعت باد منطقه، میزان تراکم بادشکن، وضعیت فیزیکی خاک، هدف از احداث بادشکن

## مرتع داری:

- ۶۱- نقشه پوشش زمین چه قسمت‌هایی از اراضی یک حوزه آبخیز را شامل می‌شود؟
- (۱) اراضی کشاورزی دائم  
(۲) محدوده اکوسیستم‌های طبیعی  
(۳) همه اراضی حوزه  
(۴) محدوده مرتع
- ۶۲- اقدام مدیریتی مناسب جهت کنترل حد بهره‌برداری مجاز در واقع کدام است؟
- (۱) کنترل تطابق نوع دام چراکننده با پوشش غالب مرتع  
(۲) توجه به نوع گونه‌های همراه مرتع از نظر خوش‌خوارکی  
(۳) کنترل زمان ورود دام به مرتع  
(۴) کنترل زمان توقف دام در مرتع
- ۶۳- در کدام مدل چرای دام یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تغییرات پوشش گیاهی است؟
- (۱) مدل حال و انتقال  
(۲) مدل توالی مرتع  
(۳) مدل سلامت مرتع  
(۴) مدل آستانه
- ۶۴- کدام یک مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر انرژی مورد نیاز دام در حالت نگهداری است؟
- (۱) تحرک دام  
(۲) کیفیت علوفه  
(۳) نوع رژیم غذایی  
(۴) وزن بدن
- ۶۵- کدام مورد در مناطق شیب‌دار باعث محدودیت چرا می‌شود؟
- (۱) پایداری خاک  
(۲) طول دامنه  
(۳) عمق خاک  
(۴) یافت خاک
- ۶۶- کدام یک از انواع کربوهیدرات‌ها، می‌تواند برای جرمان اثر چرای دام مورد استفاده قرار گیرد؟
- (۱) سلولز  
(۲) نشاسته  
(۳) لیگنین  
(۴) همی‌سلولز
- ۶۷- چه ارتباطی بین حد بهره‌برداری مجاز، ارزش رجحانی و ضریب مصرف علوفه وجود دارد؟
- (۱) حد بهره‌برداری مجاز همان ضریب مصرف است.  
(۲) ارزش رجحانی معمولاً بیشتر از ضریب مصرف است.  
(۳) حد بهره‌برداری معمولاً بیشتر از ضریب مصرف است.  
(۴) ضریب مصرف از مقایسه حد بهره‌برداری مجاز و ارزش رجحانی محاسبه می‌شود.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۶۸- سیستم چرای تناوبی تأخیری در مرتعی اجرا می شود که:

- (۱) پوشش گیاهی و خاک مرتع در اثر استفاده های شدید در حالت قهقرا است.
- (۲) گیاهان مرغوب در مرتع وجود دارند اما امکان زادآوری پیدا نمی کنند.
- (۳) مرتع توسط گیاهان مرغوب کشت نشده است.
- (۴) مرتع بر اثر آتش سوزی تخریب شده است.

- ۶۹- کدام عامل بیشترین محدودیت را در مرتع جنوب شرقی ایران، در چرای دام از مرتع ایجاد می کند؟

- (۱) توفان های شن
- (۲) گرمای هوا
- (۳) کمبود منابع آب شرب دام
- (۴) گیاهان شور پسند

- ۷۰- در اغلب گیاهان مرتعی با پیشرفت مراحل رشد از چه فاکتوری کاسته می شود؟

- (۱) تراکم
- (۲) تولید
- (۳) پوشش
- (۴) خوش خوارکی

- ۷۱- فصل مناسب چرا در اشنان زارها و نوع مناسب دام آن کدام است؟

- (۱) پاییز - شتر
- (۲) بهار - بز
- (۳) پاییز - بز
- (۴) بهار - گوسفند

- ۷۲- در یک تیپ گیاهی، گونه های مختلف گیاهی به چه دلیل دارای خوش خوارکی متفاوت هستند و متأثر از چه عاملی می باشند؟

- (۱) نوع دام چراکننده - زمان چرا
- (۲) نوسانات بارندگی - ویژگی های شیمیایی
- (۳) ویژگی های فیزیکی و شیمیایی - تغییرات فصلی
- (۴) ویژگی های فیزیکی و شیمیایی - نوع هدایت دام

- ۷۳- موانع مکانیکی بازدارنده یکی از مکانیسم های اجتناب از چرا است. کدام مورد خصوصیات مورفولوژیکی با این مکانیسم را بیان می کند؟

- (۱) تجمع ساقه ها، نسبت پنجه های رویشی به زایشی
- (۲) طول و تعداد بین گره ها، زاویه پنجه زنی
- (۳) نوان کششی برگ، وجود آونده ای چوبی
- (۴) ریشک های هوایی و تیغ های گل

- ۷۴- کدام مورد درباره برگ گیاهان علوفه ای در مقایسه با ساقه آنها درست است؟

- (۱) پروتئین خام، هضم پذیری و TDN کمتری دارند.
- (۲) پروتئین خام، فسفر و محتویات سلولی انحلال پذیر بالاتری دارند.
- (۳) مقداری الیاف و لیگنین آنها بیشتر است.
- (۴) پروتئین خام، TDN و محتویات سلولی انحلال پذیر کمتری دارند.

- ۷۵- اگر در مرتعی طی چندین سال فشار چرایی اتفاق بیافتد، به ترتیب کدام تغییرات در این مرتع محتمل است؟

- (۱) شور و قلیایی شدن خاک - کاهش کیفیت علوفه - افزایش گونه های مهاجم
- (۲) افزایش گونه های مهاجم - کاهش کیفیت علوفه - تغییر ترکیب گیاهی
- (۳) کاهش کیفیت علوفه - کاهش درصد پوشش تاجی - تخریب خاک
- (۴) کاهش درصد پوشش تاجی - تغییر ترکیب گیاهی - تخریب خاک

- ۷۶- دام چراکننده از مرتع، وقتی که از ساقه چرا می کند نسبت به برگ با مقاومت چگونه روبرو می شود؟

- (۱) بیشتر
- (۲) کمتر
- (۳) یکسان
- (۴) خیلی زیاد اگر بیشتر باشد.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۷۷- اگر گونه *Artemisia Sieberi*، ۴۰ درصد ترکیب پوشش و ۲۰ درصد تولید مرتعی را داشته باشد و درصد تاج پوشش این گونه ۲۰ درصد و میزان تولید قابل استفاده این گونه ۱۰ گرم بر مترمربع باشد، درصد تاج پوشش و تولید این مرتع چقدر است؟
- (۱) ۶۰ - ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار تولید  
(۲) ۵۰ - ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار تولید  
(۳) ۶۰ - ۵۰ گرم بر مترمربع تولید  
(۴) ۵۰ - ۲۵ گرم بر مترمربع تولید
- ۷۸- وجود تانن در ترکیب شیمیایی گیاهان مرتعی، موجب چه چیزی می‌شود؟
- (۱) کاهش کیفیت علوفه  
(۲) افزایش کیفیت علوفه  
(۳) افزایش خوشخوارکی و کاهش کیفیت علوفه  
(۴) افزایش خوشخوارکی و کیفیت علوفه
- ۷۹- چرای مشترک انواع دام (گاو، گوسفند، بز و علفخواران وحشی)، باعث چه چیزی می‌شود؟
- (۱) گیاهان بوته‌ای و گراس‌ها بیشتر چربیده می‌شوند و پهنه‌برگان علفی غالباً می‌گردند.  
(۲) بزها باعث تخریب می‌شوند و مرتع به طور غیریکنواخت چربیده می‌شود.  
(۳) باعث توزیع بهتر دام، استفاده بیشتر از گیاهان و پهنه‌برداری یکنواخت‌تر مرتع می‌گردد.  
(۴) در یک منطقه واحد، امکان چرای انواع مختلف دام وجود ندارد.
- ۸۰- هدف اصلی از استفاده مدل حال و انتقال در اکوسیستم‌های مرتعی کدام است؟
- (۱) تفسیر صحیح تغییرات پوشش گیاهی و وضعیت در مرتع مناطق خشک و نیمه خشک  
(۲) افزایش تولید علوفه به منظور بهبود ظرفیت مرتع  
(۳) تغییر پوشش گیاهی به سمت کلیماکس و یا رسیدن به تولید مرحله زیر کلیماکس  
(۴) بیان دلایل تغییر درصد تاج پوشش گیاهی در اکوسیستم‌های مرتعی
- ۸۱- به فرایندی که در آن گیاهان مرتعی به گونه‌های بیشتر قادر به زنده ماندن تحت مجموعه شرایط محیطی معین باشند، چه می‌گویند؟
- (۱) مقاومت  
(۲) فرم رویشی  
(۳) سازگاری  
(۴) رقابت
- ۸۲- شدت دامگذاری در مرتع، چه رابطه‌ای با سود حاصل برای مرتع دارد؟
- (۱) کاهش، سپس افزایش  
(۲) همیشه افزایش  
(۳) خطی  
(۴) غیرخطی
- ۸۳- قوی ترین مواد سمی در گیاهان مرتعی کدام است؟
- (۱) کربوهیدرات‌ها  
(۲) آلکالونیدها  
(۳) گلیکوزیدها  
(۴) نیترات‌ها
- ۸۴- کدام مورد، اثر شوری آب و علوفه است؟
- (۱) باعث افزایش دفعات شرب کلیه دامها می‌شود.  
(۲) بر دامهای غیرمولد تأثیری ندارد ولی دامهای شیرده و آستان را متأثر می‌سازد.  
(۳) بر دامهای بزرگ جنه تأثیر دارد اما بر دامهای سبک تأثیری ندارد.  
(۴) در مناطق بیابانی به دلیل سازگاری دامها تأثیر چندانی بر عملکرد دامها ندارد.
- ۸۵- کدام مورد از ویژگی‌های مکان‌هایی که دام چراکننده از مرتع، از چرا در آن‌ها اجتناب می‌کنند، است؟
- (۱) تپه ماهوری و نزدیک به سایبان  
(۲) چرای زیاد در قبل - حجم زیاد علوفه  
(۳) کیفیت علوفه پایین، غیرقابل دسترسی برای دام  
(۴) قابل دسترسی برای دام - کم بودن کیفیت علوفه

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

- ۸۶- در تنظیم برنامه مدیریت مرتع، آگاهی از خصوصیات شیمیایی خاک در چه مواردی بیشتر اهمیت دارد؟

- (۱) انتخاب نوع دام چراکننده از مرتع
- (۲) اصلاح مرتع و کودپاشی در مرتع
- (۳) فواصل مناطق شرب آب دام
- (۴) انتخاب سیستم چرائی

- ۸۷- کدام گونه‌های گیاهی با توجه به تنوع ترکیب گیاهی برای ارزیابی شدت چرا در مرتع، مورد توجه قرار می‌گیرد؟

- (۱) گونه‌های گراس با مواد مؤثر دارویی زیاد
- (۲) گونه‌های چند ساله و نادر
- (۳) هر گونه گیاهی که در ترکیب گیاهی غالب باشد.

(۴) گونه‌های خوش خوراک با تولید بالا و چند ساله در ترکیب گیاهی

- ۸۸- چه انتظاری از یک روش مرتع داری خوب دارید؟

- (۱) جلوگیری از تخریب و ارتقاء وضعیت مرتع
- (۲) کاهش تخریب و افزایش تنوع پوشش گیاهی
- (۳) افزایش تراکم گیاهان در ترکیب گیاهی
- (۴) جلوگیری از هدر رفت علوفه و کاهش مقدار دام موجود در مرتع

- ۸۹- شاخص‌های عملکرد مرتع در روش **Landscape Function Analysis** ، کدام است؟

- (۱) عملکرد هیدرولوژیک، چرخه مواد غذایی، سلامت موجودات زنده
- (۲) عملکرد هیدرولوژیک، سلامت موجودات زنده، پایداری خاک
- (۳) نفوذپذیری، لاسبرگ، درصد تاج پوشش
- (۴) پایداری، چرخه مواد غذایی، نفوذپذیری

- ۹۰- دو گونه خوش خوراک گندمی و یک گونه خوش خوراک از تیره اسفناجیان مرتع مناطق نیمه استپی کدام است؟

*Slasola crassa , Poa bulbosa , Stipa capansis* (۱)

*Eurotia ceratoides , Bromus tomentellus , Festuca ovina* (۲)

*Stipa barbata , Atriplex lentiformis , Poa bulbosa* (۳)

*Noaea mucronata , Poa bulbosa , Agropyron trichophorum* (۴)

## هیدرولوژی کاربردی:

- ۹۱- در کدام روش محاسبه زمان تمرکز، ضریب زبری مانینگ یک فاکتور مؤثر می‌باشد؟

- (۱) رانتز
- (۲) کریچ
- (۳) ماکوس
- (۴) دورو - راگان

- ۹۲- کدام یک در رابطه با هیدروگراف واحد یک حوزه آبخیز درست است؟

- (۱) هیدروگراف‌های معرفی هستند که ارتفاع رواناب ناشی از آنها یک واحد است و از آن می‌توان برای مطالعات سیل استفاده نمود.

(۲) هیدروگرافی است که از آن می‌توان برای تهیه سایر هیدروگراف‌های آبخیز استفاده نمود.

(۳) هیدروگراف معرفی است که از آن می‌توان برای مطالعات سیل استفاده نمود.

(۴) هیدروگراف معرفی است که ارتفاع رواناب ناشی از آن دو واحد است.

- (۵) در آزمایشات معمول نفوذ، قطر حلقه‌های نفوذسنجد، مقدار کوبیده شدن در خاک و فاصله بین دو حلقه به ترتیب از راست به چپ چند سانتی‌متر است؟

(۱) ۱۵-۱۰-۴۰-۳۰ (۲) ۵-۱۰-۴۰-۳۰ (۳)

(۴) ۱۰-۱۵-۵۰-۳۰ (۵) ۱۵-۱۵-۶۰-۳۰

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

- ۹۴- بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، میزان سختی آب شرب بر حسب میلی‌گرم بر لیتر باید کمتر از کدام مقدار باشد؟

(۱) ۲۰ (۲) ۸۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۲۰۰۰

- ۹۵- کدام یک از روابط زیر، برای تعیین حجم آب ذخیره در یک حوزه آبخیز استفاده می‌شود؟

$$Q_t = Q_0 \cdot e^{-\alpha t} \quad (۱) \quad \int_0^{\infty} Q_t \cdot dt = \frac{Q_0}{\alpha} \quad (۲) \quad Q_t = Q_0 \cdot K_T^t \quad (۳) \quad \int_0^{\infty} S_t \cdot dt = \frac{S_0}{\alpha} \quad (۴)$$

- ۹۶- در مراتع مناطق خشک، کدام عوامل در محاسبه شماره منحنی از طریق نمودار به کار می‌روند؟

(۱) ارتفاع هوموس و فشرده‌گی خاک

(۲) ارتفاع لاشبرگ و ضخامت هوموس

(۳) شدت چرا و شدت پهنه‌برداری

(۴) تراکم پوشش گیاهی و گروه‌های هیدرولوژیکی خاک

- ۹۷- توزیع مجانبی و بیبول نوع سوم، برای کدام مورد زیر استفاده می‌شود؟

(۱) محاسبه مقادیر متوسط بارشی

(۲) محاسبه مقادیر متوسط دبی

(۳) بررسی مقادیر حداقل دبی و بارشی

(۴) محاسبه مقادیر متوسط دبی و بارشی

- ۹۸- در کدام نوع توزیع ضریب چولگی لگاریتمی استفاده می‌شود؟

(۱) لوگ پیرسون تیپ III

(۲) لوگ نرمال سه متغیره

(۳) لوگ نرمال

(۴) گاما

- ۹۹- در رابطه ((Q\_P = Q\_{max}(1 + 2,66A^{-0.3}))، به ترتیب نشان‌دهنده کدام است؟


(۱) دبی اوج سیلان، دبی اوج ۲۴ ساعته

(۲) دبی اوج ۲۴ ساعته، دبی اوج لحظه‌ای

(۳) دبی اوج سیلان، دبی اوج لحظه‌ای

(۴) دبی اوج لحظه‌ای، دبی اوج ۲۴ ساعته

- ۱۰۰- کدام یک از گزینه‌های زیر، معرف اثر شکل حوزه آبخیز بر شکل آب نمود می‌باشد؟



- ۱۰۱- کیفیت کدام یک از نمونه‌های آب زیر، از نظر کشاورزی بهتر از سایر گزینه‌ها است؟

(۱) C\_1S\_4 (۲) C\_2S\_3 (۳) C\_3S\_2 (۴) C\_4S\_1

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۰۲- بر اساس پیشنهاد انجمن منابع آب آمریکا، آزمون داده‌های پرت، برای داده‌های کم، در چه شرایطی صورت می‌گیرد؟
- (۱) سطح اطمینان ۱۰درصد  
(۲) ضریب چولگی بین ۰/۴ و ۰/۵  
(۳) ضریب چولگی کمتر از ۰/۴  
(۴) ضریب چولگی بیشتر از ۰/۷
- ۱۰۳- کدام یک، در مورد نمونه‌برداری رسوب معلق در رودخانه‌ها درست است؟
- (۱) نمونه‌برداری باید با فواصل منظم زمانی انجام گیرد.  
(۲) نمونه‌برداری باید هم الگو با اندازه‌گیری دلی انجام گیرد.  
(۳) نمونه‌برداری باید در زمان اوج دلی انجام گیرد.  
(۴) نمونه‌برداری باید هم الگو با اندازه‌گیری دلی و با فواصل منظم زمانی انجام گیرد.
- ۱۰۴- روش مناسب‌تر تعزیز و تحلیل سیلاب در حوزه آبخیزی با مساحت ۶۰۰،۰۰۰ هکتار، کدام است؟
- (۱) آنالیز منطقه‌ای سیلاب (۲) هیدروگراف واحد (۳) روش استدلالی (۴) روش شماره منحنی
- ۱۰۵- دلی با دوره برگشت معین در موقعی که تعداد سال‌های آماری محدود بوده و مثلاً کمتر از  $x$  سال باشد را، می‌توان از چه موردی برآورد نمود؟
- (۱) ۱۰ - روابط ترسیمی تجربی  
(۲) ۱۰ - سری‌های جزئی  
(۳) ۳۰ - سری‌های جزئی
- ۱۰۶- در صورتی که شاخص‌های  $\emptyset$  و  $W$  با هم برابر باشند، کدام حالت زیر را می‌توان استنباط نمود؟
- (۱) شاخص  $W$ ، حداقل (۲) شاخص  $W$ ، صفر (۳) شاخص  $\emptyset$ ، صفر (۴) شاخص  $\emptyset$ ، حداکثر
- ۱۰۷- در رابطه تجربی فولر،  $\beta$ ، به کدام مورد زیر اشاره می‌کند؟
- (۱) ضریب دوره بازگشت ناحیه‌ای (۲) ضریب جریان منطقه‌ای  
(۳) ضریب طغیان منطقه‌ای (۴) ضریب رواناب منطقه‌ای
- ۱۰۸- روش اشتایدر، برای تخمین کدام هیدروگراف و دارای چند عامل است؟
- (۱) واحد و ۳ (۲) کل و ۳ (۳) سیل و ۵ (۴) واحد و ۵
- ۱۰۹- رابطه  $N = 0.8A^{0.2}$ ، به چه منظور استفاده می‌شود؟
- (۱) تعیین طول دوره آماری مناسب (۲) تعزیز هیدروگراف  
(۳) سنجش کفایت داده‌ها (۴) بررسی همگنی داده‌ها
- ۱۱۰- کدام گزینه، در رابطه با فرمول  $Q_{max} = \frac{2/0.82A.Q}{tp}$  درست است؟
- (۱) رابطه SCS در برآورد دلی اوج و A مساحت بر حسب کیلومتر مربع  
(۲) رابطه SCS در برآورد دلی متوسط و A مساحت بر حسب کیلومتر مربع  
(۳) رابطه فولر در برآورد دلی اوج و A مساحت بر حسب هکتار  
(۴) رابطه SCS در برآورد دلی اوج و A مساحت بر حسب هکتار
- ۱۱۱- مقدار TDS در آب اشباع از نمک طعام، چند میلی گرم بر لیتر است؟
- (۱) ۳۰۰ (۲) ۱۵۰۰۰۰ (۳) ۳۰۰۰۰۰ (۴) ۶۴۰۰۰
- ۱۱۲- حداکثر مقدار ضریب کریگر، پیشنهادی برای تمام نقاط دنیا، چقدر است؟
- (۱) ۱۰۰ (۲) ۲۰۰ (۳) ۲۰ (۴) ۲/۳۳

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

۱۱۳ - رابطه  $P = \frac{m - o / 44}{n + o / 22}$ ، توسط چه فردی برای محاسبه درصد احتمال تجربی ارائه شده است؟

- (۱) ویبول (۲) هیزن (۳) توکی (۴) گرینگورتن

۱۱۴ - شب شاخه خشکیدگی هیدروگراف، برای حوزه‌های با مساحت کم دارای چه وضعیتی است؟

- (۱) زیاد (۲) کم (۳) ثابت

(۴) مشابه با شب شاخه بالارونده

۱۱۵ - بارشی به مدت ۵ ساعت و به مقدار ۳۰ میلی‌متر در آبخیزی با شماره منحنی ۸۰ باریده است. درصورتی که در ۴ ساعت اول بارش، عمق بارش ۲۰ میلی‌متر بوده باشد، رواناب مستقیم حاصل از این بارش در یک ساعت آخر این رگبار چند میلی‌متر است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۲/۷ (۳) ۲/۹۵ (۴) ۰/۱۲

۱۱۶ - مختصات یک هیدروگراف واحد ۴ ساعته، مطابق جدول زیر است. مختصات هیدروگرافی سیلابی که ناشی از یک بارش مازاد ۴ ساعته بوده و دبی اوج آن، ۲۵۵ متر مکعب بر ثانیه و آب پایه آن، ۳۰ متر مکعب بر ثانیه باشد، کدام است؟

دبي (hr)	زمان (hr)	
( $\frac{m^3}{s}$ )		
۰	۰	۰, ۱۵, ۲, ۴۱, ۸, ۱۱۴, ۲۲۸, ۲۸۵, ۳۰ (۱)
۱۵۰	۴	۳۰, ۵۰, ۶۳, ۱۲۰, ۲۱۰, ۲۵۵, ۳۰ (۲)
۱۲۰	۸	۰, ۲۰, ۳۳, ۹۰, ۱۸۰, ۲۲۵, ۳۰ (۳)
۶۰	۱۲	۳۰, ۵۰, ۶۰, ۱۲۰, ۲۱۰, ۲۵۵, ۳۰ (۴)
۲۲	۱۶	
۸	۲۰	
۰	۰	

۱۱۷ - فاصله زمانی بین مرکز ثقل بارش مازاد و هیدروگراف را ..... می‌نامند و غالباً در مطالعات ..... به جای آن را مدنظر قرار می‌دهند.

- (۱) زمان تأخیر - سیل - زمان تمرکز (۲) زمان تمرکز - سیل - زمان تأخیر

- (۳) زمان تأخیر - سیل - زمان تأخیر تا اوج (۴) زمان تأخیر - سیل - زمان تأخیر تا اوج

۱۱۸ - فرض‌های اساسی تئوری هیدروگراف واحد توسط چه کسی مطرح و به ترتیب کدام است؟

- (۱) شرمن - عکس‌العمل خطی و عدم تغییرپذیری با زمان

- (۲) شرمن - عکس‌العمل خطی و تغییرپذیری با زمان

- (۳) هورتن - عکس‌العمل خطی و عدم تغییرپذیری با زمان

- (۴) کریگر - عکس‌العمل غیرخطی و تغییرپذیری با زمان

۱۱۹ - درصورتی که مدت زمان لازم برای تأمین ذخایر اولیه یک حوزه آبخیز با زمان تمرکز ۶ ساعت، برابر ۵ ساعت باشد، هیدروگراف واحد حاصل از یک بارش ۶ ساعته روی آن، چند ساعت است؟

- (۱) صفر (۲) یک (۳) پنج (۴) شش

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۷

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

۱۲۰- تعداد هیدروگراف لازم برای ثبات دبی در روش منحنی S برای یک هیدروگراف واحد ۳ ساعته با زمان پایه ۱۵ ساعت چقدر و دبی تقریبی حاصل از آن برای یک حوزه آبخیز به مساحت ۱۰۰ کیلومترمربع، تقریباً چند مترمکعب بر ثانیه است؟

- (۱) ۱۵ و ۳۰۰      (۲) ۳ و ۱۰۰      (۳) ۵ و ۱۰۰      (۴) ۵ و ۳۰۰

## ژئومورفولوژی و زمین‌شناسی:

۱۲۱- کدام مورد، نماینده تفاوت دشت‌سرهای مناطق بیابانی است؟

- (۱) سن رسوبات دشت‌سر فرسایشی بیشتر از دشت‌سر پوشیده است.

- (۲) عمق رسوبات دشت‌سر اپانداز از پوشیده بیشتر است.

- (۳) گردشگی رسوبات دشت‌سر پوشیده کمتر از دشت‌سر فرسایشی است.

- (۴) از کوهستان به سمت دشت‌سر پوشیده سن مواد زمین‌شناسی بیشتر می‌شود.

۱۲۲- مهم‌ترین ناهمواری‌های کارستی در کدام یک از مناطق ایران است و چه اهمیتی در منابع طبیعی دارند؟

- (۱) شرق و جنوب شرق - تأمین آب شرب      (۲) البرز - فروریزش زمین

- (۳) ایران مرکزی - تغذیه آب زیرزمینی      (۴) زاگرس - ایجاد منابع آب

۱۲۳- کدام نوع از کانی‌ها، مهم‌ترین کانی‌های گرانیت می‌باشند؟

- (۱) بیوتیت، فلدسپات کلسیم‌دار و ارتوز      (۲) کوارتز، آمفیبل، آورتیت

- (۳) فلدسپات پتاسیم‌دار، کوارتز، بیوتیت و آمفیبل      (۴) فلدسپات کلسیم‌دار، پیروکسن، بیوتیت و آمفیبل

۱۲۴- رسوبات کوهرفتی در کدام مناطق ایران پراکنش بیشتری دارند؟

- (۱) مرطوب      (۲) خشک      (۳) نیمه خشک      (۴) نیمه مرطوب

۱۲۵- منظور از Driving Force در ژئومورفولوژی کدام است؟

- (۱) تکتونیک، آشفتشان، نقل

- (۲) هوازدگی، فرسایش، اقلیم

- (۳) نقل، اقلیم، تکتونیک

۱۲۶- کدام یک از مشخصه‌های زیر جزو ویژگی ضروری سازند به حساب نمی‌آید؟

- (۱) مقطع نمونه و نام

- (۲) واحد سنگ چینه‌شناسی

- (۳) سن معین و مشخص

۱۲۷- در ساختار رتبه‌بندی هورتون و استرالر کدام آبراهه‌ها دارای رتبه کاملاً مشابه هستند؟

- (۱) آبراهه‌های کوتاه رتبه یک و آبراهه اصلی در خروجی

- (۲) آبراهه‌های بلند رتبه یک و آخرين آبراهه اصلی در خروجی

- (۳) آبراهه‌های رتبه ۱ و رتبه آخر در خروجی

- (۴) آبراهه‌های رتبه ۲ و آبراهه خروجی حوضه

۱۲۸- معادله عمومی محاسبه فاکتور امنیت شیب دامنه‌ها (FS) و مقدار عددی آن کدام است؟ ( $\alpha$  شیب دامنه)

$$FS = \frac{W \cos \alpha}{W \sin \alpha} \quad (۱)$$

$$FS = \frac{LW \cos \alpha}{KW \sin \alpha} \quad (۲)$$

$$FS = \frac{KW \cos \alpha}{LW \sin \alpha} \quad (۱)$$

$$FS = \frac{W \sin \alpha}{W \cos \alpha} \quad (۳)$$

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

۱۲۹- کدام مورده، مهم‌ترین علت حرکت صفحات پوسته زمین است؟

(۱) رسوب‌گذاری در چاله‌های اقیانوسی و دیاژنز سنگی

(۲) زون بنیوف و فوران آتشفسانی

(۳) تجزیه مواد رادیواکتیو و کتوکسیون مانگما

(۴) چین خوردگی و گسل خوردگی در سطح قاره‌ها

۱۳۰- آتشفسان نوع هاوایی به کدام صورت است؟

(۱) سیال و سیری شکل

(۳) خاکستردار و بسیار چسبنده

(۴) فومولی و خروجی گاز شدید

۱۳۱- ناپیوستگی کنراد در کدام لایه زمین قرار دارد و مواد دو طرف آن در کدام ویژگی با یکدیگر متفاوت می‌باشند؟

(۱) آستنوسفر، گرانزوی

(۲) پوسته، ترکیب شیمیایی

(۴) گوشه، حالت مواد

۱۳۲- کدام تقسیم‌بندی علم ژئومورفولوژی از دیدگاه کاربردی در منابع طبیعی اهمیت بیشتری دارد؟

(۱) شهری (۲) جهانی (۳) توصیفی (۴) دینامیک بیرونی

۱۳۳- مهم‌ترین عامل در ایجاد فرسایش‌های شیاری، آبراهه‌ای و بدلندي به همراه رابطه آن کدام است؟

(۱) توان جریان آب -  $\gamma$ .R.S

(۲) توان برخی رواناب -  $\gamma$ .Q.S

(۳) توان جریان رودخانه -  $\gamma$ .R.S

(۴) توان برخی جریان -  $\gamma$ .Q.S

۱۳۴- میکروژلی فراکسیون حاصل عملکرد کدام فرایند و نتیجه آن کدام است؟

(۱) یخ‌زدگی و ذوب شدن آب، تشکیل سیلت

(۲) ترمولاستی در گرانیت فشرده، قطعات سنگی

(۳) هیدرولیز در سنگ آهک، ایجاد رس

(۴) هوازدگی نمکی، حفره شدن سنگ

۱۳۵- ناهمواری‌ها و آبراهه رایج در چین خوردگی ژورایی (زاگرسی) کدام موارد می‌باشند؟

(۱) کوه ناآدیسی، دره طاقدیسی، کمب و رُز

(۲) کوه ناآدیسی، دره طاقدیسی، رُز

(۳) کوه طاقدیسی، دره ناآدیسی، رُز

(۴) کوه طاقدیسی، دره ناآدیسی، کمب

۱۳۶- ساخت‌های رسویی ساده کواستا و ژورائی، در کدام زون زمین‌شناسی ایران بیشتر مشاهده می‌شوند؟

(۱) زاگرس (۲) البرز (۳) ایران مرکزی (۴) کوه داغ

۱۳۷- سطح تعادل ایزوفستازیک کدام است و در چه عمقی قرار دارد؟

(۱) پوسته با فشار متفاوت، ۱۰ تا ۳۵ کیلومتری

(۲) لیتوسفر با وزن مساوی، ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتری

(۳) پوسته با ضخامت متفاوت، ۳۰ تا ۶۰ کیلومتری

(۴) لیتوسفر با جرم مساوی، ۲۷۰ تا ۳۰۰ کیلومتری

۱۳۸- سری کانی‌های گلدبیج و سری کانی‌های بوون چه تفاوتی با هم دارند؟

(۱) سری حساسیت به فرسایش، سری اختلاط و ذوب کانی‌ها

(۲) سری مقاومت به هوازدگی، سری تبلور و تفریق کانی‌ها

(۳) سری تبلور و تفریق کانی‌ها، سری مقاومت به فرسایش

(۴) سری رنگ کانی‌ها، سری چگالی کانی‌ها

۱۳۹- لایلی و بمب آتشفسانی به ترتیب با چه قطری بر حسب میلی‌متر تفکیک می‌شوند؟

(۱) ۲۲ (۲) ۲۰ (۳) ۱۶ (۴)

۱۶ (۲) ۲۰ (۳) ۱۶ (۴)

۱۶ (۲)

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۴۰- گوشه‌به‌الایی زمین عمده‌اً مت Shank از کدام مواد می‌باشد؟
- (۱) سولفیدهای فلزی  
(۲) سیلیکات‌های روشن  
(۳) سیلیکات‌های آهن و منیزیم  
(۴) اکسیدهای فلزی
- ۱۴۱- کدام یک جزء سنگ‌های حد واسطه به شمار می‌روند؟
- (۱) میگماتیت، توفیت، سینزیت  
(۲) ژیپس، کوارتزیت، گرانیت  
(۳) سیلت سنگ، آهک، شیل  
(۴) بازالت، آركوز، پریدوتیت
- ۱۴۲- نمودار هولشترم (هیلستروم) چگونه ترسیم می‌شود و چه کاربردی دارد؟
- (۱) محورهای سرعت آب و قطر رسوبات، تعیین مرحله فعالیت رودخانه  
(۲) محورهای سرعت آب و وزن رسوبات، تعیین مرحله تکاملی رودخانه  
(۳) محورهای دبی آب و حجم رسوبات، تعیین مرحله رسوپ‌گذاری رودخانه  
(۴) محورهای انرژی آب و توان جریان، تعیین مرحله مثاندری رودخانه
- ۱۴۳- در فرایند کارستی شدن آهک کدام ویژگی‌ها، موجب تشدید است؟
- (۱) محیط سرد - سنگ ناخالص و غیرمتراکم  
(۲) کاهش گسل خوردگی و افزایش رطوبت  
(۳) درجه خلوص و تخلخل ثالویه بیشتر در سنگ  
(۴) ارتفاع زیاد منطقه و پوشش گیاهی کم
- ۱۴۴- کدام فرایند طبیعی می‌تواند شرایط سطح زمین را مشابه فرایند فرسایش سطحی و پاشمانی نشان دهد؟
- (۱) کربوکلاستی  
(۲) پیپ کراک  
(۳) دری کراست  
(۴) هوازدگی نمکی
- ۱۴۵- در چه شرایطی درجه روانی گدازه بیشتر و چگالی کمتر خواهد شد؟
- (۱) ترکیب آندریتی با سیلیس خیلی زیاد  
(۲) ترکیب رویلیتی بیشتر با گاز بیشتر  
(۳) سیلیس بیشتر - آب کمتر  
(۴) سیلیس کمتر - گاز بیشتر
- ۱۴۶- تغییر عرض برونزه سنگی در سطح زمین به چه عواملی وابسته است؟
- (۱) شیب لایه سنگی، امتداد لایه سنگی، اختلاف ارتفاع زمینی  
(۲) ضخامت لایه سنگی، زاویه شیب زمین، زاویه شیب لایه سنگی  
(۳) سن سازند سنگی، زاویه شیب لایه سنگی، امتداد شیب زمین  
(۴) امتداد لایه سنگی، شیب توپوگرافی، مقاومت فرسایش سازند سنگی
- ۱۴۷- بر روی کدام دامنه احتمال وقوع لغزش بیشتر است؟
- (۱) کنگلومرا و ماسه سنگ، اقلیم نیمه خشک، دامنه موافق  
(۲) شیل و مارن، اقلیم خشک، دامنه موافق  
(۳) شیل و مارن، اقلیم مطروب، دامنه مخالف  
(۴) مارن و شیل، اقلیم مطروب، دامنه موافق
- ۱۴۸- کدام سنگ در اقلیم گرم و مطروب در برابر هوازدگی شیمیایی مقاوم‌تر است؟
- (۱) کوارتزیت  
(۲) آهک  
(۳) شیل  
(۴) مرمر کلسیتی
- ۱۴۹- کدام کانی دارای بیشترین قابلیت جذب آب و مستعد رخداد حرکت‌های توده‌ای است؟
- (۱) کلریت  
(۲) ایلیت  
(۳) کاتولینیت  
(۴) مونت موریونیت
- ۱۵۰- کدام مورد، در سیستم بلورشناسی تراگونال درست است؟
- (۱) تقارن حاده‌ای بین سطوح وجود نیست.  
(۲) سطوح تقارن موجود دارد.  
(۳) محور بلورشناسی درجه شش وجود دارد.  
(۴) اندازه دو محوری بلورشناسی با هم برابرند.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

جامعه‌شناسی روستایی:

۱۵۱- کدام یک از اقسام جامعه روستایی، در گذشته جزء تولید کنندگان خرده کالا در روستا نبوده‌اند؟

- (۱) زارعان صاحب نسق    (۲) خوش‌نشینان    (۳) صنعت‌گران    (۴) معامله‌گران

۱۵۲- از میان بردن نظام سهمی‌بری در مورد باغات، شالیزارها و تاکستان‌ها در چه مرحله‌ای از اصلاحات ارضی اتفاق افتاد؟

- (۱) مرحله دوم اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۳    (۲) مرحله سوم اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۷

- (۳) مرحله اول اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱    (۴) بعد از مرحله سوم اصلاحات ارضی در سال ۱۳۵۲

۱۵۳- قشری از جامعه روستایی در ایران که با سایرین وارد رابطه مُزدوری نشده و تنها با ارباب وارد رابطه مزارعه در تولید کشاورزی می‌شندند، چه نامیده می‌شندند؟

- (۱) گاویندان    (۲) نسقداران خرد پا    (۳) نسقداران توانگر    (۴) خوش‌نشینان

۱۵۴- کدام یک تعریف ده نیست؟

- (۱) ده واحدی کمایش خود کفا است.

- (۲) ده واحدی طبیعی، جغرافیایی و سیاسی است.

- (۳) ده واحدی کمالاً خود مصرفی است.

۱۵۵- کدام مورد، مفهوم خانواده به عنوان محل تولید و مصرف است؟

- (۱) خانواده روستایی به عنوان واحدی با نقش‌های اجتماعی بسته

- (۲) درون‌گرا بودن خانواده‌های روستایی

- (۳) خودکفایی نسبی خانواده‌های روستایی

- (۴) خانواده روستایی به عنوان واحد نامتجانس

۱۵۶- کدام مورد جزء نظام‌های بهره‌برداری انتقالی (پیش و پس از اصلاحات ارضی) محسوب می‌شود؟

- (۱) تعاونی تولیدی

- (۲) واحد کشت و صنعت

- (۳) نظام بهره‌برداری خرده مالکی

- (۴) شرکت سهامی زراعی

۱۵۷- کدام مورد، اهداف راه‌اندازی تعاونی‌های مشاع تولید بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نمی‌باشد؟

- (۱) امکان سرمایه گذاری بیشتر برای تولید

- (۲) استفاده بهتر از ابزارها و ماشین‌آلات کشاورزی

- (۳) توسعه نظام خرده مالکی

- (۴) ایجاد سهولت در عرضه نهاده‌ها و خدمات

۱۵۸- راه حل عقلانی و منطقی جامعه روستایی سنتی در ایران در راستای سازگاری و مقابله با کم آبی و خشکسالی چه بوده است؟

- (۱) اقتصاد دهقانی

- (۲) ایجاد سازمان اجتماعی تولید

- (۳) افزایش دسترسی به مهارت فنی و سرمایه

- (۴) گسترش بازارهای محلی

۱۵۹- کدام در مورد بُنه در واحدهای تولید زراعی درست نمی‌باشد؟

- (۱) بُنه عموماً گاویندان را در جامعه روستایی شامل می‌شود.

- (۲) بُنه در مناطق کم آب رایج بوده است.

- (۳)

- (۴)

بُنه عموماً نسقداران را در یک روستا شامل می‌شود.

بُنه شامل ۶ تا ۱۶ خانوار است.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

۱۶۰- ویژگی‌های زیر به ترتیب مربوط به کدام نظام بهره‌برداری در جوامع روستایی ایران می‌باشند؟

«اقتصاد معیشتی - استفاده از کارگران کشاورزی در سطح وسیع - جدایی کار از سرمایه - یکپارچه‌سازی اراضی»

(۱) بزرگ مالکی، تعاونی مشاع، کشت صنعت، دهقانی

(۲) دهقانی، تعاونی مشاع، کشت صنعت، شرکت سهامی زراعی

(۳) خرد مالکی، کشت و صنعت، کشت و صنعت، شرکت سهامی زراعی

(۴) بزرگ مالکی، کشت و صنعت، مشاع، شرکت سهامی زراعی

۱۶۱- در اجتماعات روستایی فرآیند پویا که وقتی افراد به آن وارد می‌شوند به گونه‌ای از خودآگاهی می‌رسند، قدرت

می‌گیرند و بهتر می‌توانند برای تغییر وضعیت خود اقدام کنند چه نام دارد و اولین گام در دستیابی به این فرآیند

کدام است؟

(۱) توانمندسازی - بسیج منابع اجتماعی

(۲) سرمایه اجتماعی - بسیج منابع اجتماعی

۱۶۲- کدام مورد با ساختمان اجتماعی در جامعه روستایی سنتی در ایران همبستگی کامل دارد؟

(۱) نقش در تولید (۲) تخصص و مهارت (۳) پیوندهای خویشاوندی (۴) نظام زمین‌داری

۱۶۳- پدیده «غیرسازی» در سازمان اجتماعی جوامع روستایی به دنبال کدام مورد شکل می‌گیرد؟

(۱) ایجاد سرمایه اجتماعی

(۲) تشدید سرمایه اجتماعی درون گروهی

(۳) تشدید مطرودیت اجتماعی

۱۶۴- قشری از جامعه روستایی سنتی در ایران که عوامل منقول تولید را در اختیار داشته و اداره امور کشت و زرع را در

غیاب ارباب بر عهده داشته و همتراز با زمین‌داران کوچک بوده است، چه نامیده شده است؟

(۱) گاویندان (۲) نسقداران توانگر (۳) مباشان (۴) خرد مالکان

۱۶۵- در حال حاضر به ترتیب کدام‌یک از اقسام جامعه سنتی در شرایط کنونی از بین رفته و کدام قشر بیشترین درصد

را به خود اختصاص داده است؟

(۱) قشر زارعین صاحب نسق - قشر نسقداران توانگر (۲) قشر زمین‌داران - قشر گاویندان

(۳) قشر رعیت - قشر بی‌زمین

۱۶۶- کدام نوع از زمین مضمول اصلاحات ارضی شدند؟

(۱) باغات و تاکستان‌ها

(۲) مضمول بهره مالکانه

(۳) اراضی موقوفی و خالصه

۱۶۷- کدام مورد در خصوص کوچ درست است؟

(۱) کوچ، حرکت خانواده از یک نقطه به نقطه دیگر به منظور استفاده از منابع طبیعی برای چرای دام است.

(۲) کوچ، به منظور استفاده از منابع طبیعی برای چرای دام صورت می‌گیرد و لزوماً بر مبنای خانواده نمی‌باشد.

(۳) کوچ، با شرکت برخی از اعضای خانواده و به منظور استفاده از منابع طبیعی برای چرا صورت می‌گیرد.

(۴) کوچ به قصد تغییر محل زندگی و به منظور استفاده از منابع طبیعی برای چرای دام صورت می‌گیرد.

۱۶۸- کدام ایل، پر جمعیت‌ترین ایل جامعه عشايری کشور را تشکیل می‌دهد؟

(۱) افشار (۲) شاهسون (۳) بختیاری (۴) فشقابی

۱۶۹- اساس ترکیب اعضاي بنه در گذشته در جامعه روستایی ایران چه بود؟

(۱) رابطه ارباب و رعیتی

(۲) مالکیت عوامل منقول تولید

(۳) موروثی

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۷۰ - کدام مورد در ارتباط با تفاوت میان جامعه شهری و روستایی درست است؟
- (۱) تحرک اجتماعی و کنترل اجتماعی در روستاهای کمتر است.
  - (۲) تحرک اجتماعی و کنترل اجتماعی در روستاهای بیشتر است.
  - (۳) تحرک اجتماعی در روستاهای بیشتر و کنترل اجتماعی کمتر است.
  - (۴) تحرک اجتماعی در روستاهای کمتر و کنترل اجتماعی بیشتر است.
- ۱۷۱ - کدام مورد را قانون اصلاحات ارضی در ایران در پرینتی گیرد؟
- (۱) تغییر شیوه تولید و نظام اجتماعی
  - (۲) تاکستان‌ها، شالیزارها تا ۳۰ هکتار، قلمستان‌ها
  - (۳) تجدید و تعديل مالکیت زمین بین سقداران
  - (۴) زمین‌های ماشینی تا ۵۵ هکتار و شالیزارها تا ۶۰ هکتار
- ۱۷۲ - معیارهای رفتاری در روستاهای ایران با چه عواملی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند؟
- (۱) اقلیم و روابط تولیدی
  - (۲) اقتصاد و مذهب
  - (۳) اقتصاد و روابط تولیدی
  - (۴) اقلیم و سنت
- ۱۷۳ - کدام مورد، در خصوص خانوار روستایی سنتی در ایران درست نمی‌باشد؟
- (۱) کمیت و کیفیت خانواده، تأثیری در پایگاه اجتماعی خانواده روستایی در جامعه ندارد.
  - (۲) یکی از مهمترین کارکردهای خانواده روستایی سنتی، تولید خانوادگی است.
  - (۳) یکی از فاکتورها در تقسیم کار اجتماعی در خانواده روستایی توان فرد در امر تولید است.
  - (۴) محصول تولیدی خانواده روستایی، خواه برای فروش و خواه برای مصرف داخلی، مستلزم کار و فعالیت مشترک همه اعضای خانواده است.
- ۱۷۴ - تعریف زیر بر کدام کارکرد روستایی تأکید دارد؟  
«روستا برآیندی از عناصر طبیعی و عناصر ساخته شده است؛ به گونه‌ای که زمینه سازگاری فرد را با جامعه فراهم می‌آورد و موجب جامعه‌پذیری می‌شود.»
- (۱) کارکرد اقتصادی
  - (۲) کارکرد فرهنگی - روان شناختی
  - (۳) کارکرد اجتماعی - اقتصادی روستا
  - (۴) کارکرد اجتماعی روستا
- ۱۷۵ - کدام عامل در قطعه قطعه بودن اراضی و نظام کشت در ایران مؤثر نمی‌باشد؟
- (۱) گسترش روابط همباری
  - (۲) گسترش نظام خانوادگی
  - (۳) تناوب زراعی
  - (۴) موقعیت طبیعی زمین
- ۱۷۶ - به ترتیب نظریه توسعه درون‌زا به چه مقوله‌ای تأکید دارد و نقطه مقابل کدام نظریه در توسعه روستایی قرار می‌گیرد؟
- (۱) گسترش بازارها - نظریه خرده فرهنگ دهقانی
  - (۲) رشد اقتصادی - نظریه معیشت پایدار روستایی
  - (۳) نهادهای مشارکتی و محلی - نظریه نوسازی
  - (۴) حذف داشت بومی - نظریه توسعه
- ۱۷۷ - کدام عامل در عضویت دهقانان در ساختار بُنه‌ها تأثیر نداشته است؟
- (۱) عمدۀ مالک بودن
  - (۲) داشتن حق نسق
  - (۳) آگاهی از فنون کشاورزی
  - (۴) موافقت ارباب
- ۱۷۸ - کدام مورد، جزو ملاک‌های قشریندی در روستاهای محسوب نمی‌شود؟
- (۱) تصاحب ابزار و وسایل تولید
  - (۲) مالکیت زمین
  - (۳) تنوع در تولیدات کشاورزی
  - (۴) مالکیت دام

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۳

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

۱۷۹- تعداد و وسعت بُندها در هر روستا بر اساس چه عامل یا عواملی تعیین می‌شد؟

(۱) تصمیم جمعی اهالی روستا

(۲) تصمیم ارباب یا کدخدا

(۳) جمعیت و تعداد خانوار ساکن در روستا

(۴) مقدار آب و زمین قابل کشت روستا

۱۸۰- اجرای نظم و ترتیب و نظام خاص استفاده و بهره‌وری از اراضی مزروعی در روستاهای ایران را چه می‌گفتند؟

(۱) عرف

(۲) بُندهایی

(۳) نسق‌بندی

(۴) مزارعه

## اصلاح و توسعه مرتع:

۱۸۱- مهم‌ترین اثر پخش سیلاب کدام است؟

(۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۲) تغییر بافت خاک

(۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۴) موسیلاز

(۵) مان

(۶) لاتکس

(۷) صمن

(۸) افزايش فرسایش

(۹) گاهش

(۱۰) تغییر بافت خاک

(۱۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۲) تغییر بافت خاک

(۱۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۴) موسیلاز

(۱۵) مان

(۱۶) لاتکس

(۱۷) صمن

(۱۸) افزايش فرسایش

(۱۹) گاهش

(۲۰) تغییر بافت خاک

(۲۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۲۲) تغییر بافت خاک

(۲۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۲۴) موسیلاز

(۲۵) مان

(۲۶) لاتکس

(۲۷) صمن

(۲۸) افزايش فرسایش

(۲۹) گاهش

(۳۰) تغییر بافت خاک

(۳۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۳۲) تغییر بافت خاک

(۳۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۳۴) موسیلاز

(۳۵) مان

(۳۶) لاتکس

(۳۷) صمن

(۳۸) افزايش فرسایش

(۳۹) گاهش

(۴۰) تغییر بافت خاک

(۴۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۴۲) تغییر بافت خاک

(۴۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۴۴) موسیلاز

(۴۵) مان

(۴۶) لاتکس

(۴۷) صمن

(۴۸) افزايش فرسایش

(۴۹) گاهش

(۵۰) تغییر بافت خاک

(۵۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۵۲) تغییر بافت خاک

(۵۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۵۴) موسیلاز

(۵۵) مان

(۵۶) لاتکس

(۵۷) صمن

(۵۸) افزايش فرسایش

(۵۹) گاهش

(۶۰) تغییر بافت خاک

(۶۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۶۲) تغییر بافت خاک

(۶۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۶۴) موسیلاز

(۶۵) مان

(۶۶) لاتکس

(۶۷) صمن

(۶۸) افزايش فرسایش

(۶۹) گاهش

(۷۰) تغییر بافت خاک

(۷۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۷۲) تغییر بافت خاک

(۷۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۷۴) موسیلاز

(۷۵) مان

(۷۶) لاتکس

(۷۷) صمن

(۷۸) افزايش فرسایش

(۷۹) گاهش

(۸۰) تغییر بافت خاک

(۸۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۸۲) تغییر بافت خاک

(۸۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۸۴) موسیلاز

(۸۵) مان

(۸۶) لاتکس

(۸۷) صمن

(۸۸) افزايش فرسایش

(۸۹) گاهش

(۹۰) تغییر بافت خاک

(۹۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۹۲) تغییر بافت خاک

(۹۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۹۴) موسیلاز

(۹۵) مان

(۹۶) لاتکس

(۹۷) صمن

(۹۸) افزايش فرسایش

(۹۹) گاهش

(۱۰۰) تغییر بافت خاک

(۱۰۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۰۲) تغییر بافت خاک

(۱۰۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۰۴) موسیلاز

(۱۰۵) مان

(۱۰۶) لاتکس

(۱۰۷) صمن

(۱۰۸) افزايش فرسایش

(۱۰۹) گاهش

(۱۱۰) تغییر بافت خاک

(۱۱۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۱۲) تغییر بافت خاک

(۱۱۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۱۴) موسیلاز

(۱۱۵) مان

(۱۱۶) لاتکس

(۱۱۷) صمن

(۱۱۸) افزايش فرسایش

(۱۱۹) گاهش

(۱۲۰) تغییر بافت خاک

(۱۲۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۲۲) تغییر بافت خاک

(۱۲۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۲۴) موسیلاز

(۱۲۵) مان

(۱۲۶) لاتکس

(۱۲۷) صمن

(۱۲۸) افزايش فرسایش

(۱۲۹) گاهش

(۱۳۰) تغییر بافت خاک

(۱۳۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۳۲) تغییر بافت خاک

(۱۳۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۳۴) موسیلاز

(۱۳۵) مان

(۱۳۶) لاتکس

(۱۳۷) صمن

(۱۳۸) افزايش فرسایش

(۱۳۹) گاهش

(۱۴۰) تغییر بافت خاک

(۱۴۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۴۲) تغییر بافت خاک

(۱۴۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۴۴) موسیلاز

(۱۴۵) مان

(۱۴۶) لاتکس

(۱۴۷) صمن

(۱۴۸) افزايش فرسایش

(۱۴۹) گاهش

(۱۵۰) تغییر بافت خاک

(۱۵۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۵۲) تغییر بافت خاک

(۱۵۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۵۴) موسیلاز

(۱۵۵) مان

(۱۵۶) لاتکس

(۱۵۷) صمن

(۱۵۸) افزايش فرسایش

(۱۵۹) گاهش

(۱۶۰) تغییر بافت خاک

(۱۶۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۶۲) تغییر بافت خاک

(۱۶۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۶۴) موسیلاز

(۱۶۵) مان

(۱۶۶) لاتکس

(۱۶۷) صمن

(۱۶۸) افزايش فرسایش

(۱۶۹) گاهش

(۱۷۰) تغییر بافت خاک

(۱۷۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۷۲) تغییر بافت خاک

(۱۷۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۷۴) موسیلاز

(۱۷۵) مان

(۱۷۶) لاتکس

(۱۷۷) صمن

(۱۷۸) افزايش فرسایش

(۱۷۹) گاهش

(۱۸۰) تغییر بافت خاک

(۱۸۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۸۲) تغییر بافت خاک

(۱۸۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۸۴) موسیلاز

(۱۸۵) مان

(۱۸۶) لاتکس

(۱۸۷) صمن

(۱۸۸) افزايش فرسایش

(۱۸۹) گاهش

(۱۹۰) تغییر بافت خاک

(۱۹۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۱۹۲) تغییر بافت خاک

(۱۹۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۱۹۴) موسیلاز

(۱۹۵) مان

(۱۹۶) لاتکس

(۱۹۷) صمن

(۱۹۸) افزايش فرسایش

(۱۹۹) گاهش

(۲۰۰) تغییر بافت خاک

(۲۰۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۲۰۲) تغییر بافت خاک

(۲۰۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۲۰۴) موسیلاز

(۲۰۵) مان

(۲۰۶) لاتکس

(۲۰۷) صمن

(۲۰۸) افزايش فرسایش

(۲۰۹) گاهش

(۲۱۰) تغییر بافت خاک

(۲۱۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۲۱۲) تغییر بافت خاک

(۲۱۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۲۱۴) موسیلاز

(۲۱۵) مان

(۲۱۶) لاتکس

(۲۱۷) صمن

(۲۱۸) افزايش فرسایش

(۲۱۹) گاهش

(۲۲۰) تغییر بافت خاک

(۲۲۱) افزایش گیاهان مرغوب

(۲۲۲) تغییر بافت خاک

(۲۲۳) کنترل سیلاب‌های با دبی زیاد

(۲۲۴) موسیلاز

(۲۲۵) مان

(۲۲۶) لاتکس

(۲۲۷) صمن

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۴

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

- ۱۸۹- کدام دسته از گیاهان جهت نهال کاری یا بوته کاری مناسب می باشند؟

- Eurotia - Festuca - Dactylis (۲)      Festuca - Dactylis - Onobrychis (۱)  
Atriplex - Dactylis - Kochia (۴)      Kochia - Eurotia - Atriplex (۳)

- ۱۹۰- در یک مرتع واقع در منطقه استپی گرم، فصل بارندگی در زمستان، فصل چرای دام اوایل بهار و پاییز، تیپ غالب یوشش از گیاهان شورروی (هالوفیت)، سازند منطقه دارای رگه هایی از گچ و نمک، کدام روش برای توسعه منابع آب درست است؟

- (۱) اصلاح چشممهها      (۲) تلمبه بادی  
(۳) جمع آوری رواناب سطحی (۴) حمل دستی
- ۱۹۱- مناسب ترین فاصله بین ردیفهای چاله در پیتینگ چقدر می باشد؟

- (۱) بیش از ۱۵° سانتی متر      (۲) ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر  
(۳) ۱۰ تا ۱۵۰ سانتی متر      (۴) ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر

- ۱۹۲- پس از آماده سازی گلدان ها و کاشت بذرها و یوشاندن آنها، آبیاری چگونگی صورت می گیرد؟  
(۱) آبیاری غرقابی      (۲) آبیاری با تانکر      (۳) آبیاری با شیلنگ      (۴) نوسط آب پاش

- ۱۹۳- در استفاده کودهای شیمیایی بعد از بذر کاری، کدام عامل بیشترین محدودیت را ایجاد می کند؟  
(۱) نیتروژن خاک      (۲) بارندگی      (۳) نور      (۴) گیاهان همراه

- ۱۹۴- کدام مورد در ارتباط با کودهای گوگردی درست است؟
- (۱) بقولات عکس العمل بهتری نسبت به گندمیان در ارتباط با افزایش این کودها دارد.  
(۲) کمترین کارایی از نظر جذب گیاهان در ارتباط با کودهای گوگرد خالص می باشد.  
(۳) گندمیان عکس العمل بهتری نسبت به بقولات در ارتباط با افزایش این کودها دارد.  
(۴) عکس العمل گندمیان و بقولات در مقابل کودپاشی با این کودها یکسان است.

- ۱۹۵- حساسیت نسبت به هوادیدگی، رشد سریع ریشه در خزانه، نیاز به مراقبت و آبیاری زیاد در باز کاشت و استقرار کمتر در مراعع مربوط به کدام مورد است؟

- (۱) تهیه و کاشت گیاه از طریق قلمه  
(۲) کاشت گیاه از طریق پاجوش  
(۳) تهیه و کاشت نهال ریشه لخت

- ۱۹۶- مقدار بذر خالص مصرفی برای گونه *Kochia prosterata* بر روی خاک های با بافت متوسط چه مقدار و عمق کاشت چقدر است؟

- (۱) ۲۰ kg در هکتار، ۲ سانتی متر  
(۲) ۱۲ kg در هکتار، ۱ سانتی متر  
(۳) ۵ kg در هکتار، ۱/۵ سانتی متر

- ۱۹۷- کدام ماده بهدلیل ترکیب پذیری آسان با کلسیم و منیزیم و ایجاد نمک های غیر محلول و لیکن املاح سدیم، پتانسیم و آمونیوم آن به شدت محلول و قابل جذب بوده و در دام ها ایجاد مسمومیت می کند؟

- (۱) گلیکوزیدهای قلبی  
(۲) گلیکوزیدهای سیانورزینیک  
(۳) نیترات ها

- ۱۹۸- عامل سمی در *Festuca arundinacea* که باعث مسمومیت دام ها می شود، کدام است؟

- (۱) آنکالوئید      (۲) اسیدهای آمینه سمی      (۳) تانن      (۴) نوکسین

- ۱۹۹- نخستین بار طرح پخش سیلان به صورت فنی در کدام منطقه اجرا شد؟

- (۱) زابل      (۲) نودهک قزوین      (۳) گر باستان فسا      (۴) جونگان ممسنی

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۲۰۰ - کدام مورد در زمینه اصلاح مرتع به روش قرق درست است؟

(۱) هر چه محیط خشک‌تر باشد طول مدت قرق مرتع کوتاه‌تر است.

(۲) در صورت قرق مرتع، سایر بخش‌ها با شدت یکسانی چرا می‌شوند.

(۳) قرق پوشش گیاهی به تنهایی می‌تواند یک روش اصلاحی موفق باشد.

(۴) عدم همراهی دامداران مهم‌ترین دلیل شکست اصلاح مرتع به روش قرق است.

- ۲۰۱ - آتش‌سوزی‌های اتفاقی فصل تابستان بر کدام گروه از گیاهان تأثیر بیشتری دارد؟

(۱) گیاهان بوته‌ای کند رشد

(۲) گیاهان بوته‌ای سریع الرشد

(۳) گیاهانی که بذرها یا شکاف خاک‌ها قرار می‌گیرد.

(۴) گیاهانی که در زمان آتش‌سوزی در مرحله رکود رشد قرار دارند.

- ۲۰۲ - کدام ویژگی در دامداری سنتی سبب بهره‌برداری بهینه از علوفه تولیدی مرتع و کنترل گله می‌شود؟

(۱) دریافت حق علف چرا

(۲) جدا کردن انواع دام از یکدیگر

(۳) رعایت تنوع در ترکیب گله

- ۲۰۳ - کدام مورد در ارتباط با ریپر زدن درست است؟

(۱) به طور کلی ریپر زدن در تمامی مناطق امکان‌پذیر است.

(۲) ریپر زدن بر روی خاک‌های کم عمق انجام می‌شود.

(۳) در زمان ریپر زدن، خاک باید به طور کامل خشک شده باشد.

(۴) ریپر زدن بر روی شبیه‌های تند روش مناسبی می‌باشد.

- ۲۰۴ - پوشش غالب یک مرتع از سه گونه *Onobrychis cornuta* و *Artemisia aucheri* .*Festuca ovina* ، است اگر بخواهیم آن را به روش آتش‌سوزی و بذرکاری گندمیان چندساله اصلاح کنیم، بهترین زمان اجرای حریق و کاشت بذر کدام است؟

(۱) هر دو بهار

(۲) هر دو پاییز

(۳) آتش‌سوزی بهار، کاشت بذر پاییز

- ۲۰۵ - کاشت گیاه *Bromus inermis* در چه محدوده‌ای از بارندگی بر حسب میلی‌متر توصیه می‌شود؟

(۱) ۵۰۰-۳۵۰ (۲) ۳۵۰-۲۰۰ (۳) ۲۰۰-۱۵۰ (۴) ۱۲۰-۷۰

- ۲۰۶ - در زیر منطقه نیم استوایی سرد با بارش تا ۴۵۰ میلی‌متر و خاک‌های آلوده و بال کشت کدام گونه‌ها مناسب است؟

(۱) *Artemisia sieberi* , *stipa barbata*

(۲) *Bromus tomentellus*, *Sanguisorba minor*

(۳) *Dactylis glomerata*, *Lolium prenne*

(۴) *Agropyron elongatum*, *Atriplex leucoclada*

- ۲۰۷ - مبنای اصلی کنترل بیولوژیک گیاهان مهاجم توسط حشرات کدام است؟

(۱) ریشه‌کنی گیاه مهاجم

(۲) نگهداری جمعیت حشره در یک سطح حداقل

(۳) افزودن حشره، هر گاه گیاه مهاجم در عرصه زیاد شود.

(۴) نگهداری تراکم جمعیت گیاه مهاجم در یک سطح حداقل

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۶

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

- ۲۰۸ - عمق کاشت بذری با قطر ۴۰ میلی‌متر در خاکی نسبتاً سنگین چند میلی‌متر می‌باشد؟  
۱) ۲۰۰ ۲) ۸۰ ۳) ۲۰ ۴) ۲۰۰
- ۲۰۹ - برای کنترل هجوم گیاهان جست‌دار مزاحم، ریشه‌ها باید از چه ناحیه‌ای قطع شوند؟  
۱) زیرناحیه ظهور جوانه‌ها ۲) ساقه‌های حامل گل ۳) بالای جست‌های جوان
- ۲۱۰ - در یک مرتع چراچ مخلوط گاو و گوسفند انجام می‌شود، در صورتی که ۲۰۰ گوسفند و ۱۰۰ گاو به طور همزمان از مرتع استفاده کنند، ابعاد مناسب آبشخوارها برای هر نوع دام کدام است؟  
۱) گوسفند ۸۰-۶۰ متر، گاو ۱۰۰ متر ۲) گوسفند ۱۰۰ متر، گاو ۵۰ متر  
۳) گوسفند ۲۰۰ متر، گاو ۴۰-۳۰ متر ۴) گوسفند ۲۰۰ متر، گاو ۱۰۰ متر

## شناسایی گیاهان مرتعی

- ۲۱۱ - گیاهان چندساله‌ای که در فصل خزان کلیه اندام‌های هوایی آنها خزان کرده و اثری از آنها در روی خاک باقی نمی‌ماند و در سال بعد از ریشه مجدد اندام هوایی بوجود می‌آید، چه نامیده می‌شوند؟  
Grass (۴) Grass like (۳) Shrub (۲) Forb (۱)
- ۲۱۲ - میوه در کدام جنس نیام کوچک تخم مرغی است?  
Trifolium (۴) Medicago (۳) Lotus (۲) Melilotus (۱)
- ۲۱۳ - کدام دسته از گیاهان، همگی شیرابه‌دار می‌باشند؟  
Salsola - Taraxacum - Rheum - Ferula (۱)  
Sonchus - Peganum - Dorema - Rheum (۲)  
Taraxacum - Scariola - Scorzonera - Tragopogon (۳)  
Cousinia - Scariola - Sonchus - Heracleum (۴)
- ۲۱۴ - در کدام طایفه، تیره گندمیان تعداد پرچم‌ها بیش از سه عدد می‌باشد؟  
Panicum (۴) چمن (۱) Zea (۳) ذرت (۳) Oryza (۲) برنج (۱)
- ۲۱۵ - به گلوله‌ها در گیاهان خانواده گندم چه گفته می‌شود؟  
لودیکول (۴) پوشینه‌ها (۱) پوشینه (۲) پوشینه (۳) لاما و پاله‌ا (۱)
- ۲۱۶ - مشخصات برگ و میوه در گیاه (*Tribulus*) کدام است?  
مرکب شانه‌ای، میوه ناشکوفا (۱)  
مرکب پنجه‌ای، میوه خشک شکوفا (۳)  
لما، در کدام گونه سیخک‌دار است؟ (۱)
- ۲۱۷ - *deschampsia caespitosa* (۲) *Poa pratensis* (۱)  
*Phalaris minir* (۴) *Aeluropus lagopoides* (۳)
- ۲۱۸ - کدام مورد، مربوط به ویژگی‌های گونه *Poa bulbosa* است?  
۱) گونه‌ای یکساله، دیررس، دارای پوشش انبوه چمنی و تولید فراوان با ارزش علوفه‌ای متوسط  
۲) گونه‌ای چند ساله، ریزوم‌دار، قوی و طول مدت سبز بودن طولانی با ارزش علوفه‌ای فراوان  
۳) گونه‌ای یکساله، کمزی، با ریشه‌های انبوه و ارزش علوفه‌ای فراوان  
۴) گونه‌ای چندساله، زودرس و کمزی که دارای ریشه‌های انبوه بوده و خاصیت زنده‌زایی دارد.

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۲۱۹- در کدام گونه *Agropyron*, سنبلاک‌ها دو رديفی و با آرایش شانه‌ای قرار گرفته‌اند؟  
*A.elongatum* (۴)    *A.pectiniform* (۳)    *A.trichophorum* (۲)    *A.repens* (۱)
- ۲۲۰- کدام عبارت نام گونه‌ای یکساله از جنس *Salsola* است؟  
*S.crassa* (۴)    *S.arbuscula* (۳)    *S.rigida* (۲)    *S.aureotincta* (۱)
- ۲۲۱- کدام ویژگی در ارتباط با گونه *Festuca ovina* درست است؟  
(۱) چندساله، برگ‌ها سوزنی، نقره‌فام، ریشه‌های افسان سیاه رنگ، گل آذین پانیکول  
(۲) یکساله، برگ‌ها تخت، ریشه‌ها افسان و قهوه‌ای رنگ، گل آذین سنبله  
(۳) چند ساله، کروی، ارتفاع زیاد، ریشه‌های افسان متراکم، گل آذین سنبله  
(۴) یکساله، کوتاه با برگ‌های سوزنی، ریشه‌های انبوه و متراکم، گل آذین پانیکول
- ۲۲۲- ویژگی منحصر به فرد جنس *Rumex* کدام است؟  
(۱) عدم وجود برگ    (۲) وجود اکرآ    (۳) میوه فندقه مژه‌دار    (۴) تک پرچمی بودن
- ۲۲۳- نوع گل آذین در گیاه *Achillea* چیست و به کدام خانواده تعلق دارد؟  
*Zygophyllaceae* - (۲) گزرن    *Lamiaceae* - (۱) خوشه  
*Asteraceae* - (۴) دیپهیم    *Asteraceae* - (۳) کلایپرک
- ۲۲۴- کدام گونه، درختچه‌ای با برگ‌های فلسی همیشه سبز که دارای گستره رویش نسبتاً وسیعی می‌باشد، است؟  
*Haloxylon aphyllum* (۲)    *Ephedra majus* (۱)  
*Tamarix gluca* (۴)    *Calligonum comosum* (۳)
- ۲۲۵- کدام گیاه، علفی، چند ساله، ساقه خاکستری به بلندی ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، برگ‌های قاعده‌ای کم و بیش دمپرگ‌دار، چرمی، سرنیزه‌ای با کناره‌های لوب‌دار و خاردار با گل آذین، جتر کروی است؟  
*Ferula ovina* (۲)    *Eryngium bungei* (۱)  
*Noaea mucronata* (۴)    *Gundelia tournefortii* (۳)
- ۲۲۶- منشأ خار در جنس‌های *Acantholimon*, *Astragalus*, *Onobrychis* کدام است؟  
(۱) گوشوارک - برگ - سرشاخه    (۲) رگبرگ اصلی - سرشاخه  
(۳) سرشاخه - برگ - گوشوارک    (۴) سرشاخه - رگبرگ اصلی - برگ
- ۲۲۷- ویژگی‌های گیاهانی پایا و یکساله، برگ‌های باریک گل آذین پانیکول متراکم و پرپشت و چاق یا باریک اما فاقد سیخک و پوشیده‌ها دارای کناره بال مانند و دارای رگه‌های سفید و سبز، مربوط به کدام طایفه می‌باشد؟  
*Aeluropodeae* (۴)    *Aveneae* (۳)    *Phalarideae* (۲)    *Agrostideae* (۱)
- ۲۲۸- نوع میوه و برگ در گونه *Nitraria schoberi* کدام است؟  
(۱) فندقه - مرکب    (۲) شفت - ساده    (۳) شفت - مرکب    (۴) کپسول - ساده
- ۲۲۹- برگ در گونه *Goebelia alopecuroides* از چه نوعی است؟  
(۱) مرکب شانه‌ای فرد    (۲) مرکب پنجهای    (۳) مرکب شانه‌ای زوج    (۴) زوج شانه‌ای
- ۲۳۰- کدام جنس دارای برگ‌های مشخص و غیرغشایی می‌باشد؟  
*Halocnemum* (۴)    *Ceratocarpus* (۳)    *Halostachys* (۲)    *Salicornia* (۱)
- ۲۳۱- میوه در گیاه ریواس از چه نوعی است؟  
(۱) گوشتشی از نوع سته    (۲) تک فندقه    (۳) شیزوکارپ    (۴) فندقه تری سامر

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۸

415F

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

- ۲۳۲- گیاهی چندساله با فرم رویش پهن برگ علفی دارای برگ‌های مرکب شانه‌ای، قادر به گونه کرک و پرز، با خوش‌خوارکی خوب، میوه فندقه چهارگوش، نام گیاه کدام است؟

*Stachys inflata* (۲)

*Sanguisorba minor* (۱)

*Kochia prosterata* (۴)

*Coronilla varia* (۳)

- ۲۳۳- کدام یک، گیاهی جویی است، معمولاً در مسیل‌ها می‌روید. برگ‌های باریک و خطی، میوه فندقه‌ای است که سه بال دارد، است؟

*Pteropyrum olivieri* (۲)

*Atrapaxis tournefortii* (۱)

*Atraohaxis spinosa* (۴)

*Pteropyrum aucheri* (۳)

- ۲۳۴- متعلق به کدام خانواده است و میوه آن چه می‌باشد؟

(۱) Lamiaceae (۲)

- سamar

(۳) Apiaceae (۴)

- فندقه

- ۲۳۵- در این جنس ساقه صاف و بدون پند، برگ‌ها اغلب باریک و ضخیم گل نر دارای چهار پرچم، گلپوش لوله‌ای و دارای ۴ دندانه می‌باشد. نام این جنس کدام است؟

*Eurotia* (۴)

*Halimione* (۳)

*Camphorosma* (۲)

*Chenopodium* (۱)

- ۲۳۶- گونه‌ای است از خانواده نعناعیان، علفی چندساله، برگ‌های بزرگ، زبر و گل آذین خوش، تعداد پرچم‌ها ۲ عدد و میوه چهار فندقه، نام گونه کدام است؟

*Ajuga ciliata* (۲)

*Ziziphora tenuior* (۱)

*Salvia limbata* (۴)

*Thymus kotchyanus* (۳)

- ۲۳۷- گیاه *Limonium iranicum* معرف جه نوع اراضی است، برگ‌های آن چگونه است و به کدام خانواده تعلق دارد؟

(۱) شوره‌زارها - برگ ساده - خانواده گل که

(۲) صخره‌زارها - برگ ساده - خانواده گز

(۳) شوره‌زارها - برگ‌ها مرکب - خانواده اسفناج

(۴) اراضی گچی - برگ‌ها مرکب - خانواده کاسنی

- ۲۳۸- میوه، در کدام گیاه *Hipe* نامیده می‌شود که نوعی میوه آبدار کاذب است؟

*Amygdalus* (۴)

*Rosa* (۳)

*Bunium* (۲)

*Sinapis* (۱)

- ۲۳۹- گل آذین و میوه در *Echinophora* کدام است؟

(۱) چتر، شیزوکارپ (۲) کپه، شیزوکارپ

(۳) دیپیم، کیپول

(۴) گرزن، سamar

- ۲۴۰- در کدام جنس پانیکول متراکم گسیخته و چند پارچه بوده و پوشینه نوک تیز یا واحد سیخک کوتاه می‌باشد؟

*Dactylis* (۴)

*Lolium* (۳)

*Agropyron* (۲)

*Aegilops* (۱)

## از زیبایی و اندازه‌گیری مرتع:

- ۲۴۱- مشکل اصلی کاربرد سنجش از دور در برآورد تاج پوشش گیاهی و تولید مرتع کدام مورد است؟

(۱) توان تفکیک رادیومتری بالای سنجنده‌ها

(۲) تنوع زیاد گیاهان موجود در عرصه مرتع

(۳) تک بودن پوشش گیاهی و وجود اثرات بازتاب خاک زمینه

(۴) اختصاصی نبودن باندهای طیفی ماهواره‌ها

- روش‌های بدون بلات (روش‌های فاصله‌ای) برای ارزیابی کدام پارامتر در مرتع مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

(۱) تولید مرتع (۲) تنوع گونه‌ای

(۳) غنای گونه‌ای

(۴) متراکم

(۱) تولید مرتع

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۲۴۳- چنانچه در یک مرتع فرم‌های مختلف رویشی وجود داشته باشد، چه پلاتی را برای اندازه‌گیری تاج پوشش گیاهان مناسب است؟

- (۱) پلات‌های تو در تو  
(۲) پلات‌های مربعی  
(۳) پلات حداقل سطح  
(۴) ترانسکت نواری

- ۲۴۴- اگر الگوی پراکنش گیاهان به صورت کپه‌ای باشد، برای اندازه‌گیری پوشش از چه پلاتی استفاده می‌گردد؟

- (۱) مربعی، چون اثر حاشیه زیاد است.  
(۲) دایره‌ای، چون اثر حاشیه بسیار کم است.

(۳) مستطیلی، چون تغییرات در داخل پلات حداقل و بین پلات حداقل است.

(۴) مستطیلی، چون تغییرات پوشش در داخل پلات حداقل و بین پلات حداقل است.

- ۲۴۵- در محاسبه ظرفیت چرائی مرتع:

- (۱) بین نیاز روزانه دام و وزن دام ارتباط نیست.  
(۲) بین نیاز روزانه دام و وزن دام ارتباط هست.  
(۳) بین خوشخوارکی و ارزش رجحانی علوفه ارتباط نیست.  
(۴) بین نیاز روزانه دام و میزان تحرک دام ارتباط نیست.

- ۲۴۶- کدام فاکتور ارزیابی مرتع بر حسب وسعت منطقه و هدف ارزیابی مرتع تغییر می‌کند؟

- (۱) مقیاس (۲) اندازه پلات (۳) تیپ گیاهی (۴) استفاده از عکس هوایی

- ۲۴۷- روش فاصله‌ای برای برآورد تراکم، کدام یک از جوامع گیاهی مناسب است؟

- (۱) پهن برگان علفی  
(۲) گراس‌ها و پهن برگان علفی  
(۳) بوته‌ها، درختچه‌ها و درختان  
(۴) گراس‌ها و شب‌گراس‌ها

- ۲۴۸- در تعیین اندازه پلات به روش سطح حداقل (Minimal area) کدام معیار اندازه‌گیری می‌گردد؟

- (۱) ساختار گونه‌ها  
(۲) حضور گونه‌ها  
(۳) وفور گونه‌ها

- ۲۴۹- درصد ترکیب گیاهان یک منطقه به شرح جدول زیر است. وضعیت مرتع را بر اساس روش ترکیب گیاهی کدام است؟

نام گونه	نام گونه	پوشش کلیماکس (درصد)	پوشش فعلی (درصد)
A	۲۰	۳۰	۳۰
B	۳۰	۲۰	۲۰
C	۱۰	۵	۵
D	۵	۰	۰

- (۱) متوسط  
(۲) فقیر  
(۳) خوب  
(۴) عالی

- ۲۵۰- در استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای برای ارزیابی پوشش گیاهی مرتع، مقدار بازتابش گیاهان در باندهای مرئی در مقایسه با باند مادون قرمز نزدیک چگونه است؟

- (۱) بازتاب ندارد.  
(۲) تفاوتی ندارد.  
(۳) زیاد است.  
(۴) کم است.

- ۲۵۱- تعیین محدوده و نوع کاربردی، تیپ‌بندی مرتع، توصیف واحدها و نقشه سامان عرفی را جزء مراحل کدام عمل ارزیابی مرتع می‌توان به شمار آورد؟

- (۱) ارزیابی وضعیت  
(۲) اندازه‌گیری  
(۳) پایش  
(۴) ممیزی

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۲۵۲- به تعیین کمی و کیفی یک پارامتر در مطالعات مرتع گفته می‌شود؟

- (۱) اندازه‌گیری  
(۲) روش مرتع‌داری  
(۳) ممیزی  
(۴) پایش

۲۵۳- کدام موارد، دو مدل مهم در ارزیابی عملکرد مرتع، می‌باشد؟

- (۱) مدل تحلیل عملکرد چشم‌انداز، مدل سلامت مرتع  
(۲) مدل حال و انتقال، مدل چهار فاکتور ارزیابی وضعیت  
(۳) مدل محاسبه ظرفیت چرا، چگونگی انتخاب روش مرتع‌داری  
(۴) سلامت مرتع، الگوی پراکنش دام چراکننده از مرتع

۲۵۴- در تفسیر عملکرد مرتع و تعیین وضعیت، توجه به کدام ویژگی مرتع مهم است؟

- (۱) فولولوزی گیاهان  
(۲) هیدرولوزی مرتع  
(۳) شرایط توپوگرافی  
(۴) پایداری

۲۵۵- اولین مرحله در آنالیز و توصیف پوشش گیاهی کدام است؟

- (۱) تهیه ماتریس توده - گونه  
(۲) تفکیک منطقه مورد مطالعه  
(۳) اندازه‌گیری ناج پوشش گیاهان  
(۴) اندازه‌گیری تولید علوفه

۲۵۶- با توجه به مقادیر جدول زیر، چند واحد دامی می‌توانند در ۵۰۰ هکتار مرتع برای یک دوره چراجی ۱۰۰ روزه با حد بهره‌برداری مجاز ۴۰ درصد و ارزش بر رجحانی ۲۰ درصد چرا کنند؟ در صورتی که نیاز روزانه دام ۲ کیلوگرم ماده خشک باشد.

شماره پلات	مقدار علوفه (گرم در متر مربع)
۱	۴۰
۲	۳۵
۳	۳۵
۴	۴۵
۵	۲۵
۶	۳۰
۷	۱۵
۸	۲۰
۹	۴۰
۱۰	۲۵

۲۵۷- کدام مورد صحیح است؟

- (۱) هر چه میزان تغییرات در پوشش گیاهی کمتر شود، واریانس کمتر شده و اندازه نمونه بیشتر می‌شود.  
(۲) هر چه میزان تغییرات در پوشش گیاهی کمتر شود، واریانس بیشتر شده و اندازه نمونه بیشتر می‌شود.  
(۳) هر چه میزان تغییرات در پوشش گیاهی بیشتر شود، واریانس بیشتر شده و اندازه نمونه بیشتر می‌شود.  
(۴) هر چه میزان تغییرات در پوشش گیاهی بیشتر شود، واریانس کمتر شده و اندازه نمونه بیشتر می‌شود.

۲۵۸- ارزیابی بنیه و شادابی گیاهان به چه منظور صورت می‌گیرد؟

- (۱) تعیین وضعیت مرتع  
(۲) تعیین گرایش مرتع  
(۳) تعیین کیفیت علوفه  
(۴) تعیین شدت چرا

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۲۵۹- مناسب‌ترین روش نمونه‌گیری برای مطالعات بوم‌شناسی در مرتع کدام است؟
- (۱) سیستماتیک  
(۲) تصادفی  
(۳) تصادفی سیستماتیک  
(۴) تصادفی طبقه‌بندی شده
- ۲۶۰- کدام خصوصیت پوشش گیاهی کمتر از خصوصیات دیگر تحت تأثیر تغییرات سالیانه بارندگی قرار می‌گیرد؟
- (۱) بیوماس  
(۲) پوشش یقه‌ای  
(۳) پوشش تاجی
- ۲۶۱- در کدام‌یک از روش‌های اندازه‌گیری تولید، لازم است ۵ پایه گیاهی مرجع جهت محاسبه معادله برای تصحیح برآورده انتخاب شود؟
- (۱) امتیازدهی ماده خشک  
(۲) تولید مقایسه‌ای  
(۳) روش مضاعف
- ۲۶۲- در مرجعی که دام غالب چرا کننده از آن گوسفنند نژاد فشنندی است، در صورتی که به علت تحرک دام ۵۵ درصد به نیاز روز آن اضافه گردد با استفاده از فرمول  $ME = 1.8 + 0.1W$  چه مقدار انرژی متابولیسمی بر حسب مکارزول برای مصرف روزانه آن در نظر می‌گیریم؟
- (۱) ۱۵/۶  
(۲) ۱۵  
(۳) ۱۱/۷  
(۴) ۷/۸
- ۲۶۳- در یک تیپ گیاهی به مساحت ۱۰۰ هکتار تولید گیاهان، کلاس I، II و III به ترتیب ۸۰، ۶۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. علوفه قابل دسترس دام در این تیپ گیاهی به شرطی که حد بهره‌برداری مجاز ۴۰ درصد تعیین شده باشد، چند کیلوگرم است؟
- (۱) ۱۴۴۰۰  
(۲) ۱۳۰۰۰  
(۳) ۷۸۰۰  
(۴) ۷۲۰۰
- ۲۶۴- در مرجعی که حد بهره‌برداری مجاز تعیین شده ۴۰ درصد و میزان علوفه گیاهی در پلات‌های چرا نشده ۱۰۰ گرم و در پلات‌های چرا شده ۶۰ گرم بوده است. شدت چرا، چگونه ارزیابی می‌شود؟
- (۱) بسیار شدید  
(۲) متعادل  
(۳) سبک  
(۴) شدید
- ۲۶۵- کدام روش اندازه‌گیری پوشش با دستیابی به کامپیوتر و GIS بیشتر می‌تواند توسعه یابد؟
- (۱) روش فتوگرافیک  
(۲) روش چارت و نقشه  
(۳) اندازه‌گیری در واحد سطح
- ۲۶۶- در ارزیابی مرتع با اطلاعات ماهواره‌ای، ویژگی یک شاخص گیاهی خوب کدام است؟
- (۱) حساس به رنگ سنگ و سنگ‌ریزه عدم حساس به رطوبت  
(۲) حساس به ماده خشک گیاهی و سایه  
(۳) حساس به خاک لخت و رطوبت  
(۴) حساس به ماده گیاهی خشک و تر، غیرحساس به خاک لخت و سایه

# مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۲۶۷- مهم‌ترین شکل ارزیابی طرح‌های مدیریت مرتع کدام است؟

- (۱) مشخص کردن ظرفیت چراپی
- (۲) پایش

(۳) اندازه‌گیری وضعیت مرتع

(۴) تعیین تراکم پوشش گیاهی

۲۶۸- در تعیین حد بهره‌برداری مجاز نسبت به حداکثر تعیین شده برای بهره‌برداری مرتع در هر منطقه آب و هوایی به چه اطلاعاتی نیاز دارید؟

(۱) تکرار، تراکم پوشش گیاهی و نوع دام چراکننده از مرتع

(۲) وضعیت، گراپیش و فرسایش خاک

(۳) میزان بارندگی، توپوگرافی و درصد پوشش گیاهی

(۴) خصوصیات خاک مرتع، فرم حیاتی پوشش گیاهی و تکرار

۲۶۹- دستیابی به اطلاعات پایه‌ای به هنگام از مراعع هدف کدام است؟

(۱) انتخاب روش مرتع‌داری

(۲) تعیین عمق خاک مرتع

(۳) اندازه‌گیری مرتع

۲۷۰- تیپ‌های پوشش گیاهی مرتع بر اساس تعیین کدام مورد مشخص می‌گردد؟

(۱) ترکیب پوشش گیاهی

(۲) درصد پوشش گیاهی مرحله کلیماکس

(۳) وضعیت پوشش گیاهی

(۴) گراپیش وضعیت پوشش گیاهی