


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

کد کنترل



106F

106

F

صبح پنج شنبه
۹۷/۲/۶



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۷

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری - کد (۱۳۰۱)

مدت پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سوال: ۲۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	حافظت خاک و آبخیزداری	۲۵	۳۱	۵۵
۳	مرتع داری	۲۵	۵۶	۸۰
۴	هیدرولوژی کاربردی	۲۵	۸۱	۱۰۵
۵	ژئومورفوژوئی و زمین‌شناسی	۲۵	۱۰۶	۱۳۰
۶	جامعه‌شناسی روسنایی	۲۵	۱۳۱	۱۵۵
۷	اصلاح و توسعه مرتع	۲۵	۱۵۶	۱۸۰
۸	شناسایی گیاهان مرتعی	۲۵	۱۸۱	۲۰۵
۹	ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع	۲۵	۲۰۶	۲۳۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حل جابه تکثیر و انتشار سوالات به هر دوش (کترونیکی و...), پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تها با مجوز این سازمان مجاز نیاشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می شود.

۱۳۹۷

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می نمایم.
اینچنانچه

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Fierce winds and deadly waves were only one ----- many explorers like Christopher Columbus confronted when sailing to unknown lands.
1) suspension 2) obstacle 3) shortage 4) variation
- 2- In urban desert areas potable water supplies are stressed by increasing demands that leave water managers ----- to find new supplies.
1) discouraging 2) refusing 3) invading 4) struggling
- 3- The sense of smell diminishes with advancing age—much more so than the sensitivity to taste. This ----- may result from an accumulated loss of sensory cells in the nose.
1) decrease 2) merit 3) ambiguity 4) defense
- 4- True, all economic activities have environmental consequences. Nevertheless, the goal of shrimp producers should be to reduce the ----- effects on the environment as much as possible.
1) indigenous 2) competitive 3) deleterious 4) imaginary
- 5- Like most successful politicians, she is pertinacious and single-minded in the ----- of her goals.
1) pursuit 2) discipline 3) permanence 4) involvement
- 6- Knowing that everyone would ----- after graduation, she was worried that she would not see her friends anymore.
1) emerge 2) conflict 3) differentiate 4) diverge
- 7- Certain mental functions slow down with age, but the brain ----- in ways that can keep seniors just as sharp as youngsters.
1) composes 2) conveys 3) compensates 4) corrodes
- 8- It is argued by some that hypnosis is an effective intervention for ----- pain from cancer and other chronic conditions.
1) displacing 2) alleviating 3) exploring 4) hiding
- 9- Children who get ----- atmosphere at home for studies perform better than students who are brought up under tense and indifferent family atmosphere.
1) favorable 2) valid 3) obedient 4) traditional
- 10- The post office has promised to resume first class mail ----- to the area on Friday.
1) attention 2) progress 3) expression 4) delivery

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Colette began painting while she was still in her youth. (11) _____ 1970, she completed her first performance with *Hommage a Delacroix*, (12) _____ was the beginning of an artistic career (13) _____ to the oneness of art and life. (14) _____, actions and performances on streets and public squares, followed by her "living environments" and the "windows", (15) _____ in a selected pose with an elaborate arrangement of fabrics and lace.

- | | | |
|-----|---|---|
| 11- | 1) Since the year
3) For a year of | 2) During a year of
4) In the year |
| 12- | 1) that it 2) which | 3) that 4) it |
| 13- | 1) devoted 2) was devoted | 3) to devote 4) devoting |
| 14- | 1) Street works then came
3) There coming then street works with | 2) Then came street works
4) With street works then to come |
| 15- | 1) she remained motionless
3) in which she remained motionless | 2) that in there she remained motionless
4) that in it motionless she remained |

PART C: Reading Comprehension:

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

There are two types of agricultural crop residues. Field residues are materials left in an agricultural field or orchard after the crop has been harvested. These residues include stalks and stubble (stems), leaves, and seed pods. The residue can be ploughed directly into the ground, or burned first. Good management of field residues can increase efficiency of irrigation and control of erosion. Process residues are materials left after the crop is processed into a usable resource. These residues include husks, seeds, bagasse, molasses and roots. They can be used as animal fodder and soil amendment, fertilizers and in manufacturing. Nutrients in most crop residue are not immediately available for crop use. Their release (called generalization) occurs over a period of years. The biological processes involved in soil nutrient cycles are complex. As a rough guide, cereal straw releases about 10 to 15 per cent of its nutrients and pea residues release about 35 percent of their nutrients by the next year. The speed of generalization depends on the nitrogen and lignin content, soil moisture, temperature, and degree of mixing with the soil. N is released fairly quickly from residue when the content is higher than 1.5 per cent. In contrast, below 1.2 per cent, soil-available N is fixed (called immobilization) by the microbes as they decompose the residue. Thus pea residue would have short- and long-term benefits to soil fertility, whereas cereal straw would reduce next year's soil supply of available nutrients. Over time, the nutrients fixed by soil microbes

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۴

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

and humus are released and available to crops. Nutrients from residue are not fully recovered by crops. Just like fertilizer nutrients, nutrients released from crop residue into the soil are susceptible to losses such as leaching, denitrification, immobilization, and fixation.

- 16- It is stated in the passage that -----.
- 1) process residues are the materials collected from crop processing
 - 2) pea residue has over seven short-term benefits to soil fertility
 - 3) soil-available N is fixed by 1 per cent of soil's microorganisms
 - 4) generalization occurs faster in pea residues than cereal straw
- 17- The passage points to the fact that -----.
- 1) seed pods are among field residues
 - 2) crop use depends heavily on crop residue
 - 3) husks have very little nutritive value
 - 4) microbes fix the soil's needed humus
- 18- According to the passage, -----.
- 1) process residue denitrification happens very quickly
 - 2) fertilizer nutrients are not immune to immobilization
 - 3) orchard residues release far more N than field residues
 - 4) field residues cannot be ploughed directly into the ground
- 19- We understand from the passage that -----.
- 1) soil's lignin content is an index of its moisture
 - 2) field residue lowers the efficiency of irrigation
 - 3) animal fodder is often used for soil amendment
 - 4) processes involved in nutrient cycles are simple
- 20- The word 'stubble' in the passage (underlined) is closest to -----.
- 1) 'root'
 - 2) 'branch'
 - 3) 'straw'
 - 4) 'trunk'

PASSAGE 2:

A drainage basin or catchment area is any area of land where precipitation collects and drains off into a common outlet, such as into a river, bay, or other body of water. The drainage basin includes all the surface water from rain runoff, snowmelt, and nearby streams that run downslope towards the shared outlet, as well as the groundwater underneath the earth's surface. Drainage basins connect into other drainage basins at lower elevations in a hierarchical pattern, with smaller sub-drainage basins, which in turn drain into another common outlet. Other terms used to describe drainage basins are catchment, catchment basin, drainage area, river basin and water basin. In North America, the term watershed is commonly used to mean a drainage basin, though in other English-speaking countries, it is used only in its original sense, to mean a drainage divide, a ridge that separates adjacent drainage basins. In closed ("endorheic") drainage basins the water converges to a single point inside the basin, known as a sink, which may be a permanent lake, a dry lake, or a point where surface water is lost underground. The drainage basin acts as a funnel by collecting all the water within the area covered by the basin and channeling it to a single point. Each drainage basin is separated topographically from adjacent basins by a perimeter, the drainage divide, making up a succession of higher geographical features (such as

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۵

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

a ridge, hill or mountains) forming a barrier. Drainage basins are similar but not identical to hydrologic units, which are drainage areas delineated so as to nest into a multi-level hierarchical drainage system. Hydrologic units are defined to allow multiple inlets, outlets, or sinks. In a strict sense, all drainage basins are hydrologic units but not all hydrologic units are drainage basins.

21- It is stated in the passage that -----.

- 1) the most common basins are endorheic basins
- 2) surface water can be lost underground at a 'sink'
- 3) drainage basins are constructed along rocky ridges
- 4) sub-drainage basins do not drain into shared outlets

22- It can be understood from the passage that -----.

- 1) drainage basins connect one another at similar elevations
- 2) there are few topographical perimeters inside a closed basin
- 3) drainage basins do not allow multiple inlets, outlets, or sinks
- 4) drainage divides are a feature of high-altitude geographical areas

23- The passage points to the fact that -----.

- 1) large river basins contain several water, drainage and catchment basins
- 2) a catchment area is a collection of drainage basins with a common outlet
- 3) groundwater under the earth's surface can be included in a catchment area
- 4) a drainage basin in a catchment area can include up to three hydrologic units

24- According to the passage, -----.

- 1) 'watershed' originally refers to a drainage divide
- 2) drainage funnels act as central water-distributors
- 3) snowmelt runs downslope towards the rain runoff
- 4) a ridge is a succession of high geographical features

25- The word 'converge' in the passage (underlined) is closest to -----.

- 1) 'function' 2) 'close' 3) 'occur' 4) 'meet'

PASSAGE 3:

Garrigue or phrygana is a type of low, soft-leaved scrubland ecoregion and plant community in the Mediterranean forests, woodlands, and scrub biome. It is found on limestone soils in southern France and around the Mediterranean Basin, generally near the seacoast where the moderated Mediterranean climate provides annual summer drought. The term has also found its way into haute cuisine, suggestive of the resinous flavours of a garrigue shrubland. World Conservation Monitoring Centre (WCMC) described garrigue as "discontinuous bushy associations of the Mediterranean calcareous plateaus, which have relatively alkaline soils. It is often composed of kermes oak, lavender, thyme, and white cistus. There may be a few isolated trees." Garrigue is discontinuous with widely spaced bush associations with open spaces, and is often extensive. It is associated with limestone and base rich soils, and calcium associated plants. Aside from dense thickets of kermes oak that punctuate the garrigue landscape, juniper and stunted holm oaks are the typical trees; aromatic lime-tolerant shrubs such as lavender, sage, rosemary, wild thyme and *Artemisia* are common garrigue plants. The aromatic oils and soluble monoterpenes of such herbs leached into garrigue soils from leaf litter have been connected with plant allelopathy,

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

which asserts the dominance of a plant over its neighbors, especially annuals, and contributes to the characteristic open spacing and restricted flora in a garrigue. The fines (charred wood and smoke residues, or charcoal dust) of periodic brush fires also have had an effect on the patterning and composition of the garrigues. Clear summer skies and intense solar radiation have induced the evolution of protective physiologies: the familiar glaucous, grayish-green of garrigue landscapes is produced by the protective white hairs and light-diffusing, pebbled surfaces of many leaves typical of garrigue plants.

26- The passage mentions that -----.

- 1) phryganas contain a lot of aromatic lime-tolerant shrubs
- 2) discontinuous garrigues are widely spaced from each other
- 3) Mediterranean forests are composed of layers of scrub biome
- 4) protective white hairs are the main cause of plant allelopathy

27- According to the passage, -----.

- 1) brush fires happen in garrigues at regular intervals
- 2) soft-phryganas are soft-leaved scrubland ecoregions
- 3) summer droughts do not stop the development of phryganas
- 4) garrigue plants do not need a pebbled surface to diffuse light

28- It might best be understood from the passage that -----.

- 1) protective flora do not grow without intense solar radiation
- 2) most of Europe's limestone soils are found in southern France
- 3) lavender, thyme and white cistus are calcium-associated plants
- 4) charred wood and smoke residues create a lot of charcoal dust

29- The passage points to the fact that -----.

- 1) haute cuisine has its origins in parts of a garrigue shrubland
- 2) garrigues typically have a glaucous, grayish-green landscape
- 3) Mediterranean calcareous plateaus are all covered by garrigues
- 4) a garrigue's open spacing and restricted flora is due to its annuals

30- The word 'stunted' in the passage (underlined) is the opposite of -----.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) 'diseased' | 2) 'resistant' |
| 3) 'under-developed' | 4) 'fully-grown' |

حافظت خاک و آبخیزداری:

- ۳۱- محل انر نیروی حاصل از آب سرریز در شرایطی که سد کاملاً پر شده و رسوبات آن به حد کافی سفت شده باشند، کدام مورد است؟

- (۱) به مرکز سرریز وارد می‌شود.
- (۲) اصلاً به بدنه وارد نمی‌شود.
- (۳) همان نقطه‌ایی که نیروی ناشی از خاک وارد می‌شود.
- (۴) به بالاتر از نقطه‌ایی که نیروی ناشی از خاک وارد می‌شود.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۳۲- کدام شرایط، جهت ثبت آبراهه با استفاده از روش بیولوژیک پس از تغییر شیب کناره‌ها پوشش گیاهی ایجاد می‌شود؟

(۱) سرعت و دبی کم، شیب طولی و عرضی زیاد

(۲) سرعت زیاد، دبی جریان زیاد، شیب عرضی آبراهه کم

(۳) سرعت زیاد، دبی جریان کم، شیب طولی آبراهه کم

(۴) سرعت کم، دبی جریان کم، شیب طولی آبراهه کم

- ۳۳- رابطه ضریب فشار حاصله از خاک با زاویه اصطکاک داخلی در فرمول Coulomb کدام است؟

(۱) عکس (۲) مستقیم (۳) نمایی (۴) هر دو یکی هستند

- ۳۴- در احداث یک سد گایبیونی، اختلاف بین عرض گایبیون‌های روی هم چیده را چگونه باید در نظر گرفت؟

(۱) فرقی نمی‌کند.

(۲) بیشتر در قسمت پایاب

(۳) مساوی بین سرآب و پایاب (۴) بیشتر در قسمت سرآب

- ۳۵- براساس رابطه پیتر و میر $\frac{1}{\frac{h^{\frac{1}{2}} + q^{\frac{1}{5}}}{d^{\frac{4}{5}}}} = 1/44 t + hr$. اگر خاک‌ریزی دستی سد از یک متر به دو متر افزایش یابد، چه تأثیری بر میزان کنش دارد؟

(۱) $(h - 1)^{\frac{1}{2}}$ کاهش می‌یابد.

(۲) $(h - 1)^{\frac{1}{2}}$ افزایش می‌یابد.

(۳) کنش را کاهش می‌دهد.

(۴) تأثیری بر کنش ندارد.

- ۳۶- در محاسبه دبی حداقل لحظه‌ای با دوره بازگشت ۱۰۰ سال با استفاده از رابطه استدلالی فاکتور تصحیح برای ضریب رواناب (C) چقدر است؟

(۱) ۱/۱ (۲) ۱/۲ (۳) ۱/۲۵ (۴) ۱/۲۵

- ۳۷- نوارهای حائل گیاهی (Vegetative Buffer strips) در نگهداشت و تлемاندازی رسوبات، ناشی از کدام جریان‌ها بهتر عمل می‌کنند؟

(۱) سیلان‌ها (۲) جریان عمیق (۳) جریان غیریکنواخت (۴) جریان یکنواخت کم‌عمق

- ۳۸- با فرض ثابت بودن همه عوامل، برآورد میزان هدر رفت خاک، در معادله جهانی هدر رفت خاک در خاک‌های بالاتر است.

(۱) لومی (۲) رُسی (۳) سیلته (۴) رسی - سیلته

- ۳۹- بیشترین اثرات تخریبی تگرگ بر خاک (در شرایط یکسان)، کدام مورد است؟

(۱) فقط تگرگ ببارد.

(۲) قبل از یک بارندگی ملایم

(۳) تگرگ همراه باران ریزه باشد.

- ۴۰- کدام مورد درباره جریان‌های گلی صدق نمی‌کند؟

(۱) در جریان‌های گلی، رسوبات درشت دانه دیده نمی‌شود.

(۲) بالا بودن غلظت رسوب در جریان‌های گلی، باعث افزایش سرعت آن‌ها می‌شود.

(۳) قدرت حمل رسوب در جریان‌های گلی از قدرت حمل رسوب سولیفلکسیون بیشتر است.

(۴) جریان‌های گلی در مناطقی حادث می‌شوند که در بالادست سازنده‌های ریزدانه وجود داشته باشد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

- ۴۱- در دو مقطع زمانی به فاصله ۳۰ سال، بین شدت بارندگی و میزان رسوب حاصل از یک دامنه آزمایشی، همبستگی برقرار شده است. در مقطع زمانی اول این رابطه، خطی و در مقطع زمانی دوم (بعد از ۳۰ سال)، این رابطه، لگاریتمی بوده است. کدام مورد محتمل‌تر است؟

- ۱) غنی‌تر شدن پوشش گیاهی دامنه پس از ۳۰ سال ۲) فقیرتر شدن پوشش گیاهی دامنه پس از ۳۰ سال
۳) کمتر شدن شدت بارندگی پس از ۳۰ سال ۴) بیشتر شدن عمق بارندگی پس از ۳۰ سال

- ۴۲- کدام روش، در اندازه‌گیری قطر قطره بارش مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- Momentum (۴) Stainable (۳) Falcon (۲) Haricsen (۱)

- ۴۳- کدام مورد در رابطه $A = F \cdot C(y) \cdot i(t_C, y) \cdot A$ درست است؟

- ۱) فرمول احتمالی وقوع سیلاب‌ها می‌باشد.
۲) صورت احتمالی فرمول استدلای است.
۳) فرمول تعبینی فرمول استدلای است.
۴) صورت تعیینی فرمول استدلای است.

- ۴۴- اگر در آبراهه بر اثر تغییرات ایجاد شده شب حد از ۲۵٪ شیب طبیعی آبراهه به ۵٪ آن افزایش یابد، پتانسیل رسوب‌گیری سازه احداث شده چه تغییری خواهد کرد؟

- ۱) ۱/۵ برابر کمتر می‌شود.
۲) ۱/۵ برابر بیشتر می‌شود.
۳) ۱/۵ برابر می‌شود.
۴) ۱/۵ برابر بیشتر می‌شود.

- ۴۵- بهمنظور بالا آوردن سطح آب در رودخانه جهت استفاده در اراضی کشاورزی اطراف دشت‌های سیلابی از کدام سدها بیشتر استفاده می‌شود؟

- ۱) انحرافی ۲) اصلاحی ۳) مخزنی ۴) قوسی


- ۴۶- اگر قاعده سازه‌ای ۱۲ متر باشد و محل برخورد نیروهای برآیند وارد بر بدنه از مرکز قاعده ۳ متر فاصله داشته باشد، نیروی وارد به خاک زیر پی در محل سراب چقدر است؟

$$+\frac{5}{2} \frac{P}{B} \quad ۴ \quad PB \quad ۳ \quad -\frac{1}{2} \frac{P}{B} \quad ۲ \quad (۱) صفر$$

- ۴۷- در یک سد L شکل با ارتفاع ۸ متر و عرض کف ۲۰ متر، اگر مجموع طول پاشنه در پایاب و ضخامت سد ۲ متر و وزن مخصوص سیلاب ۱/۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد، افزایش وزن سد در واحد عرض در دبی طراحی چند Ton است؟ (از وزن ارتفاع آب در بالای سرریز صرف‌نظر شود)

$$1440 \quad 4 \quad 960 \quad 3 \quad 72 \quad 2 \quad (۱) ۴۸$$

- ۴۸- اگر نحوه چینش یک سد گابیونی از حالت یک به حالت دو تغییر کند پایداری سد چگونه تغییر می‌کند؟ (ابعاد یکسان است)



حالت یک

حالت دو

(۱) پایداری به دلیل عدم تغییر در وزن سد تغییر نمی‌کند.

(۲) پایداری به دلیل تغییر موقعیت مرکز ثقل سازه افزایش می‌یابد.

(۳) پایداری به دلیل افزایش وزن آب در پایاب افزایش می‌یابد.

(۴) پایداری به دلیل عدم قرار گرفتن آب بر روی پله‌های سمت شرب کاهش می‌یابد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

- ۴۹- با توجه به رابطه تحلیلی $\frac{1}{3}b^2 - bnH + \frac{n^2 H^2}{3} + \frac{\gamma h^2}{\rho} - \frac{2}{3} \frac{\gamma H^3}{H\rho}$ ، محاسبه ضخامت سد در قسمت سرربز (b)، کدام مورد باعث کاهش مقدار b می‌شود؟
- (۱) افزایش ارتفاع مفید سد
(۲) افزایش شیب بدنه پایاپ سد
(۳) افزایش وزن مخصوص آب
(۴) افزایش وزن مخصوص مصالح سد
- ۵۰- وزن یک قطعه یک متري از یک سد سنگ‌چین ملات‌دار به ارتفاع ۴ متر با شیب پایاپ ۲۰٪ و با وزن مخصوص ۲/۲ تن بر متر مکعب چند تن است؟
- (۱) ۱۴/۰۱ (۲) ۱۴/۰۲ (۳) ۱۴/۰۷ (۴) ۱۴/۰۸
- ۵۱- ثابت بودن مقدار نفوذ آب در یک خاک خشک در شروع بارش،تابع کدام ویژگی از بارندگی است؟
- (۱) مدت (۲) شدت (۳) تعداد (۴) پراکنش
- ۵۲- بر روی دامنه‌ای ۱۰ پیکه به طور منظم کوبیده شده که هر پیکه نماینده ۲ هکتار از سطح دامنه است، اگر متوسط فرسایش از کل سطح دامنه ۲/۵ میلی‌متر در سال و اندازه‌گیری‌ها نشانگر متوسط فرسایش ۷ میلی‌متري از ۴ پیکه و صفر از سه پیکه باشد، حجم رسوب تهشیش شده بر روی دامنه چند مترمکعب است؟
- (۱) ۳۰ (۲) ۶۰ (۳) ۲۸۰ (۴) ۵۶۰
- ۵۳- عمق پی در یک سد سنگ‌چین ملات‌دار با ضخامت پاشنه ۴۰ سانتی‌متر برابر ۱/۲ متر در نظر گرفته شده است. ارتفاع کل سد چند متر است؟
- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶
- ۵۴- در سدهای اصلاحی بدون خاک‌ریزی دستی مقدار عرض مختصاتی نیروی F (نیروی کل وارد بر سد) چه مقدار است؟
- (۱) $Z \cdot \left(\frac{F_1}{F}\right)$ (۲) $C + Z \cdot \left(\frac{F_1}{F}\right)$ (۳) $C + Z \cdot \left(\frac{F}{F_1}\right)$ (۴) $C + Z$
- ۵۵- ارتفاع Gousset در یک سد بتُنی L شکل با ارتفاع ۶ متر، چند سانتی‌متر است؟
- (۱) ۵۰ (۲) ۶۰ (۳) ۷۰ (۴) ۷۵

مرتع‌داری:

- ۵۶- کدام مورد درباره گراس‌هایی که رشد و توسعه ساقه در آن‌ها زیاد است و ساختار رگ‌برگی دارند، درست است؟
- (۱) دام علاقه به چرا دارد.
(۲) کیفیت علوفه بالا است.
(۳) دام تمایلی به چرا ندارد.
- ۵۷- به کدام دلیل دام‌های چراکننده در مرتع به پروتئین موجود در علوفه گیاهان نیاز دارند؟
- (۱) کارایی مصرف انرژی متابولیسمی پایین است.
(۲) برای تأمین انرژی خام برای حرکت بهسوی آشخوار و آغل.
(۳) انرژی اولیه مورد نیازشان از کربوهیدرات‌ها، لیپیدها و پروتئین‌ها تأمین می‌شود.
(۴) برای تأمین نیتروژن و اسیدآمینه برای فعالیت‌های میکروبی درون شکمبه و متابولیسم در سطح بافت‌ها
- ۵۸- کدام جنس‌های گیاهی، به دلیل سمی بودن مورد استفاده و تعلیف دام قرار نمی‌گیرند؟
- Eryngium, Euphorbia, Peganum (۲) Euphorbia, Verbascum, Peganum (۱)
Phlomis, Peganum, Centaurea (۴) Peganum, Cousinia, Noaea (۳)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

- ۵۹- کدام عامل در مدیریت اصولی مرتع اهمیت بیشتری دارد؟
(۱) اصلاح مرتع
(۲) پراکنش آبخیزداری
(۳) کنترل تعداد دام چراکننده
(۴) قطعه‌بندی و حصارکشی مرتع
- ۶۰- کدام عوامل فصلی، بر تولید گیاهان مرتعی مؤثر هستند؟
(۱) فصل چرای دام، درجه حرارت
(۲) آفات، توده علوفه، تجزیه و پوسیدگی
(۳) تابش خورشید، درجه حرارت، رطوبت
(۴) چرای گیاهان، نوع دام چراکننده، شدت چرا
- ۶۱- به آنگالوئیدها، گلوکوسیلوئیدها و سیانوژنیک‌ها چه ترکیباتی گفته می‌شود و چه اثری بر چرای دام از این گیاهان دارد؟
(۱) ترکیبات اولیه، افزایش دهنده شدت چرا
(۲) ترکیبات ثانویه، کاهش چرای دام
(۳) ترکیبات اولیه، افزایش دهنده کیفیت علوفه
(۴) ترکیبات اولیه، افزایش دهنده میزان خوشخوارکی
- ۶۲- از بین دام‌های چراکننده از مرتع کدام نوع دام طبع غذاخوری عمومی دارد؟
(۱) بز
(۲) گوسفند
(۳) گاو
(۴) گاومیش
- ۶۳- گوسفند، بز و گاو چراکننده از مرتع به ترتیب به کدام فرم رویشی گرایش دارند؟
(۱) پهنه برگان علفی، بوتهای و گندمیان
(۲) بوتهای ها، گراس‌ها، پهنه برگان علفی
(۳) گندمیان، پهنه برگان علفی و بوتهای ها
- ۶۴- در صورت محدودیت منابع آب در مرتع، کدام شرایط برای مرتع نزدیک به منابع آب به وجود می‌آید؟
(۱) کمتر مورد توجه دام قرار می‌گیرد.
(۲) پوشش گیاهی انبوهایتر می‌شود.
(۳) بیش از حد بهره‌برداری می‌شوند.
(۴) در ترکیب گیاهی آن‌ها گیاهان کلاس II بیشتر می‌شود.
- ۶۵- به کدام دلیل، چرای گوسفند در چمنزارها مناسب نیست؟
(۱) کمبود نمک
(۲) عدم وجود منابع آب کافی
(۳) به دلیل راهنمایی زیاد و لگدکوب کردن خاک
(۴) وجود گیاهان مرغوب زیاد که باعث نفخ دام می‌شود.
- ۶۶- در مرتع کنش‌های رقابتی، ترکیب گونه‌های گیاهی با کدام عوامل تغییر می‌کند؟
(۱) شدت، مدت، تکرار و فصل چرا
(۲) نوع دام چراکننده از مرتع و فاصله منابع شرب دام
(۳) حساسیت خاک به فرسایش و کیفیت آب مرتع
(۴) شیب مرتع و شایستگی علوفه مرتع برای چرای بز
- ۶۷- کدام مورد به ترتیب معرف گونه‌های گیاهی یک‌ساله و چندساله (گندمیان و فورب) مرتعی است؟
(۱) بادوام - بی‌دوام
(۲) بی‌دوام - بادوام
(۳) پایدار - ناپایدار
(۴) خوشخوارک - غیرخوشخوارک
- ۶۸- کدام مورد معرف انتخاب یک گونه گیاهی از بین چند گونه گیاهی توسط دام است؟
(۱) مصرف
(۲) فرم رویشی
(۳) کیفیت علوفه
(۴) ارجحیت چرایی
- ۶۹- در کدام دسته از مرتع نقش موجود زنده در نوع پوشش گیاهی فعلی مؤثرتر است؟
(۱) چمنزارها
(۲) مرتع تخریب‌یافته
(۳) مرتع با وضعیت خوب
(۴) مرتع بی‌لاقی
- ۷۰- در گیاهان مرتعی ADF، شامل کدام ترکیبات شیمیایی هستند؟
(۱) انرژی خام
(۲) کل نیتروژن
(۳) سلولز و لگنین
(۴) محتویات سلولی - لکنین

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۷۱ - رشد و عملکرد ریشه گیاهان مرتعدی به کدام عوامل بستگی دارد؟

- (۱) نوع دام چراکننده در مرتع
- (۲) شدت و تکرار چرای اندامهای هوایی
- (۳) شدت برداشت اندامهای زیرزمینی
- (۴) کیفیت و خوشخوارکی گیاهان مرتعدی

- ۷۲ - حد بهره‌برداری مجاز، در کدام حالت می‌تواند بیشتر باشد؟

- (۱) در سال‌های خشکسالی
- (۲) در بالادست حوزه‌های آبخیز
- (۳) در حالت رکود رشد گیاهان اصلی
- (۴) در مراتعی که به تازگی تحت عملیات اصلاح قرار گرفته‌اند.

- ۷۳ - برای حفاظت از مرتع و جلوگیری از تخریب آن‌ها و حفظ و پایداری تولیدات مرتعدی در استراتژی مدیریت باید به کدام مورد توجه کرد؟

- (۱) به شایستگی خاک مرتع
- (۲) به شبب مرتع و منابع آب موجود در آن
- (۳) مورفولوژی نمو و عملکرد فیزیولوژی گونه‌های نادر
- (۴) مورفولوژی نمو و عملکرد فیزیولوژی گونه‌های غالب

- ۷۴ - وجود کدام گیاهان مرتعدی در ترکیب گیاهی بهتر است؟

- (۱) ارزش غذایی بیشتر، حساس به چرا، علوفه حاصل از گراس‌ها
- (۲) نسبت برگ به ساقه بیشتر، کیفیت علوفه متوسط، مقاوم به بیماری
- (۳) مقاوم به خشکی، ارزش غذایی پایین، دوره رویش طولانی، ماده خشک فراوان
- (۴) دارای کیفیت علوفه بالاتر، مقاوم به چرا دام، تولید ماده خشک بالا، فصل رشد طولانی

- ۷۵ - در چه زمانی باید دام از مرتع خارج شود؟

- (۱) گیاهان در مرحله گلدهی باشد.
- (۲) بردها به سن فروش رسیده باشند.
- (۳) همه گیاهان در حد بهره‌برداری چرا شده باشند.
- (۴) گیاهان خوشخوارک به اندازه حد بهره‌برداری چرا شده باشند.

- ۷۶ - مقدار رواناب ایجاد شده در مراتع به ترتیب از راست به چپ با کدام عامل رابطه معکوس و با کدام عامل رابطه مستقیم دارد؟

- (۱) درصد پوشش - شبب
- (۲) شبب - وضعیت مرتع
- (۳) ارتفاع گیاه - شبب
- (۴) وضعیت مرتع - ارتفاع از سطح دریا

- ۷۷ - آسیب‌بزیری گیاهان در یک فرم رویشی واحد نسبت به چرا، بیشتر به کدام عامل (عوامل) بستگی دارد؟

- (۱) ارتفاع گیاهان
- (۲) ارتفاع چرا
- (۳) سن و خوشخوارکی گیاهان
- (۴) محل قرارگیری جوانه انتهایی

- ۷۸ - کدام عوامل در مرتع بر روی جمعیت دام چراکننده، اثر می‌گذارند؟

- (۱) مزه آب شرب دام، دمای هوا، شبب
- (۲) وضعیت منابع علوفه، موقعیت منابع آب، محدودیت فیزیکی
- (۳) روش چرایی، فرم رویش گیاه، رشد مجدد گیاهان
- (۴) فرم رویشی گیاهان، نزدیکی منابع آب، هیدرولوژی مرتع

- ۷۹ - کدام مورد باعث تخریب بیشتر گیاهان مرتعدی در مراتع مناطق خشک می‌شود؟

- (۱) چرای سنگین
- (۲) چرای زودرس
- (۳) چرای انتخابی
- (۴) چرای سنگین و دائمی

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۸۰- افزایش محصول به ازاء رأس دام با افزایش محصول به ازاء سطح، چه رابطه‌ای دارد؟
- (۱) معکوس (۲) مستقیم (۳) موازی (۴) متعادل

هیدرولوژی کاربردی:

- ۸۱- کدام مورد معرف دبی ویژه یا دبی مخصوص است؟
- (۱) میزان دبی متوسط روزانه است.
(۲) میزان دبی در واحد سطح است.
(۳) دبی ناشی از رواناب مستقیم که فقط ناشی از باران است.
(۴) حداقل میزان دبی که در سطح یک حوضه می‌تواند جریان یابد.
- ۸۲- یک بارش مازاد ۲ سانتی‌متر رواناب مستقیم تولید کرده، دبی اوج سیل معادل ۲۰ متر مکعب در ثانیه و زمان اوج معادل ۱۰ ساعت بوده است. با توجه به موارد مذکور کدام گزینه درست است؟
- (۱) زمان اوج هیدروگراف واحد این بارش معادل ۵ ساعت خواهد بود.
(۲) زمان اوج هیدروگراف واحد این بارش معادل ۲۰ ساعت خواهد بود.
(۳) دبی اوج هیدروگراف واحد این بارش معادل ۴۰ متر مکعب بر ثانیه خواهد بود.
(۴) دبی اوج هیدروگراف واحد این بارش معادل ۱۰ متر مکعب بر ثانیه خواهد بود.
- ۸۳- انجام اقدامات آبخیزداری در سطح یک حوضه کوچک به منظور کاهش سیل خیزی چه تأثیری بر سری زمانی داده‌های خروجی از همان حوضه خواهد داشت؟
- (۱) باعث افزایش همگنی سری زمانی داده‌های سیل می‌شود.
(۲) باعث از بین رفتن همگنی سری زمانی داده‌های سیل می‌شود.
(۳) باعث ایجاد روند افزایش در سری زمانی داده‌های سیل می‌شود.
(۴) باعث ایجاد نوسانات فصلی در سری زمانی داده‌های سیل می‌شود.
- ۸۴- کدام مورد درست است؟
- (۱) هر چه تراکم آبراهه بیشتر باشد دبی اوج سیل هم بیشتر است.
(۲) هر چه حوضه کشیده‌تر باشد دبی اوج سیل هم بیشتر است.
(۳) هر چه طول آبراهه بیشتر باشد دبی اوج حوضه هم بیشتر است.
(۴) هر چه زمان تمرکز بیشتر و مدت بارندگی کم‌تر باشد دبی اوج سیل بیشتر است.
- ۸۵- کدام ویژگی فیزیوگرافی حوضه، بیشترین تأثیر را بر حجم سیل دارد؟
- (۱) مساحت حوضه
(۲) زمان تمرکز حوضه
(۳) ضریب شکل حوضه
(۴) ارتفاع متوسط حوضه
- ۸۶- کدام مورد، بیانگر عوامل مورد استفاده در تعیین ضریب برای روش دوم کوک در تخمین رواناب است؟
- (۱) نوع خاک، اقلیم، شب
(۲) پوشش گیاهی، خاک، شب، زمان تمرکز
(۳) پوشش گیاهی، خاک، زمان تأخیر، شب
(۴) پوشش گیاهی، نوع خاک و وضعیت زهکشی، شب

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

-۸۷- کدام مورد در تبدیل هیدروگراف واحد بلند مدت به کوتاه مدت، درست است؟

- (۱) دبی اوج کاهش و زمان پایه کاهش می‌یابد.
- (۲) دبی اوج افزایش، زمان پایه کاهش می‌یابد.
- (۳) زمان پایه کاهش ولی مقدار بارش افزایش می‌یابد.
- (۴) مقدار بارش هیدروگراف کاهش و زمان پایه افزایش می‌یابد.

-۸۸- در حوزه‌هایی که مساحت آن‌ها کمتر از $5/2$ کیلومتر مربع است، کدام روش جهت برآورده رواناب و دبی اوج مناسب نیست؟

- (۱) روش استدلالی، روش شماره منحنی
- (۲) آنالیز منطقه‌ای سیلان، هیدروگراف واحد
- (۳) روش استفاده از منحنی‌های نفوذپذیری، روش شماره منحنی
- (۴) روش استدلالی، روش استفاده از منحنی‌های نفوذپذیری

-۸۹- در محاسبه زمان تأخیر برای هیدروگراف واحد اشتایدر، کدام ویژگی حوضه آبخیز تأثیری ندارد؟

- (۱) شب حوضه

۴) طول رودخانه تا مرکز ثقل

-۹۰- کدام مورد، مهم‌ترین کاربرد توزیع مجانبی نوع سوم ویبول در هیدرولوژی است؟

- (۱) برآوردهای حداقل

۴) تعیین مقدار متوسط دبی ماهانه

-۹۱- کدام رابطه، در محاسبه زمان تا اوج بر حسب دقیقه در هیدروگراف واحد بدون بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

$$T_c = \sqrt{6} T_p + \sqrt{T_p} \quad (1)$$

$$T_p = T_c + \sqrt{6} \sqrt{T_c} \quad (2)$$

$$T_p = \sqrt{6} T_c + \sqrt{T_c} \quad (3)$$

$$T_p = \sqrt{6} T_c + \sqrt{T_c} \quad (4)$$

-۹۲- کدام مورد معرف هیتوگراف است؟

- (۱) تغییرات سطح آب نسبت به زمان

۴) تغییرات مقدار بارندگی نسبت به زمان

۳) وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری سطح آب رودخانه‌ها به کار می‌رود.

۴) وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری سطح آب‌های زیرزمینی به کار می‌رود.

-۹۳- با داشتن ۲۳ سال داده‌های حداقل لحظه‌ای در یک ایستگاه آب سنجی، میانگین داده‌ها ۱۱۲، میانگین لگاریتم

داده‌ها $2/07$ ، انحراف معیار لگاریتم داده‌ها $0/12$ و ضرب چولگی لگاریتم داده‌ها $0/2$ به دست آمده است. با

در نظر گرفتن ضریب تناوب یا فراوانی برابر $2/326$ که مربوط به دوره بازگشت صدساله می‌باشد، حداقل دبی

۱۰۰ ساله با استفاده از توزیع لوگنرمال چقدر است؟

$$2/35 \quad (1)$$

$$54/02 \quad (2)$$

$$112 \quad (3)$$

$$223/4 \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۹۴- در جدول زیر، مختصات هیدروگراف واحد ۳ ساعته یک حوزه آبخیز ارائه شده است. مختصات هیدروگراف واحد ۶ ساعته آن کدام است؟

زمان (ساعت)	۰	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴
دبی (متر مکعب بر ثانیه)	۰	۱	۴	۸	۱۲	۹	۴	۲	۰

زمان (ساعت)	۰	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷
دبی (متر مکعب بر ثانیه)	۰	۰,۵	۲,۵	۶	۱۰	۱۰,۵	۶,۵	۳	۱	۰

زمان (ساعت)	۰	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷
دبی (متر مکعب بر ثانیه)	۰	۱,۵	۶	۱۳/۱	۲۰/۶	۲۱/۴	۱۴	۶/۹	۲/۳	۰

زمان (ساعت)	۰	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷
دبی (متر مکعب بر ثانیه)	۰	۳	۱۲	۲۶,۲	۴۱,۲	۴۲,۸	۲۸	۱۲,۸	۴,۶	۰

زمان (ساعت)	۰	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷
دبی (متر مکعب بر ثانیه)	۰	۰,۵	۲	۴/۰۳	۶,۸۷	۷/۱۴	۴/۶۷	۲/۳	۰/۷۷	۰

- ۹۵- حد بالا و پایین مساحت برای استفاده از روش استدلالی چند کیلومتر مربع است؟

(۱) ۱۰-۵۰

(۲) ۵۰-۱۰۰

(۳) ۱۰۰-۵۰۰

(۴) ۱۰۰۰-۵۰۰۰

- ۹۶- در حوزه‌ای به مساحت ۱۶ هکتار، یک بارش ۵ ساعته به ترتیب در ساعات مختلف، دارای مقادیر ۸، ۱۲، ۱۵، ۲۴ و ۳/۵ میلی‌متر بوده است. اگر شاخص فی (ϕ) حوزه، برابر $1/2$ سانتی‌متر بر ساعت باشد، حجم بارش مازاد ناشی از این رگبار چند مترمکعب است؟

(۱) ۴۰۰۰

(۲) ۱۸۵۹۰

(۳) ۲۲۸۰۰

(۴) ۲۴۰۰۰

- ۹۷- در حوضه‌ای به مساحت 1000 km^2 ، با داشتن هیدروگراف واحد ۱۲ ساعته و زمان تأخیر $14/8$ ساعت، مقدار دبی اوج لحظه‌ای را به روش SCS چند متر مکعب بر ثانیه است؟

(۱) ۱/۰

(۲) ۷/۷۶

(۳) ۱۰

(۴) ۱۰۰

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۹۸- احتمال اینکه حداکثر دبی سالانه در رودخانه‌ای به مقدار بیش از ۵۰ متر مکعب بر ثانیه، حداقل یکبار در ۲ سال آینده رخ دهد، چقدر است؟ (دوره بازگشت این دبی ۵ سال است)
- (۱) ۱٪
(۲) ۲٪
(۳) ۲۶٪
(۴) ۳۶٪
- ۹۹- کدام مورد، بیانگر اهمیت استفاده از سری‌های جزئی در تحلیل فراوانی سیل است؟
- (۱) درنظر گرفتن دبی‌هایی که خسارتی زیادی ندارند.
(۲) درنظر گرفتن دبی‌هایی که احتمال وقوع آن‌ها زیاد است.
(۳) درنظر گرفتن دبی‌هایی که می‌بایست از نظر ایمنی سازه‌ها درنظر گرفته شوند.
(۴) درنظر گرفتن دبی‌هایی کوچک در محاسبه دوره بازگشت دبی سیل ۱۰۰ ساله
- ۱۰۰- کدام عوامل اصلی جهت برآورد مقدار شماره منحنی (CN) در یک واحد هیدرولوژیکی است؟
- (۱) میزان تلفات و شبی زمین
(۲) شبی زمین و میزان ماده آلی در خاک
(۳) نفوذپذیری خاک و نوع استفاده از آب
(۴) گروه هیدرولوژیکی خاک و نوع کاربری اراضی
- ۱۰۱- در حوضه‌ای به مساحت ۲۰۰ هکتار و زمان تمرکز نیم ساعت، بارندگی ۲۴ دقیقه‌ای روانابی به ارتفاع ۱۵ میلی‌متر ایجاد کرده است. دبی اوج سیل با استفاده از روش هیدروگراف مثلثی چند متر مکعب بر ثانیه است؟
- (۱) ۱۰/۵
(۲) ۱۲/۶
(۳) ۱۰۵
(۴) ۱۲۶٪
- ۱۰۲- کدام مورد نشان دهنده رابطه کالیفرنیا برای محاسبه درصد احتمال تجربی است؟
- $$\%P = \frac{m - 0/3}{n + 0/4} \times 100 \quad (1)$$
- $$\%P = \frac{m - 0/5}{n} \times 100 \quad (2)$$
- $$\%P = \frac{m}{n} \times 100 \quad (3)$$
- $$\%P = \frac{m}{n+1} \times 100 \quad (4)$$
- ۱۰۳- کدام مورد نادرست است؟
- (۱) دبی کلاسه ارتباط بین دبی و زمان است.
(۲) منحنی سنجه آب ارتباط بین دبی و ارتفاع آب است.
(۳) روش ادامه دادن منحنی سنجه آب در دبی‌های سیلابی استثنایی به کار میرود.
(۴) دبی مشخصه کم آبی مقدار جریانی است که در ۳۵۵ روز از سال دبی کمتر از آن است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

۱۰۴- حدپایین و بالای مساحت حوزه آبخیز برای استفاده از تنوری هیدروگراف واحد، چند کیلومتر مربع است؟

- (۱) ۲۰-۵۰۰۰۰
- (۲) ۲۰-۵۰۰۰
- (۳) ۲-۵۰۰۰
- (۴) ۲-۵۰۰

۱۰۵- کدام مورد نادرست است؟

- (۱) داشتن آمار دقیق در یک ایستگاه باعث همگنی داده‌ها می‌شود.
- (۲) منشأ متفاوت برای وقوع سیلاب‌ها باعث ناهمگنی داده‌ها می‌شود.
- (۳) در یک حوزه آبخیز، در طی زمان تغییرات از نظر بهره‌وری از اراضی صورت گرفته باشد، باعث ناهمگنی داده‌ها می‌شود.
- (۴) احداث تأسیساتی نظیر سدهای مخزنی و انحرافی و سیستم‌های پخش سیلاب در یک حوزه آبخیز باعث ناهمگنی داده‌ها می‌شود.

ژئومورفولوژی و زمین‌شناسی:

۱۰۶- نتیجه نهایی اثر آب و اکسیژن بر کانی پیریت در اقلیم نیمه‌مرطوب به تولید کدام ترکیب شیمیایی منجر می‌شود؟

- (۱) سولفات آهن
- (۲) سولفید آهن
- (۳) هیدروکسید آهن
- (۴) سولفات اکسید آهن

۱۰۷- پگماتیتها و آپلیت‌ها معمولاً به صورت هستند و سنگ‌های را قطع می‌کنند.

- (۱) دایک - رسوبی درونگیر
- (۲) سیل - رسوبی و دگرگونی
- (۳) دایک - قدیمی تر
- (۴) سیل - آذرین نفوذی و خروجی

۱۰۸- رهایی از فشار، بر اثر برداشته شدن بار ناشی از سنگ‌های رویی و ایجاد «ساختمان پوسته» معمولاً در کدام سنگ‌ها دیده می‌شود؟

- (۱) کنگلومرا و شیل
- (۲) گرانیت و ماسه‌سنگ
- (۳) دولومیت و اسلیت
- (۴) آندزیت و سنگ آهک

۱۰۹- در کدام سنگ بین رده سنگ و رنگ سنگ رابطه عکس وجود دارد؟

- (۱) بازالت
- (۲) گرانیت
- (۳) ریولیت
- (۴) ایسیدین

۱۱۰- شیستوزیته به کدام ویژگی از سنگ‌های دگرگونی اشاره می‌کند؟

- (۱) ورقه ورقه شدن
- (۲) شکستگی نامنظم
- (۳) لایه‌های تیره و روشن
- (۴) شکل و نوع کانی‌ها

۱۱۱- کدام آتشفسان همراه با دود غلیظ و مواد پرتابی زیاد است؟

- (۱) پله
- (۲) هاوایی
- (۳) ولکاتو
- (۴) استرومبوالی

۱۱۲- کدام نوع درزه و شکاف بر فرایند کارستی شدن مؤثرتر است؟

- (۱) اولیه دیازنزی
- (۲) ثانویه تکتونیکی
- (۳) ثانویه انقباضی
- (۴) برگشتی تکتونیکی

۱۱۳- گسل رانده سراسری ایران در کدام زون و با چه سازند سنگی همراه است؟

- (۱) رسوبی دریای خزر - آمیزه رنگین
- (۲) رسوبی دریای عمان - شیل قرمز رنگ
- (۳) زاگرس خرد شده - توف
- (۴) زاگرس چین خورده - افیولیت

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۷

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

۱۱۴- تزریق دیاپیری چیست و با چه موادی عمل می‌کنند؟

(۱) حرکت مواد سیال ناشی از ذوب ناقص، کانی‌های زودگذار

(۲) حرکت مواد خمیری به علت فشارهای تکتونیکی - مagmaهای اسیدی و حد واسط

(۳) جابه‌جایی مواد خمیری تزریق شده از گوشته به پوسته، magmaهای گرانیتی

(۴) حرکت مواد در داخل پوسته جامد زمین به علت اختلاف چگالی، سنگ‌های تبخیری

۱۱۵- هاگ براساس کدام پارامترها، تپه‌های ماسه‌ای را طبقه‌بندی کرد؟

(۱) درصد پوشش گیاهی - رژیم باد - میزان تأمین ماسه

(۲) درصد ذرات ریخاک - رژیم باد - میزان تأمین ماسه

(۳) رطوبت خاک - درصد پوشش گیاهی - میزان تأمین ماسه

(۴) رطوبت خاک - درصد ذرات ریخاک - میزان تأمین ماسه

۱۱۶- کدام توالی نماینده تپه‌های پلایا به ترتیب از راست به چپ است؟

(۱) دلتای رسی، کویر، حاشیه مرطوب

(۲) حاشیه مرطوب، کویر، دریاچه کویری، کویر

(۳) حاشیه مرطوب، کویر، دریاچه کویری، دلتای رسی

۱۱۷- کدام مورد به ترتیب نشان دهنده سنگ‌های بینابین آذرین - دگرگونی و آذرین - رسوبی است؟

(۱) شیل، بازالت

(۲) سیلت سنگ، مرمریت

(۳) ماسه‌سنگ، گنیس

۱۱۸- در کدام دوره کوهزایی، شکل زمین ساختی کنونی پلایاهای ایران تکمیل شده است؟

(۱) لارامید

(۲) پاسادینی

(۳) سیمیرین بالایی

(۴) سیمیرین پیشین

۱۱۹- سازند (Formation) کدام واحد چینه‌شناسی است؟

(۱) سنگ چینه‌شناسی

(۲) فسیل چینه‌شناسی

(۳) زمان چینه‌شناسی

(۴) زمان زمین‌شناسی

۱۲۰- نخستین کانی‌هایی که در سری پیوسته و ناپیوسته بoven ایجاد می‌شوند، به ترتیب کدام است؟

(۱) پیروکسن

(۲) F_K, F_{Na}, F_{Ca}, F_{Mg}, F_{Al}, F_{Si}

(۳) آمفیبول

(۴) الیوین

۱۲۱- اغلب اراضی کشاورزی ایران در مناطق خشک و فراخشک در کدام تپ دشت‌سر واقع شده‌اند؟

(۱) دشت‌سر لخت

(۲) دشت‌سر پوشیده

(۳) دشت‌سر اپانداز

۱۲۲- کدام مورد به ترتیب بیانگر ویژگی‌های ماسه‌بادی و ماسه‌رودخانه‌ای است؟

(۱) زاویه‌دار با سطحی مات - گرد با سطحی صیقلی

(۲) نیمه‌گرد با سطحی صیقلی - زاویه‌دار با سطحی مات

(۳) گرد با سطحی مات - زاویه‌دار با سطحی مات

(۴) گرد با سطحی مات - گرد با سطحی نسبتاً صیقلی

۱۲۳- رسوبات کواترنر کدام تپ‌های رُنومورفولوژی مناطق بیابانی قدیمی‌تر است؟

(۱) کویر

(۲) دشت‌سر پوشیده

(۳) دشت‌سر فرسایشی

(۴) دشت‌سر اپانداز

۱۲۴- اشکال تراکمی ماسه‌بادی از نظر اندازه هندسی چه توالی رتبه‌ای دارند؟

(۱) درا آ - بارخان - نیکا - ریپل مارک - قورد

(۲) نیکا - پارابولیک - ریپل مارک

(۳) مگا بربخان - نیکا - قورد

(۴) مگا بربخان - پارابولیک - نیکا - ریپل مارک

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۱۲۵- کدام شکل از تپه‌های ماسه‌ای حاصل بادهای با فاکتور یک جهتی سالانه ($UD=1$) است؟
(۱) سیف (۲) سیلک (۳) قوردن (۴) بارخان
- ۱۲۶- حداقل سرعت باد و ایدی در کدام قسمت از یک تپه ماسه‌ای است؟
(۱) انتهای دامنه بادپناه - قله
(۲) قله - ابتدای دامنه روبه باد
(۳) قله - انتهای دامنه پشت به باد
(۴) میانه دامنه بادپناه - ابتدای دامنه روبه باد
- ۱۲۷- اجرای معادله ناهمواری دیویسی تابع کدام عوامل است؟
(۱) ساختمان - فرایند - زمان
(۲) ستگ - اقلیم - مرحله
(۳) تکتونیک - فرسایش - هوازدگی - زمان
(۴) فرسایش - هوازدگی - زمان
- ۱۲۸- سری گلديچ در زئومورفولوژي چه کاربردي دارد؟
(۱) توالی آمادگي به فرسایش آبي سنگ‌ها که از رسوبی به آذرین کاهش می‌يابد
(۲) توالی مقاومت به هوازدگي کانی‌ها که از سدیک به کلسیک افزایش می‌يابد
(۳) توالی حساسیت به هوازدگي کانی‌ها که از کلسیک به پتاسیک کاهش می‌يابد
(۴) توالی استعداد به فرسایش بادی سنگ‌ها که از ماسه‌سنگ به بازالت افزایش می‌يابد
- ۱۲۹- کدام تپه ماسه‌ای به عملیات تثبیت و کنترل، نیاز بیشتری دارد؟
(۱) قوردن (۲) برخانوئید (۳) بارخان بلند (۴) بارخان کوتاه
- ۱۳۰- در کدام تپ ساختمانی، لایه قدیمی بر روی لایه جدید قرار می‌گیرد؟
(۱) چین مایل - به علت فرسایش لایه‌ها
(۲) روراندگی - به علت حرکت لایه‌ها
(۳) چین خوابیده - به علت گسلش لایه‌ها

جامعه‌شناسی روستایی:

- ۱۳۱- کدام مورد درباره تحرك اجتماعی، نادرست است؟
(۱) معمولاً میزان تحرك اجتماعی در روستاهای بیشتر از مناطق عشایری است.
(۲) روستاییان با مهاجرت صرفاً به تحرك اقتصادی و با ازدواج به تحرك اجتماعی دست می‌يابند.
(۳) آموزش، اشتغال و ازدواج نقش مهمی در تحرك اجتماعی در جوامع صنعتی معاصر دارد.
(۴) تحرك اجتماعی عمودی عبارت است از حرکت فرد یا گروهی از مردم یک قشر، طبقه یا کاست اجتماعی به قشر، طبقه و کاست اجتماعی بالاتر.
- ۱۳۲- در حکمرانی روستایی، کدام مورد محوریت دارد؟
(۱) بخشی‌نگری در مدیریت روستایی
(۲) ارتقاء همکاری بین دولت و جامعه محلی
(۳) تقویت نقش تصدی گری دولت در تصمیم‌گیری امور روستایی
(۴) نگاه از بالا به پایین مدیریت روستایی
- ۱۳۳- ماهیت کدام بُنهای، براساس عوامل منقول بنا شده است؟
(۱) گاویندی (۲) بومی کار (۳) قمی کاری (۴) ارباب - رعیتی
- ۱۳۴- همکاری و یادگیری مستمر، دو تئوری مهم در دستیابی به کدام رویکرد مدیریت روستایی هستند؟
(۱) مدیریت تطبیقی
(۲) مدیریت اجتماع محور
(۳) مدیریت مشارکتی مبتنی بر سازگاری
(۴) مدیریت مشارکتی

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

۱۳۵ - کدام استراتژی توسعه روستایی، مخالف استفاده از برنامه‌های سرمایه‌داری در توسعه روستایی است؟

- (۱) رادیکال (۲) مدرنیسم (۳) تکنوکرات (۴) اصلاح طلب

۱۳۶ - کدام مورد از اثرات کوتاه‌مدت اصلاحات ارضی در جامعه روستایی ایران نبوده است؟

- (۱) تضعیف کشاورزی (۲) بالا رفتن موقعیت قدرت خرید زارعان

۱۳۷ - گسترش شیوه تولید خرده مالکی تقسیم شدن زمین‌های زراعی به قطعات خرد

۱۳۸ - کدام مورد درباره واحدهای مشاع تولیدی در جامعه روستایی نادرست است؟

- (۱) تشکیل واحدهای مشاع حاصل حرکت خودگوش دهقانی است.

(۲) اعضای واحدهای مشاع تولیدی متعهد می‌شوند که شخصاً در واحد تولیدی مشاع کار کنند.

(۳) مدیریت واحدهای مشاع تولیدی از درون روستا و به شیوه شورایی می‌باشد.

(۴) واحدهای مشاع تولیدی بعد از انقلاب اسلامی با لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی تشکیل شود.

۱۳۹ - نظریه تفکیک اجتماعی در جامعه روستایی سنتی ایران، با کدام عامل ارتباط و همبستگی دارد؟

- (۱) رابطه خویشاوندی (۲) مالکیت زمین

- (۳) شیوه تأمین معيشت خانواده (۴) نسبت فرزندان ذکور خانواده

۱۴۰ - در کدام نظام بهره‌برداری در جامعه روستایی ایران برای اولین بار محدوده ده به عنوان واحد اقتصادی - اجتماعی یکپارچه از هم گسیخته شد؟

- (۱) نظام ارباب رعیتی (۲) واحدهای کشت و صنعت

- (۳) شرکت‌های سهامی زراعی (۴) کشاورزی تجاری و سیع

۱۴۱ - کدام مورد بیانگر تفاوت بین قشرهای بزرگ و کارگر کشاورزی در جامعه روستایی ایران است؟

- (۱) تفاوت در شق‌دار بودن

- (۲) تفاوت در مالکیت عوامل تولید کشاورزی

- (۳) تفاوت در سهم بردن از محصول کشاورزی

- (۴) تفاوت وجود ندارد و هر دو قشر با نتیجه زراعت ارتباط دارند.

۱۴۲ - سطح اشتغال پایین و نظام چند کشتی از ویژگی‌های کدام نظام بهره‌برداری در ایران محسوب می‌شود؟

- (۱) نظام بهره‌برداری خرده مالکی (۲) نظام بهره‌برداری ارباب - رعیتی

- (۳) نظام بهره‌برداری کشت و صنعت (۴) نظام بهره‌برداری کوچک و متوسط بازارگانی

۱۴۳ - در کدام مرحله از اصلاحات ارضی در جامعه روستایی ایران، اجاره‌کاری اولویت‌دار و در کدام مرحله عضویت در شرکت‌های تعاونی روستایی شرط اصلی مالکیت زمین بوده است؟

- (۱) مرحله اول - مرحله اول (۲) مرحله اول - مرحله دوم

- (۳) مرحله دوم - مرحله اول (۴) مرحله دوم - مرحله دوم

۱۴۴ - کدام مورد از نتایج اصلاحات ارضی در روستاهای ایران به شمار نمی‌رود؟

- (۱) پیدایش بورژوازی روستایی (۲) گسترش نفوذ دولت در روستاهای

- (۳) آزادی عمل دهقانان در امور کشاورزی (۴) تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

۱۴۵ - کدام مورد نادرست است؟

- (۱) نظام خویشاوندی در عشایر در ایران، دوسویه است.

- (۲) مهم‌ترین ویژگی‌های معیشت عشایری شامل وابستگی به مرتع و وابستگی به ایلی است.

- (۳) مهم‌ترین ضوابط در زندگی عشایری به داشتن سرزمین مشترک و وابستگی ایلی است.

- (۴) سازمان ایلی نظامی است که خانواده هسته‌ای با واسطه آن به مجموعه ایل مرتبط می‌شود.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۰

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

۱۴۵- مهم‌ترین ملاک‌های مفهومی و حقوقی تفکیک روستا از شهر در ایران به ترتیب کدام است؟

- (۱) انبوی جمعیت - ساخت اقتصادی
(۲) ساخت اجتماعی - انبوی جمعیت
(۳) ساخت اقتصادی - انبوی جمعیت

۱۴۶- در طبقه‌بندی ساختار روستاهای قبل از اصلاحات ارضی، کدام مورد معرف اشاره بی‌زمین به ترتیب از رأس به قاعده هرم می‌باشد؟

- (۱) نسق‌داران، سرمایه‌داران ارضی، خوش‌نشینان
(۲) خوش‌نشینان، اجاره‌کاران، خرده مالکان
(۳) اجاره‌کاران، گاویندان، کارگران کشاورزی
(۴) گاویندان، اجاره‌کاران، کارگران کشاورزی

۱۴۷- براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراعع، مراعع حريم روستاهای چه وضعیتی دارند و سیستم مالکیت در این اراضی چگونه است؟

- (۱) ملی شدند - مشاع
(۲) ملی نشدند - مشاع
(۳) ملی شدند - مفروز
(۴) ملی نشدند - مفروز

۱۴۸- کدام مورد جزء عوامل قطعه قطعه شدن اراضی زراعی در ایران نبوده است؟

- (۱) رشد جمعیت
(۲) تناب زراعی
(۳) الگوی چند کشتی
(۴) بعد خانوار

۱۴۹- تقسیم کار در داخل بندها در جامعه روستایی سنتی ایران بر کدام اساس بوده است؟

- (۱) مهارت اعضای بنه - مالکیت عوامل تولید
(۲) سن اعضای بنه - مالکیت عوامل تولید
(۳) جنسیت اعضای بنه - مهارت اعضای بنه
(۴) مهارت اعضای بنه - سن اعضای بنه

۱۵۰- لغو نظام تیولداری در جامعه روستایی ایران در چه زمانی بوده و در تثبیت کدام نظام برداری مؤثر بوده است؟

- (۱) سال ۱۳۴۲ هجری شمسی - نظام اربابی
(۲) سال ۱۳۴۲ هجری شمسی - نظام خرده مالکی
(۳) سال ۱۳۲۵ هجری قمری - نظام اربابی
(۴) سال ۱۳۲۵ هجری قمری - نظام دهقانی

۱۵۱- وسیله تجمع نیروهای دهقانی و بسیج این نیروها برای بیان خواسته‌ها و حق طلبی‌ها و دستیابی به آرمان‌ها و خواسته‌های مشترک قانونی آن‌ها کدام است؟

- (۱) تعاضی
(۲) اتحادیه
(۳) شورای اسلامی
(۴) شرکت سهامی

۱۵۲- کدام مورد درباره شیوه سکونت روستاییان نادرست است؟

(۱) شیوه سکونت روستاییان عبارت است از شکل استقرارخانه‌ها و خانواده‌ها و دام‌های آن‌ها

(۲) شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی از عوامل مؤثر بر شیوه سکونت روستاییان هستند.

(۳) شیوه سکونت مرکز بیش از پراکنده در روستاهای تحت تأثیر مالکیت عوامل تولید بوده است.

(۴) شیوه زندگی و نظام بهره‌برداری از زمین مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شیوه سکونت روستاییان هستند.

۱۵۳- کدام مورد درباره هرم قدرت در روستاهای در گذشته نادرست است؟

(۱) خوش‌نشینان در هرم قدرت عبارت بودند از سوداگران، کارگران روستایی و کارمندان خدماتی

(۲) در دوره سنتی، خان‌ها، بیگ‌ها و اربابان فئودال در رأس هرم قدرت و خوش‌نشینان در قاعدة این هرم قرار داشتند.

(۳) گاویندان در هرم قدرت در طبقه بالاتر از نسق‌داران قرار می‌گیرند.

(۴) گاویندان در هرم قدرت گروهی بودند که عوامل منقول یا غیرمنقول تولید زراعی را در اختیار داشتند.

۱۵۴- کدام مورد از راهکارهای جامعه روستایی سنتی برای ارتقاء ظرفیت سازگاری خود نسبت به کم‌آبی نبوغ است؟

- (۱) تقسیم کار اجتماعی
(۲) تغییر الگوی کشت
(۳) گسترش نظام خرده مالکی
(۴) راهاندازی سازمان اجتماعی

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

۱۵۵- کدام مورد معرف یک نهاد اجتماعی است؟

(۱) خانواده، سازمان، گروه اجتماعی

(۲) خانواده، عرف، مذهب

(۳) الگوی نسبتاً پایدار مرتبط با نیاز اقتصادی، اجتماعی و اداری

(۴) الگوی کاملاً پایدار مرتبط با نیاز اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

اصلاح و توسعه مراتع:

۱۵۶- استراتژی اصلی در کنترل بیولوژیک گیاهان مهاجم مرتع توسط حشرات، کدام است؟

(۱) ریشه‌کنی گیاه مهاجم توسط حشره

(۲) انتخاب چندین حشره برای کنترل یک گیاه

(۳) ایجاد تعادل بین جمعیت حشره و گیاه مهاجم

(۴) هرچه تنوع میزان‌های حشره بیشتر باشد کنترل مؤثرer است.

۱۵۷- کدام مورد، بهترین شیوه کنترل گیاهان مهاجم پاچوش‌دار است؟

(۱) آتش‌سوزی

(۲) کنترل مکانیکی

(۳) کنترل بیولوژیک

(۴) ترکیبی از روش‌های آتش‌سوزی، کنترل بیولوژیک و کنترل مکانیکی

۱۵۸- کدام مورد درباره احداث پیتینگ در مرتع، درست است؟

(۱) در مراتع تخریب یافته استفاده می‌شود.

(۲) در اراضی با خاک‌های رسی احداث می‌شود.

(۳) در اراضی با خاک‌های سبک و شنی احداث می‌شود.

(۴) در اراضی که جهت شیب مشخص نیست، خاک چاله‌ها در هر دو طرف ریخته می‌شود.

۱۵۹- کدام مورد درباره ترکیب کودی گلدان‌ها برای کاشت نهال در اصلاح مرتع، درست است؟

(۱) ازت بیشتر فسفر کمتر

(۲) فسفر بیشتر ازت کمتر

(۳) ازت و فسفر به مقدار برابر

(۴) ترکیب مساوی ازت، فسفر و پتاس

۱۶۰- افزودن کدام نوع کود تنش کمتری برای گیاهان کاشته شده به روش کشت گلدانی باعث می‌شود و خطر گیاهان مهاجم را کاهش می‌دهد؟

(۱) کودهای گیاهی

(۲) کودهای حیوانی

(۳) کودهای زیستی (میکوریزا و باکتری‌ها)

(P , K , N)

۱۶۱- ضروری‌ترین روش اصلاح منابع آب شرب طبیعی (برک‌ها و گودال‌ها) در مرتع کدام است؟

(۱) مبارزه با جلبک‌های سبز آبی

(۲) اصلاح راه دسترسی دام به منبع آب

(۳) حذف گیاهان هرز آبزی اطراف منبع آب

(۴) پوشاندن سطح آب جهت جلوگیری از تبخیر

۱۶۲- کاشت کدام گونه گیاهی برای تأمین علوفه در فصل تابستان توصیه می‌شود؟

Cynodon dactylon (۲)

Secal montanum (۱)

Agropyron trichophorum (۴)

Bromus tomentellus (۳)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۲

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

- ۱۶۳- در کدام روش احیا بیولوژیک، بیشتر بودن توانایی رقابت گونه‌های کاشت شده اهمیت بیشتری دارد؟
- (۱) کپه‌کاری
(۲) میان‌کاری
(۳) کاشت در داخل چاله‌های هلالی
(۴) کاشت در داخل فاروها
- ۱۶۴- اگر یک گونه سردسیر را در منطقه گرم‌سیر بکاریم، مهم‌ترین خطری که نهال‌های گیاه را در فصل بعد تهدید می‌کند، کدام است؟
- (۱) تنش خشکی
(۲) تنش سرما
(۳) عدم توانایی رقابت با گیاهان بومی
(۴) هیچ خطری ندارد و موفق می‌شود.
- ۱۶۵- براساس تقسیم‌بندی علفخواران سیم‌دار توسط هولچک، گوسفند جزء کدام دسته قرار می‌گیرد؟
- (۱) چرنده
(۲) سرشاخه‌خوار
(۳) تغذیه‌کننده حدواتط
(۴) چرنده و سرشاخه‌خوار
- ۱۶۶- چراً کدام دام، مؤثرترین روش کنترل بیولوژیک گیاهان مهاجم است؟
- (۱) بز
(۲) گوسفند
(۳) بز و گاو
(۴) گاو و گوسفند
- ۱۶۷- در یک کیسه ۱۰۰ کیلوگرمی بذر یک گیاه مرتعی با درصد خلوص ۹۰ و جوانه‌زنی ۷۵، مقدار بذر خالص چه مقدار است؟
- (۱) ۳۳/۷۵
(۲) ۶۷/۵
(۳) ۷۵
(۴) ۱۰۰
- ۱۶۸- در اجرای پروژه لیفارمینگ، کدام مورد در ارتباط با کاشت شبدر مناسب است؟
- (۱) شبدرها برای اجرای برنامه‌های تناوبی کوتاه‌مدت مناسب نیستند.
(۲) شبدرها برای اجرای برنامه‌های تناوبی کوتاه‌مدت مناسب هستند.
(۳) شبدرها برای اجرای برنامه‌های تناوبی کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب هستند.
(۴) شبدرها برای اجرای برنامه‌های تناوبی کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب نیستند.
- ۱۶۹- هدف از اجرای این عملیات در مرتع، شکستن یا پراکنده نمودن سخت لایه به وجود آمده در لایه‌های زیرین خاک‌های مرتعی است؟
- (۱) ریپر
(۲) پخش آب
(۳) پی‌تینگ
(۴) کنتور فارو
- ۱۷۰- مهم‌ترین تأثیر پخش سیلاپ در مرتع کدام است؟
- (۱) افزایش نفوذپذیری خاک
(۲) ثابت نگه داشتن ترکیب پوشش گیاهی
(۳) تغییر بافت خاک بر اثر رسوپ‌گذاری
(۴) افزایش ارزش غذایی گیاهان
- ۱۷۱- مرسوم‌ترین ماده برای ضدغونه بذر گیاهان مرتعی قبل از انجام آزمایش‌های جوانه‌زنی کدام است؟
- (۱) جیرلیک اسید
(۲) هورمون اکسین
(۳) هیپوکلرید سدیم
(۴) تترازولیوم کلراید
- ۱۷۲- ازین بودن یا زیر فشار قرار دادن گیاهان چوبی نامرغوب، افزایش خوش‌خوارکی و حذف قسمت‌های مسن و مرده گیاهی، آزادی‌سازی مواد مغذی گیاه و لاشبرگ در خاک، با کدام روش اصلاحی قابل دستیابی است؟
- (۱) کودپاشی
(۲) بذر کاری
(۳) آتش‌سوزی
(۴) ذخیره نزولات
- ۱۷۳- تراشیدن سطح زمین برای قطع کردن گیاهان چوبی و جمع آوری بقایای گیاهان چه نامیده می‌شود؟
- (۱) Blading
(۲) Cushing
(۳) Chaining
(۴) Shredding

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۷۴- اضافه کردن سولفور به جیره غذایی دام‌ها از مسومیت دام با کدام مورد جلوگیری می‌کند؟

 - (۱) اگزالت
 - (۲) گلوكوزیدهای قلبی
 - (۳) گلوكوزیدهای سیانوژنیک
 - (۴) آلkalوئیدهای پپرولیزیدین

۱۷۵- اثر کودپاشی بر خوش‌خوارکی و قابلیت هضم علوفه، چگونه است؟

 - (۱) هردو را کاهش می‌دهد.
 - (۲) هردو را افزایش می‌دهد.
 - (۳) قابلیت هضم را افزایش و خوش‌خوارکی را کاهش می‌دهد.
 - (۴) خوش‌خوارکی را افزایش می‌دهد اما بر قابلیت هضم تأثیر چندانی ندارد.

۱۷۶- کدام نوع کود فسفره، در مراتع با خاک‌های به شدت اسیدی کاربرد دارد؟

 - (۱) سنگ فسفات
 - (۲) فسفات آمونیوم
 - (۳) سوپرفسفات ساده
 - (۴) سوبر فسفات تربیل

۱۷۷- کمبود کدام عنصر در خاک مراتع، سوخت و ساز ازت و ساختن بروتئین‌ها، فعل کردن آنزیم‌ها، سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و خنثی‌سازی اسیدهای آلی را با مشکل مواجه می‌کند؟

 - (۱) ازت
 - (۲) کلسیم
 - (۳) فسفر
 - (۴) پتاسیم

۱۷۸- بیشترین بهره‌وری از کودهای نیتروژن‌دار در مراتع چه زمانی حاصل می‌شود؟

 - (۱) هنگام چرای دام در مرتع کودپاشی شود.
 - (۲) حداقل دو نوبت در زمستان و دو نوبت در بهار داده شود.
 - (۳) در زمان کاشت، همراه با بذر کاری به خاک اضافه شود و در معرض ریشه گیاه باشد.
 - (۴) حداقل دو نوبت در بهار یا یک نوبت در اوخر زمستان و یک تا دو نوبت در بهار در طول دوره رشد گیاه به صورت سرک در مرتع داده شود.

۱۷۹- در مناطق با بارندگی کم که خاک سطحی کم عمق باشد، کدام روش برای جمع‌آوری و استفاده از آب‌های سطحی مناسب است؟

 - (۱) بانکت
 - (۲) آبگیر و گودال
 - (۳) هلالی‌های آبگیر
 - (۴) ایجاد سطوح عایق

۱۸۰- به ترتیب در خاک‌هایی با pH اسیدی و pH قلیایی از کدام کودها استفاده می‌شود؟

 - (۱) ازته - ازته
 - (۲) فسفاته - فسفاته
 - (۳) فسفاته - فسفاته
 - (۴) فسفاته - ازته

شناختی، گیاهان مرتعی

- ۱۸۱- کدام گونه از *Atraphaxis* دارای گلپوش پنج بر، میوه سه‌گوش که طول برگ‌ها بیش از پنج برابر عرض برگ و تکارگبرگ است؟

A. suaedifolia (۴) *A. tournefortii* (۵) *A. spinosa* (۲) *A. aucheri* (۱)

- ۱۸۲- گیاه *Ebenus* متعلق به کدام خانواده است؟

Plumbaginaceae (۴) *Caryophyllaceae* (۳) *Lamiaceae* (۲) *Fabaceae* (۱)

- ۱۸۳- گونه‌ای از گندمیان که بر روی واریزه‌ها و شیب‌ها به خوبی مستقر می‌شود و بر روی محور گل آذین سنبلک‌ها بیش از سه‌تاکی در یک نقطه قرار می‌گیرند؟

Hordeum bulbosum (۲) *Agropyron tauri* (۱)
Psathyrostachys fragilis (۴) *Festuca aurandinacea* (۳)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۴

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۱۸۴ - در کدام یک از گیاهان خانواده اسفناج، میوه به صورت کپسول است؟
- Beta vulgaris* (۲) *Salsola crassa* (۱)
Chenopodium album (۴) *Haloxylon persicum* (۳)
- ۱۸۵ - کدام گونه در خنچه‌ای از جنس *Salsola* بر روی اراضی صخره‌ای روش مناسبی دارد؟
- S. Arbuscula* (۴) *S. crassa* (۳) *S. soda* (۲) *S. kali* (۱)
- ۱۸۶ - کدام مورد بیانگر ویژگی گیاه *Heteranthelium* است؟
- (۱) چندساله از خانواده گندمیان، زیرخانواده *Triticeae* و قبیله *Pooideae*
(۲) چندساله از خانواده گندمیان، زیرخانواده *Paniceae* و قبیله *Panicoideae*
(۳) یکساله از خانواده گندمیان، زیرخانواده *Triticeae* و قبیله *Pooideae*
(۴) یکساله از خانواده گندمیان، زیرخانواده *Panicoideae* و قبیله *Paniceae*
- ۱۸۷ - میوه در گیاه *Diplothaenia* چگونه است؟
- (۱) آکن، فندقه
(۲) تری آکن، سamar
(۳) دی آکن، شیز و کارب
- ۱۸۸ - نام علمی خانواده اسفناج به کدام نام تغییر یافته است؟
- Amarantaceae* (۲) *Polygonaceae* (۱)
Chenopodiaceae (۴) *Caryophyllaceae* (۳)
- ۱۸۹ - میوه چهار فندقه، در گیاهان کدام خانواده دیده می‌شود؟
- Cyperaceae* (۲) *Asteraceae* (۱)
Plumbaginaceae (۴) *Verbenaceae* (۳)
- ۱۹۰ - پنج استامینود یا ناپرچمی، در کدام گیاه دیده می‌شود؟
- Haloxylon* (۴) *Anabasis* (۳) *Salsola* (۲) *Aellenia* (۱)
- ۱۹۱ - نهنچ، در کدام گیاه کالسی فلور می‌باشد؟
- (۱) ترشک
(۲) کمای بیلاقی
(۳) شبدر برسيم
(۴) توت رویاهی
- ۱۹۲ - کدام مورد معرف گیاهی یکساله و علفی با برگ‌های کوتاه و ضخیم که گلپوش میانی دارای بال صورتی رنگ و بزرگ‌تر از بال‌های کناری و گنج دوست است؟
- Seidlitzia florida* (۲) *Salsola rigida* (۱)
Salsola tomentosa (۴) *Seidlitzia rosmarinus* (۳)
- ۱۹۳ - در گونه *Zygophyllum fabago* برگ و میوه از کدام نوع است؟
- (۱) برگ ساده - میوه کپسول کروی
(۲) برگ ساده - میوه کپسول سه‌باله
(۳) مرکب دوبرگچه‌ای - میوه کپسول خورجین مانند
(۴) مرکب بیش از دو برگچه - میوه کپسول بدون بال
- ۱۹۴ - در کدام گونه جنس اسکنبل (Callygonum)، تارهای میوه منشعب و در قاعده پیوسته و طول و عرض میوه یکسان است؟
- C. Polygonoides* (۴) *C. Persicum* (۳) *C. Bungei* (۲) *C. Comosum* (۱)
- ۱۹۵ - کدام مورد، بیانگر مهم‌ترین تفاوت بین دو جنس «شبدر» و «شبدرک» است؟
- (۱) نوع برگ، نوع پرچم، شکل میوه
(۲) نوع میوه، زیرخانواده، طایفه
(۳) رنگ گل آذین، نوع گل آذین، تعداد پرچم‌ها
(۴) نوع گل آذین، نوع میوه، طایفه

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- | | | |
|---|--|---|
| ۱۹۶- کدام مورد، گیاهی علفی چندساله با پوست سبز متمایل به سفید است که ساقه‌ها دارای شیارهای طولی مشخص بوده و برگ‌ها گوشته و غده مانند با آرایش متقابل و میوه فندقه بالدار است؟ | <i>Anabasis setifera</i> (۲) | <i>Anabasis aphylla</i> (۱) |
| <i>Hammada salicornica</i> (۴) | <i>Haloxylon aphyllum</i> (۳) | |
| | در کدام خانواده، به پوشش گل <i>Tepal</i> گفته می‌شود؟ | - ۱۹۷- |
| <i>Brasicaceae</i> (۴) | <i>Solanaceae</i> (۳) | <i>Lamiaceae</i> (۲) |
| | | <i>Liliaceae</i> (۱) |
| | | لما، در کدام گونه گیاهی قادر سیخک مشخص است؟ |
| | <i>Stipa capensis</i> (۲) | <i>Stipa barbata</i> (۱) |
| <i>Aeluropus littoralis</i> (۴) | <i>Hordeum murinum</i> (۳) | |
| | در کدام گیاهان، برگ تحلیل رفته و تبدیل به یک فلس غشایی شده است؟ | - ۱۹۹- |
| (۴) سالسولا، سودا | (۳) اسکتبیل، تاغ | (۲) درمنه، بومادران |
| | | کدام گیاه، از ردۀ تک‌لپه‌ای‌ها است؟ |
| (۴) سیاه تخم‌گنبد | (۳) گندم سیاه | (۲) اویارسلام |
| | | (۱) ریواس |
| | کدام مورد معرف میوه در جنس <i>Pteropyrum</i> است؟ | - ۲۰۱- |
| (۴) فندقه چهارباله | (۳) فندقه سه‌باله | (۲) فندقه معمولی |
| | | در کدام گونه از جنس <i>Stipa</i> ، نوک لما دو شاخه است؟ |
| <i>S. kurdistanica</i> (۴) | <i>S. orientalis</i> (۳) | <i>S. capensis</i> (۲) |
| | | <i>S. barbata</i> (۱) |
| | در کدام جنس، پرچم‌ها پلی آدلف و گل آذین سیاتیوم است؟ | - ۲۰۳- |
| <i>Tragopogon</i> (۴) | <i>Euphorbia</i> (۳) | <i>Lactuca</i> (۲) |
| | | <i>Vitex</i> (۱) |
| | کدام مورد درباره درمنه کوهی درست است؟ | - ۲۰۴- |
| | (۱) ردۀ دولپه‌ای‌های پیوسته گلبرگ، گل آذین کپه‌ای، میوه فندقه، گل شعاعی | |
| | (۲) ردۀ دولپه‌ای‌های پیوسته گلبرگ، گل آذین کپه‌ای، میوه کپسول، گل زبانه‌ای | |
| | (۳) ردۀ دولپه‌ای‌های جدا گلبرگ، گل آذین چتر، میوه چند فندقه، گل لوله‌ای | |
| | (۴) ردۀ دولپه‌ای‌های بدون گلبرگ، گل آذین خوشة مرکب، میوه سامار، گل کاذب | |
| | کدام مورد معرف گیاهی چندساله علفی است که گل آذین آن چتری و مونوکارپیک می‌باشد؟ | - ۲۰۵- |
| (۴) شمعدانی وحشی | (۳) بومادران | (۲) آنفوزه |
| | | (۱) والک |

ارزیابی و اندازه‌گیری صرتع:

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۶

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

- ۲۰۹- اندازه‌گیری مرتع در طول چند سال متواالی چه نامیده می‌شود؟
- (۱) پایش (۲) ممیزی (۳) ارزیابی (۴) اندازه‌گیری
- ۲۱۰- اگر وزن یک دام مرتعی ۴۰ کیلوگرم باشد، انرژی متابولیسمی پایه آن چند مگاژول است؟
- (۱) ۴ (۲) ۵/۸ (۳) ۶/۲ (۴) ۳۵
- ۲۱۱- کدام دسته از عوامل، جز علائم گرایش پس‌رونده در گیاهان است؟
- (۱) شاخه‌های بوته‌ها کوتاه، وجود جاهای دارای پوشش در سطح خاک، زادآوری گیاهان
(۲) ضعیف بودن گیاهان مرتعی در اثر چرای مفرط، زادآوری کلیه گونه‌های گیاهی، وجود نهال‌های جوان
(۳) عدم زادآوری گیاهان مرتعی مرغوب، چرای دام از گیاهان غیرخوش خوارک، عدم وجود شاخه‌های جوان در خارج از تاج‌پوشیده گیاه
(۴) وجود بوته‌ها و گیاهان مرغوب در مرتع، رشد شاخه‌های درختچه‌ها در ارتفاعی بالاتر از دسترسی دام، انباسته شدن خاک نرم در زیر بوته‌ها
- ۲۱۲- استفاده از پلات‌های زوجی برای تعیین کدام مورد است؟
- (۱) ظرفیت (۲) وضعیت (۳) شدت چرا (۴) نوع بهره‌برداری
- ۲۱۳- مدل آستانه، حال و انتقال و سلامت مرتع از کدام الگو هستند؟
- (۱) توالی (۲) تعادل (۳) وضعیت (۴) غیرتعادلی
- ۲۱۴- در ارزیابی مرتع مطالعه ذهنی، چگونه است؟
- (۱) منظور سیاهه برداری از مرتع است.
(۲) بر مبنای حافظه فرد و به صورت مشاهده است.
(۳) بر مبنای حافظه فرد و به صورت اندازه‌گیری است.
(۴) قابل مقایسه با مطالعه دیگر و به صورت ارزیابی است.
- ۲۱۵- در حالتی که در دو تیپ گیاهی میزان پوشش، نوع دام استفاده کننده از مرتع و مقدار تولید مشابه، اما علوفه قابل دسترس دام در هکتار متفاوت است، کدام عامل متفاوت می‌باشد؟
- (۱) ترکیب گیاهی (۲) فرم رویشی (۳) مساحت تیپ گیاهی (۴) نحوه پرآکنش پوشش گیاهی و نیاز روزانه دام
- ۲۱۶- یک تیپ گیاهی در منطقه نیمه استپی با روش چهار فاکتوری تعیین وضعیت شده و امتیازات کسب شده به شرح زیر بوده است؟
- (عامل پوشش = ۷، امتیاز وضعیت فرسایش خاک = ۱۶، عامل ترکیب گیاهی و طبقات سنی = ۸، عامل بنیه و شادابی گیاهان = ۷)
- با شرایط فوق الذکر درجه وضعیت مرتع چگونه است؟
- (۱) فقیر (۲) متوسط (۳) خوب (۴) عالی

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) ۱۰۶F

صفحه ۲۷

- ۲۱۷- اگر در یک تیپ گیاهی به مساحت ۴۰۰ هکتار که تولید گیاهان کلاس I = ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار، تولید گیاهان کلاس II = ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار و تولید گیاهان کلاس III قابل چرای دام ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار و حد بهره‌برداری مجاز براساس درجه وضعیت و منطقه آب و هوایی ۳ درصد در نظر گرفته شده باشد. اگر دام چرا کننده معادل یک واحد دامی و در روز به ۲ کیلوگرم ماده خشک علوفه نیاز داشته باشد ظرفیت این مرتع برای یک فصل چرای صد روزه چند واحد دامی است؟

(۱) ۲۲۰

(۲) ۲۴۰

(۳) ۳۰۰

(۴) ۴۲۰

- ۲۱۸- جهت تعیین گرایش مرتع کدام روش توصیه نمی‌شود؟

(۱) استفاده از کوادرات ثابت

(۲) استفاده از ترانسکت ثابت

(۳) امتیازدهی به خصوصیات مرتع

(۴) تعیین وضعیت مرتع به صورت کیفی بر طبق تئوری‌های غیرتعادلی

- ۲۱۹- وقتی وضعیت مرتع با روش چهار فاکتوری ارزیابی شده باشد، کدام امتیاز سیستم چرای تناوبی مناسب است؟

(۱) کمتر از ۲۰

(۲) ۲۰-۳۰

(۳) ۳۱-۳۷

(۴) بیش از ۳۸

- ۲۲۰- ارزیابی بنیه و شادابی (vigor) گیاهان به کدام منظور انجام می‌گیرد؟

(۱) اندازه‌گیری پوشش

(۲) تعیین وضعیت مرتع

(۴) برآورد تولید گیاهان

(۳) تعیین کیفیت علوفه

- ۲۲۱- برای ارزیابی مرتع با سنجش از دور بازتاب گیاه مسن، خشکیده و سالم چگونه است؟

(۱) بازتاب گیاهان مسن و سالم در هر دو ناحیه طیف نوری کم است.

(۲) بازتاب گیاهان مسن، خشکیده و سالم در ناحیه مرئی طیف بالا است.

(۳) بازتاب گیاه مسن و خشکیده در ناحیه مرتعی و بازتاب گیاه سالم در مادون قرمز کمتر است.

(۴) بازتاب گیاه مسن و خشکیده در ناحیه مرتعی و بازتاب گیاه سالم در مادون قرمز بیشتر است.

- ۲۲۲- برای ارزیابی منابع آب با اطلاع سنجش از دور در مرتع، کدام مورد درست است؟

(۱) منابع آب در بیشتر تصاویر تیره و جذب نور در محدوده مادون قرمز بالا است.

(۲) منابع آب در بیشتر تصاویر تیره و جذب نور در محدوده مادون قرمز پایین است.

(۳) منابع آب در بیشتر تصاویر روشن و جذب نور در محدوده طیف مرئی پایین است.

(۴) منابع آب در بیشتر تصاویر روشن و جذب نور در محدوده طیف مرئی بالا است.

- ۲۲۳- کدام مورد در نمونه‌برداری تصادفی - طبقه‌بندی شده، درست است؟

(۱) تأثیر بر مقدار واریانس ندارد.

(۲) واریانس بین پلاتها در داخل لایه‌ها کاهش یافته و بین لایه‌ها افزایش می‌یابد.

(۳) واریانس بین پلاتها در داخل لایه‌ها افزایش یافته و بین لایه‌ها کاهش می‌یابد.

(۴) باعث کاهش مساحت جامعه مورد مطالعه شده و اندازه نمونه کاهش می‌یابد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۸

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (کد ۱۳۰۱) 106F

- ۲۲۴- در مرتعی که یکنواختی پراکنش گیاهان ارزیابی شده است. آمار پوشش گیاهی در ۱۵ پلات انداخته شده، به شرح زیر بوده است، پراکنش پوشش گیاهی در این مرتع چگونه است؟
- (۲۰، ۳۰، ۴۰، ۳۵، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۵۵)
- ۱) غیریکنواخت ۲) نسبتاً یکنواخت ۳) یکنواخت ۴) کاملاً یکنواخت
- ۲۲۵- کدام مورد بیانگر مفهوم **Photo point** در پایش مرتع است؟
- ۱) تهیه عکس از سیمای مرتع ۲) عکسبرداری از پلات‌ها در طول ترانسکت ۳) نقطه ثابت عکسبرداری در مرتع ۴) عکسبرداری از نقاط مختلف مرتع
- ۲۲۶- در مرتعی واقع در منطقه نیمه استپی تولید گیاهان کلاس I، ۱۰۰ کیلوگرم، تولید گیاهان کلاس II، ۱۵۰ کیلوگرم و تولید گیاهان کلاس III قابل چرای دام، ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. علوفه قابل چرای دام در این مرتع در حالتی که وضعیت مرتع خوب باشد، چند کیلوگرم در هکتار است؟
- (۱) ۱۱۵ (۲) ۱۲۵ (۳) ۲۲۵ (۴) ۴۵۰
- ۲۲۷- در کدام شرایط، عملکرد روش نمونه‌برداری تصادفی بهتر است؟
- ۱) جوامع همگن از نظر پوشش گیاهی ۲) جوامع غیرهمگن از نظر پوشش گیاهی ۳) جوامع با لایه‌های نامشخص پوشش گیاهی ۴) جوامع با لایه‌های مشخص پوشش گیاهی
- ۲۲۸- کدام فاکتور در اندازه پلات نقشی ندارد؟
- ۱) تراکم گیاهان ۲) نحوه پراکنش گیاهان ۳) نوع گونه گیاهی ۴) فرم رویشی
- ۲۲۹- در حالتی که اندازه‌گیری پوشش با روش‌های نقطه‌ای صورت می‌گیرد:
- (۱) در کاربرد نقاط به صورت گروهی برای دقت مشابه تعداد نمونه بیشتری لازم است.
(۲) در صورت کاربرد نقاط به صورت گروهی، نقاط باید در داخل پلات گذارده شود.
(۳) تعداد نمونه در صورت استفاده انفرادی نقاط در مقایسه با کاربرد گروهی نقاط باید بیشتر باشد.
(۴) در حالت کاربرد انفرادی نقاط ممکن است درصد پوشش از ۱۰۰٪ بیشتر شود.
- ۲۳۰- نشان دادن موقعیت محل اطراف دام، موقعیت آب‌شور و جاده‌ها روی نقشه مدیریت حاصل کار کدام مورد است؟
- ۱) پایش ۲) ارزیابی ۳) ممیزی ۴) اندازه‌گیری