# مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

کد کنترل

26

A



# **数函数函数函数函数函数函数函数函数函数函数**

صبح جمعه ۱۳۹۸/۳/۲۴



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.» امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوستهٔ داخل ـ سال ۱۳۹۸

بیوشیمی بالینی ـ کد ( ۱۵۰۹)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۲۰

#### عنوان مواد امتحاني، تعداد و شمارهٔ سؤالات

رديف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شمارة	تا شمارة
١	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳٠	,	٣٠
۲	بيوشيمى	۴٠	rı	٧٠
٣	زیستشناسی	۲٠	٧١	١٠٠
۴	شیمی آلی و عمومی	۲٠	1-1	17.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمرهٔ منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخففین برابر مقررات رفتار می شود.

**多数数数数数数数数 1447 数数数数数数数数数** 

صفحه ۲	926A	یوشیمی بالینی ـ کد ( ۱۵۰۹)
شما در جلسهٔ آزمون است.	ا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزلهٔ عدم حضور ن	🕸 داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امض
	با شمارهٔ داوطلبی با آگاهی ک در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و ت و پائین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.	5:500 WO BARD BODE OF 15:50 TO 15:50
: <b>L</b>	امض	

## PART A: Vocabulary

<u>Directions</u>: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

1-		***		with animals that are
		, fiber, milk, eggs, or o	3) included	1) interfered
2-			dinand Magellan, wh n is not, in fact, so pac	o believed it to be free of
	1) violent	Carlo	3) temporary	
3-				ovement that
			human animals exist s	
	1) asserts		3) distinguishes	
4-	If people can r		그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	that they will be
		hunt them from the se		
			3) reason	4) attention
5-	The programm computer.	ner an	analogy between th	e human brain and the
	10% TO 5.7 (1) (\$\frac{1}{2} \) (4" (1) (1) (1) (1) (1)	2) bore	3) took	4) put
6-	The	of the editor's com	ments made us think	that he hadn't really read
	the manuscript			
	1) intensity	2) ignorance	<ol><li>tolerance</li></ol>	4) superficiality
7-	The two boys t	ried to sound	at the police stati	on, but they weren't really
	sorry that they	had herded the sheep	into Mr. Ingersoll's h	ouse.
	1) resistant	2) impatient	<ol><li>regretful</li></ol>	4) indifferent
8-	Though he spo	ke for over an hour, t	he lecturer was comp	letely and the
	students had no	o idea what he was tall	king about.	
	1) solitary	2) inarticulate	3) curious	4) effortless
9-	For years no o	one could make this p	particular therapy wo	rk in animals larger than
				ts in dogs.
	1) efficacy	<ol><li>restriction</li></ol>	<ol><li>sympathy</li></ol>	4) vulnerability

بيوشيمي باليني \_ كد ( ١٥٠٩ ) 926A

10- The African elephant has become the object of one of the biggest, broadest international efforts yet ----- to turn a threatened species off the road to extinction.

1) intruded 2) explored 3) mounted 4) compensated

#### PART B: Cloze Test

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) ------ a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and (12) ------ incidence of conditions that become increasingly common in old age. (13) ------, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, (14) ------ that the maximum life span (the oldest attainable age), (15) ------ merely the average life span, increased.

11-1) were fed 2) which they fed fed 4) feeding 2) they reduced 12- 1) had a reduced 3) were reduced 4) that it reduced 13-1) Although 2) While 3) What is more 4) So that 14-1) meant 2) which means 3) means 4) it means 15-1) no 2) nor 3) neither 4) not

#### PART C: Reading Comprehension

<u>Directions</u>: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### PASSAGE 1:

Although the body can use some variations of carbon compounds such as fatty acids and ketones as energy, carbohydrates play an important role in this way. First of all, maintaining a regular intake of carbohydrates will prevent protein from being used as an energy source. Gluconeogenesis will slow down and amino acids will be freed for the biosyntheses of enzymes, antibodies, receptors and other important proteins. Furthermore, an adequate amount of carbohydrates will prevent the degradation of skeletal muscle and other tissues such as the heart, liver, and kidneys. Most importantly, ketosis will be prevented. Although the brain will adapt to using ketones as a fuel, it preferentially uses carbohydrates and requires a minimum level of glucose circulating in the blood in order to function properly. Before the adaptation process occurs, lower blood glucose levels may cause headaches in some individuals.

Although the processes of protein degradation and ketosis can create problems of their own during prolonged fasting, they are adaptive mechanisms during glucose shortages. In summary, the first priority of metabolism during a prolonged fast is to 926A صفحه ۴

بيوشيمي باليني \_ كد ( ١٥٠٩)

provide enough glucose for the brain and other organs that are dependent upon it for energy in order to spare proteins for other cellular functions. The next priority of the body is to shift the use of fuel from glucose to fatty acids and ketone bodies. From then on, ketones become more and more important as a source of fuel while fatty acids and glucose become less important.

- 16- The term "Gluconeogenesis" in the first paragraph refers to ------
  - 1) consumption of carbohydrates
- 2) production of new glucose
- 3) intake of new carbohydrates
- 4) break down of glucose
- 17- Which statement related to carbohydrates as a source of energy is not true?
  - 1) Amino acids would be used for production of other proteins.
  - Proteins would be analyzed to free amino acids.
  - 3) They cause inhibition of utilizing proteins for energy production.
  - 4) New synthesis of glucose decreases.
- 18- Amino acids are responsible for the biosyntheses of all the following items EXCEPT
  - 1) fatty acids
- 2) antibodies
- 3) enzymes
- 4) receptors
- 19- Consumption of carbohydrates will benefit all of the following organ systems EXCEPT
  - -----.
  - 1) urinary system

2) C.N.S

3) muscular system

- 4) respiratory system
- 20- The priorities of the body during a prolonged starvation are ------
  - 1) providing ketone bodies and then fatty acids for the digestive system
  - 2) providing glucose and then ketone bodies for the digestive system
  - 3) providing fatty acids for the brain and then shifting to ketone bodies
  - 4) providing glucose for the brain and then shifting to ketone bodies and fatty acids **PASSAGE 2:**

Fish oil is a commonly used fatty acid supplement because it is a source of omega-3 fatty acids. Fatty acids are strings of carbon atoms, having a range of lengths. If links are all single (C-C), then the fatty acid is called saturated; with one double bond (C=C), it is called monounsaturated; if there are two or more double bonds (C=C=C), it is called polyunsaturated. Only two fatty acids, both polyunsaturated, are considered essential to be obtained from the diet, as the others are synthesized in the body. The essential fatty acids are alpha-linolenic acid (ALA), an omega-3 fatty acid, and linoleic acid (LA), an omega-6 fatty acid. Plant oils, particularly seed and nut oils, contain alpha-linolenic acid. Dietary supplement sources include fish oil, krill oil and marine algae extracts. The class of nutrient compounds includes vitamins, minerals, fiber, fatty acids and amino acids.

Minerals are the exogenous chemical elements indispensable for life. Four minerals: carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, are essential for life but are so ubiquitous in food and drink that these are not considered nutrients and there are no recommended intakes for these as minerals. The need for nitrogen is addressed by requirements set for protein, which is composed of nitrogen-containing amino acids. Sulfur is essential, but for humans, not identified as having a recommended intake per se. Instead, recommended intakes are identified for the sulfur-containing amino acids

بيوشيمي باليني ـ كد ( ١٥٠٩) 926A صفحه ۵

methionine and cysteine. There are dietary supplements which provide sulfur, such as taurine and methyl sulfonylmethane.

21- All of the following fatty acids should be obtained from the diet, EXCEPT ------

1) linoleic acid

2) monounsaturated

3) polyunsaturated

4) alpha-linolenic acid

22- By consumption of plant oils, which fatty acid could be provided?

1) Alpha-linolenic acid

2) Monosaturated acids

3) Linoleic acid

4) Omega-6 fatty acid

23- According to the text, which of the following compounds are basically essential to life?

1) Collagen

Polyphenols

3) Minerals

4) Plant pigments

24- Which statement about minerals is consistent with the text?

1) Minerals are rarely found in food and drink.

They are chemical elements produced in the body.

3) Minerals should be received from outside the body.

4) They are regarded as nutrients to be recommended for intake.

25- Human requirements for sulfur could not be provided by -----

1) pure sulfur

2) methionine

3) taurine

4) cysteine

### PASSAGE 3:

Animal toxins from chemistry aspect, extends from enzymes and neurotoxic and cardiotoxic peptides and proteins to many small molecules such as biogenic amines, alkaloids, glycosides and terpenes. Drug toxicity is affected by all of factors that affect the toxicity of other xenobiotics, including individual (genetic) variation, diet, age, and the presence of other exogenous chemicals. Even when the risk of toxic side effects from a particular drug has been evaluated, it must be weighed against the expected benefits. The use of a very dangerous drug with only a narrow tolerance between the therapeutic and toxic doses may still be justified if it is the sole treatment for an otherwise lethal malady. Although the study of the therapeutic properties of chemicals falls within the province of pharmacology, essentially all therapeutic drugs can be toxic, at some dose.

The danger of producing deleterious effects to the individual depends on several factors, including the nature of the toxic response, the dose necessary to produce the toxic response, and the relationship between the therapeutic dose and the toxic dose. Some species from practically all phyla of animals produce toxins for either offensive or defensive purposes. Some are passively venomous, often following inadvertent ingestion, whereas others are actively venomous, injecting poisons through adapted stings or mouth parts. It may be more appropriate to refer to the latter group only as venomous and to refer to the former simply as poisonous.

بيوشيمي باليني ــ كد ( ١٥٠٩ ) 926A صفحه ۶

26-	According	to	the	text,	the	principal	target	organs	for	proteins	of	animal	toxins	are
		-												

- 1) arteries and veins
- 2) bronchial tract
- 3) peripheral and central nervous system
- 4) heart and central nervous system

### 27- Which statement related to usage of a drug with toxic side effects is true?

- 1) It should be applied with caution.
- 2) It is not allowed and should be omitted.
- 3) It could be used only for fatal disease.
- 4) Its toxic components should be eliminated first.

### 28- All of the following factors determine the harmful effects of toxins EXCEPT ------

- 1) quality of the toxic response
- 2) the nature of manufacturing components
- applying toxic dosages
- 4) therapeutic and toxic dose correlation
- 29- Inactive poisoning by venoms may occur through which system?
  - 1) Alimentary canal

2) Respiratory tract

3) Urinary system

- 4) Vascular system
- 30- According to paragraph 2, the word poisonous can be appropriately used to refer to
  - 1) passively venomous species
  - 2) actively venomous species
  - 3) species injecting poisons through stings
  - 4) species not affected by venom

#### ىيوشىمى:

Acyl C	oA Synthetase (7	رل سنتز کلسترول کدام است؟	مهم ترین آنزیم در کنتر ۱) Thiolase	-٣1			
HMG-	CoA Synthase (f	HMG-0	CoA Reductase (*				
		نق مىشود؟	کافئین از کدام باز مشتق میشود؟				
۴) گزانتین	۳) آدنین	۲) گوانین	۱) اوراسیل				
		آپوپروتئین اصلی موجود در شیلومیکرونها کدام است؟					
APOE (*	APOBFA (T	APOB	APOC, (1				
		چیست؟	عملكرد اصلى لكتينها	-44			
چرب	۲) اتصال به اسیدهای ۰	مینه خاص	۱) اتصال به اسیدهای آ				
تها	۴) اتصال به کربوهیدار،		۳) اتصال به پروتئینها				
	ل مىشود؟	ستم ایمنی بر علیه کدام مواد فعال	در بیماری سلیاک، سی	-30			
	۲) گلوتنها	قابل هضم	۱) پلیساکاریدهای غیر				
	۴) موکوپلیساکاریدها		۳) لیپوپلیساکاریدها				

926A

صفحه ۷

-48	مقادير طبيعى نسبت سد	م به پتاسیم باید	باشد.	
	۱) کمتر از ۲۳ به ۱		۲) بالاتر از ۲۰ به ۱	
	۳) بالاتر از ۲۵ به ۱		۴) کمتر از ۲۰ به ۱	
-44	عارضه مغزی رفسام، در اه	ر تجمع کدام اسید چرب رخ	مىدهد؟	
	۱) اسید فیتانیک	۲) پروپیونیک اسید	۳) پالمتیک اسید	۴) لینولنیک اسید
-34	بیوسنتز اسیدهای چرب غ	بیراشباع از انواع اشباع، در ۲	ندام اندامک سلولی صورت	میگیرد؟
	۱) هسته	۲) دستگاه گلژی	۳) میتوکندری	۴) شبکه اندوپلاسمی
-49	آنزيم رونوشت ساز معكوه	ں (RT) یک:		
	۱) DNA پلیمراز وابسته	به RNA است.	۲) DNA پلیمراز وابسته	به DNA است.
	۳) RNA پلیمراز وابسته	به DNA است.	۴) RNA پلیمراز وابسته	به RNA است.
-4.	در یک واکنش آنزیمی که	غلظت سوبسترا خيلي كمتر	از Km باشد، سرعت واكنش	ن چگونه است؟
	۱) به v max میرسد.		۲) متناسب با غلظت سوب	سترا است.
	۳) مستقل از درجه حرارت	، است.	۴) از نظر سینتیکی از در-	جه صفر است.
-41	کدام آنزیم از گروه ترانسهٔ	راز <u>نیست</u> ؟		
	CPk ()	ACP (Y	ALT (*	AST (f
-42	در ماهیان استخوانی، متابوا	بسم بازهای آلی نیتروژندار، پی	بشساز اصلی و بدون واسطه ا	وره کدام ترکیب است؟
	۱) اوریک اسید	۲) گزانتین	۳) آلانتوئیک اسید	۴) آلانتوئين
-44	در کاتابولیسم اسیدهای آ	مینه، اسکلت کربنی اسید آم	ینه میتونین، از کدام طریق	وارد سیکل کربس میشود؟
	۱) اگزالواستات		۲) آلفا ۔ کتوگلوتارات	
	٣) فومارات		۴) سوكسينيل ـ كوأنزيم	A
-44	ماده آگارز که برای الکترو	فورز DNA به کار میرود، عم	دتاً مشتق از كدام قند است	9.
	۱) گلوکز آمین	۲) گلوکز	٣) لاكتوز	۴) گالاکتوز
-40	در الكتروفورز، پروتئينھ	در pH بالاتر از نقطه PI خ	ود بهصورت یک ر	ِفتار نموده و به سمت
	حرکت میکند.			
	The state of the s	۲) کاتیون ـ کاتد		ALCOHOLOGICA CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE
-48	در تشکیل ترکیب نیتریک	ے اکساید (NO) توسط آنزی	<b>م نیتریک اکساید سنتاز در</b>	هپاتوسیتها، کدام ترکیب زیر
	شرکت <u>ندارد</u> ؟			
	ATP (1	NADH (*	O <sub>7</sub> (7	۴) آرژنین
-44				ویتامین نقش ضروری دارد؟
	۱) پانتوتنیک اسید	۲) ویتامین C	۳) ويتامين D	$\mathbf{B}_{1}$ ويتامين $^{oldsymbol{\mathfrak{f}}}$
-41	چه غلظتی از سوبسترا می	رتواند یک آنزیم با ثابت کاتا	لیتیک معادل S <sup>-۱</sup> ۵ و ثاب	ت میکائیلیس برابر با ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
	مولار را قادر سازد که با نه	سف سرعت ماكزيمم عمل كن	93	
	<ol> <li>۲۵ (۱ میلیمولار</li> </ol>	۲) ۲/۰ میلیمولار	۳) ۲ میلیمولار	۴) ۱ میلیمولار
-49	در سلولهای یوکاریوتیک	، برای همانند سازی DNA ک	دام آنزیم در میتوکندری یا	لت مىشود؟
	۱) گاما DNA پلیمراز	۲) دلتا DNA پلیمراز	۳) بتا DNA پلیمراز	۴) آلفا DNA پليمراز

بيوشيمي باليني ـ كد ( ١٥٠٩ ) 926A

	از میشود؟	صال کلسیم به کدام مورد آغ	انقباض عضله اسكلتي باات	-4.
۴) تروپوميوزين	۳) میوزین	۲) تروپونین	۱) اکتین	
	بینواسید تولید میشود؟	با دکربوکسیلاسیون کدام آه	تركيب متسع كننده عروق	-41
۴) گلوتامین	۳) هیستیدین	۲) آسپارتیک اسید	۱) آرژنین	
			انسان کمبود کدامیک را ت	-51
۴) پروتئین	۳) ید	۲) لیپید	۱) کربوئیدرات	
		، شده به وسیلهٔ پانکراس کدا		$-\Delta \Upsilon$
۴) گلوکاگون	۳) انسولین	۲) لیپاز	۱) تیروکسین	
		ت پیوندی شامل چیست؟	ماتريكس خارج سلولى باف	-44
۴) توبولین	۳) انیولین	۲) اکتین	۱) فيبرونكنين	
	مفراوی استفاده میشود؟	ل برای اتصال به اسیدهای ص	از كدام تركيب بهطور معمو	$-\Delta\Delta$
۴) گلیسین	۳) گلوکورونات	۲) سولفات	۱) اسیدهای چرب	
ل به پیرووات میشود؟	به سیکل اسیدسیتریک، تبدی	از اسید آمینهها قبل از ورود	اسکلت کربنی کدام گروه	-58
۴) گلاسین، لیزین	٣) لوسين _ آلاتين	۲) ترهانین، سیستئین	۱) سرین، تایروزین	
	ات تولید میشود؟	مل آمین به کدامیک، آسپارتا	در داخل بدن، با انتقال عا	$-\Delta Y$
۴) آلفا _ كتوگلوتارات	٣) اگزالواستات	۲) پیروات	۱) فومارات	
	<u>ند</u> ؟	آنتیاکسیدان تغذیهای نیست	کدامیک از موارد زیر یک	-51
۴) ویتامین C	۳) ویتامین E	۲) بتاکاروتن	۱) ویتامین ۲	
	جود است؟	tR! بالغ، كدام رديف بازى مو	در انتهای ۳ مولکول NA	-49
ACC-" (F	AAC-" ("	CCA-r' (r	CAA-7' (1	
		ر میکند؟	آسپرین کدام آنزیم را مها	-9.
۴) ليپواكسيژناز	۳) فسفولیپاز D	۲) لیپاز	۱) سیکلواکسیژناز	
عانبی آن ۵۳ /۱۰ و PK گرو	۲ و PK گروه آمین زنجیره ج	PK گروه کربوکسیل آن ۱۸/	اگر در اسیدآمینه Lys،	-81
		شد. PI آن کدام است؟	آمین انتهایی آن ۸/۹۵ با	
10/05 (4	9,44 (4	۵/۵۶ (۲	8,50 (1	
		۷ است؟	در کدام محلول pH برابر	-82
		1 colors HA	۱) Ka = ۱×۱۰ <sup>-۵</sup> و نسب	
		100 A	, m , 1 m , (1	
		ت <u>HA</u> مساوی ۱۰۰	۲) Ka=۱×۱۰ <sup>-۸</sup> ونسب	
		A		
		$\frac{1}{A}$ مساوی $\frac{HA}{A}$	۳) Ka = ۱×۱۰ <sup>-۷</sup> ونسب	
		<u>HA</u> مساوی ۱۰	۴) Ka=۱×۱۰ و نسب	
		A		e.w
عد دوراد .	سور فد اد.		باز آلی موجود در نوکلئوت	-71
۴) هیپوگزانتین	۳) گزانتین	۲) متیل هیپوگزانتین	۱) متیلگزانتین	

926A

صفحه ۹

بيوشيمي بالبني \_ كد ( ١٥٠٩)

۶۴ از بتا اکسیداسیون کامل اسید چرب ۱۶ کربنه و دارای یک پیوند دوگانه «روی اتم کربن فرد»، کدام یک تولید نمی شود؟ ۲ و ا گزینهٔ ۱ (۴ Acetyl – coA (۳ ۷NADH, H+ (۲ VFADH. () ۶۵ کدام مورد در گروه متفاوتی نسبت به بقیه قرار می گیرد؟ ٣) يلاسمالوژن ۴) لاکتوزیل سرامید ۲) اسفنگومیلین ۱) گانگلیوزید - ۶۶ تمام ترکیبات زیر بهجز ......از مشتقات کلسترول محسوب می شوند. ۴) توكوفرول ۲) کولیک اسید ۳) کلسی ترپول ۱) استرادیول از هیدرولیز کامل کدام ملکول، تعداد بیشتری گلیسرول حاصل می شود؟ ۲) کاردیو لیپین ١) سفالين ۴) فسفاتيديل اينوزيتول ٣) فاكتور فعال كننده يلاكتي ۶۸ آنزیم کراتین کیناز متشکل از دو زنجیره پلیپپتیدی مختلف و بهصورت دایمی است. در صورتی که تمامی احتمالات ترکیب دو زنجیره مختلف اتفاق بیفتد، کراتین کیناز دارای چند ایزوآنزیم خواهد بود؟ ۶۹ کدامیک از یونهای فلزی در واکنش DNA پلیمرازی شرکت میکند؟ Ca (f Zn (\* Mn (Y Mg () ۷۰ کدام آنزیم نقش کلیدی در تنظیم متابولیسم لیپیدها دارد؟ ۲) کارنی تین ترانسفراز II ۱) آسیل کوآ و هیدروژناز ٣) استيل كوآكربوكسيلاز ۴) اسید چرب سنتاز زیستشناسی: ۷۱ کدام پروتئین نقش مهاری در پروسه مرگ برنامهریزی شده سلولها دارد؟ Caspase 9 (f CytC (T BCLT (T ٧٢ کدام مولکول در همانندسازی جلوتر از بقیه حرکت می کند؟ DNA primase (7 DNA polymerase III (\* ۴) هلیکاز ٧٣ - براي انتقال مواد و واكنشها كدام اتصال مناسب است؟ Desmosome (7 Hemi Desmosome () Tight Junction (\* Gap Junction (\* ۷۴ کدام سیکلین، نقش تعیین کننده در فاز S مهره داران را دارد -DOF ACT ٧٥- در ساختمان تري پيتيد گلوتاتيون، كدام عنصر يافت مي شود؟ ۴) يتاسيم ۲) سديم ١) گوگرد ۳) منیزیم ٧٧- كدام ويروس از نظر اندازه كوچك تر است؟ DXIVE (T ۱) ویروس برگ تنباکو ۴) باکتر بوفاژ ۸ ٣) باكتريوفاژ ٢٠

بيوشيمي باليني \_ كد ( ١٥٠٩)

926A

صفحه ۱۰

۷۷ - در کدام سلول هستک وجود ندارد؟ ۲) جلبکهای سبز ۔ آبی ١) لوكوسيتها ۴) متازوآ ۳) پروتوزوا ۷۸ کدامیک، نشانه بیان در ژنها است؟ ۱) هتروکروماتین ٢) متيلاسيون هيستون ۴) یوبی کوپیتینه شدن هیستون ٣) استيلاسيون هيستون ٧٩ - كدام آنزيم، تبديل فروكتوز ١ و٤ بيس فسفات را به دى هيدروكسي استوفسفات انجام مي دهد؟ ٢) فسفو فروكتوكيناز ١) انولاز ۴) هگزوکيناز ٣) الدولاز ۸۰ کدام ژن انکوژن است؟ RB (T MYC (1 Par (+ BRCA (T ۸۱ کدام یک، از خواص کلوئیدی است؟ ۱) عدم حرکت ذرات کلوئیدی در محیط پراکنده کننده ۲) وجود بار الکتریکی در لایههای ذرات کلوئیدی ۴) نفوذ ذرات کلوئیدی از غشای طبیعی ٣) وجود سطح كم ذرات كلوئيدي A۲- کانال گلیکوفورین A چه نوع کانالی است؟ ۴) غيرفعال ٣) فعال ; L (T ۱) ترشحی ۸۳ آنتی کرها جزو کدام دسته از پروتئینها هستند؟ ۴) گلوبولینها ٢) گليکويروتئينها ٣) البومينها ١) ميوزينها ۸۴ سنتز پیریمیدنها از کدام مولکول آغاز میشود؟ ۴) اسیار تات ٣) گلوتامات ۲) اسپارژین ۱) پرولین ۸۵ کدام لایه، مسئول تولید سلولهای کبدی است؟ ۴) مزودرم ۳) اکتودرم ۲) اندودرم ۱) تروفواکتودرم ۸۶ در چرخه TCA در هنگام تبدیل مالات به اگزالواستات، کدام متابولیت تولید می شود؟ NAD (Y FADHY (\* CoASH (\* NADH () AV تعداد کلی ATP تولیدشده در مسیر اکسیداسیون کامل یک مولکول گلوکز از مسیر شاتل مالات ـ آسیارتات كدام است؟ T9 (T 47 (1 TO (4 TA (T ۸۸ - فعالیت MPF در کدام مرحله به حداکثر می رسد؟ SIT Gr ( ۴) يروفاز ١) متافاز ۸۹ سنتز PremRNA هنگام رونویسی ژنهای سلولهای یوکاریوتی بهوسیله کدامیک انجام میشود؟ ۱) RNA پلیمراز I بدون استفاده از انرژی ATP ۲) RNA پلیمراز I با استفاده از انرژی ATP \* RNA پلیمراز II با استفاده از انرژی ATP ۳) RNA پلیمراز II بدون استفاده از انرژی ATP ٩٠ منشاء جنيني سلولهاي كرومافيني مغز غده فوق كليه كدام است؟ ۲) مزودرم پشتی ۱) مزودرم شکمی ٣) لوله عصبي ۴) ستيغ عصبي

	TORRE WITHOUT TO THE STATE OF						
در مینو تندری انسان، نداه	کدامیک رمز پایانی است؟						
AUA ()		AGG (Y					
UGA (*		CGA (f					
نشکیل جنین از یک سلول	ىلول پارانشيمى بەدلىل	سلولهای پارانشیمی	ی است و رویان ایجادشده،				
نامیده میشود. (از چپ به ر	به راست)						
y-Somatic embryo (\	Totipotency-S	Totipotency-zygotic embryo (Y					
n-somatic embryo (*	Differentiation-s	zygotic embryo (f	Differentiation-zy				
به نمونه مضاعف هولو تایپ	ایپ چه میگویند؟						
۱) نئوتايپ	۲) پاراتایپ	۳) ایزوتایپ	۴) تتراتایپ				
وع پوشش فولیکولهای غ	ی غده تیروئید کدام است؟						
۱) مکعبی مطبّق	۲) سنگفرشی ساده	۳) استوانهای ساده	۴) مکعبی ساده				
خارجى ترين لايه پوشاننده	نده یک فیبر عصبی میلین دار	محیطی کدام است؟					
۱) میلین	۲) سلول شوان	٣) تيغه پايه	۴) اندونوريوم				
«Kinetoplast» در تاژکدا	ژکداران چیست؟						
۱) DNA متراکم در درون	رون یک میتوکندری	ک) DNA هستهای					
۳) جسمک پایهای		۴) لايه نگهدارنده تاژک					
كدام DNA پلىمراز يوكار	کاریوتی، از خاصیت پرایمزی نب	یز برخوردار است؟					
۱) اپسیلون	۲) گاما	۳) بتا	۴) آلفا				
<b>بروتئینهای متحرک در مح</b>	ر محل اتصال میکروتوبول به کر	روماتیدها (در کینه توکور)	ر) کدام است؟				
۱) اکتین و توبولین		۲) داینین و توبولین					
۳) داینین و کاینزین		۴) توبولین و کایئزین					
آنزیم گلوکز ۶ فسفاتاز از آن	از آنزیمهای شاخص کدام است	99					
۱) غشای داخلی میتوکندری	ندرى	۲) غشای شبکه اندوپلاس	لاسمى				
۳) غشای خارجی میتوکندر	كندرى	۴) سطح خارجی پلاسما	مالم				
کدام یک از انواع rRNA ه	rl ها در اتصال دو جزء ریبوزوم	، دخالت بیشتری دارد؟					
Δs ()	TAS (T	IAS (T	18s (f				
الی و عمومی:							
شمار اتهها در ۳ گرم کربن	ئربن (C = 1۲) با چند گرم منی	بزیم (Mg = ۲۴) برابر اس	ست؟				
74 ()	۶ (۲	۲ (۳	17 (4				
فدرت اسیدی کدام ترکیب	ليب بيشتر است؟						
۱) استیک اسید	۲) مونوکلرواستیک اسید	۳) تری کلرواستیک اسی	سید ۴) دیکلرو استیک اسید				
گر pH محلولی ۱۱ باشد، غ	د، غلظت مولار يون OH <sup>-</sup> در	آن کدام است؟					
			10-Y (F				
خار (۱) د (1) د (	جی ترین لایه پوشاهٔ سیلین   Kinetopla » در تا DNA متراکم در د جسمک پایهای متحرک د نثین و توبولین تشین و توبولین نشای داخلی میتوک فشای داخلی میتوک فشای داخلی میتوک میک از انواع RNA میک از انواع RNA و عمومی:  ر اتمها در ۳ گرم کا از انمها در ۳ گرم کا سید تا اسیدی کدام ترک تا اسیدی کدام ترک اسید تا اسیدی	جی ترین لایه پوشاننده یک فیبر عصبی میلیندار سیلین ۲) سلول شوان سیلین ۲) سلول شوان ۴ Kinetopla در تاژکداران چیست؟ DNA متراکم در درون یک میتوکندری جسمک پایهای DNA پلیمراز یوکاریوتی، از خاصیت پرایمزی ناشینهای متحرک در محل اتصال میکروتوبول به کا کنین و توبولین کتین و توبولین فشای داخلی میتوکندری فشای داخلی میتوکندری فشای خارجی میتوکندری کنین از انواع RNA ها در اتصال دو جزء ریبوزوم کا ۲۸۶ میک از انواع ۲۸۸ ها در اتصال دو جزء ریبوزوم که تا تا ایمون کرم میک کنین کرم کربن (۲۱ = ۲) با چند گرم میک کنین سیدی کدام ترکیب بیشتر است؟ ۲۸۶ میک اسیدی کدام ترکیب بیشتر است؟ سیدی کدام ترکیب بیشتر است؟ سید کرم میک اسید کا میک ایر باشد، غلظت مولار یون OH در	جی ترین لایه پوشاننده یک فیبر عصبی میلیندار محیطی کدام است؟  سلین ۲) سلول شوان ۳) تیغه پایه  DNA « تاژکداران چیست؟  PNA متراکم در درون یک میتوکندری ۴) لایه نگدارنده تاژک میلیه کیهای ۴) لایه نگدارنده تاژک میلیهای ۴) لایه نگدارنده تاژک میلیهای ۳) بنا پسیلون ۲) گاما ۳) بنا کتین و توبولین و توبولین و توبولین و توبولین و کاینزین ۴) توبولین و توبولین و توبولین و کاینزین ۴) توبولین و کاینزین ۴) توبولین و کاینزین ۴) شاه کدام است؟  شمای داخلی میتوکندری ۴) شما در اتصال دو جزء ریبوزوم دخالت بیشتری دارد؟  میک از انواع RNA ها در اتصال دو جزء ریبوزوم دخالت بیشتری دارد؟  الکا در ۳ کرم کربن (۲ = ۲) با چند گرم منیزیم (۲۳ = ۱۸) برابر اله (۱۸ و ۱۸				

926A بيوشيمي باليني - كد ( ١٥٠٩) صفحه ۱۲ ۱۰۴ فشار اسمزی محلول یک مولار کدام ترکیب، بیشتر است؟ ۳) گلیسرول ۲) گلوکز ۴) سدیمکلرید ١) اتانول ۱۰۵− اگر pH یک بافر، دو واحد بیشتر از pK اسید مربوط باشد، نسبت غلظت نمک به اسید مربوطه، کدام است؟ 1 (1 100 1 (4 ۱۰۶- هورمون انسولین دارای ۳/۴ درصد گوگرد است. وزن اتمی گوگرد ۳۲ و انسولین دارای ۶ اتم گوگرد است. وزن مولکولی انسولین چند گرم بر مول است؟ 0800 (1 947 (7 10,8 ( 101/1 (4 ۱۰۷- در یک واکنش شیمیایی، غلظت ترکیب A در عرض ۲۳ دقیقه از ۳۵ ۰٫۰ مول بر لیتر به ۲۸۵ ۰٫۰ مول بر لیتر تغییر میکند. سرعت واکنش برحسب  $\mathbf{mol.L^{-1}.min^{-1}}$  کدام است؟ -1/12×10-4 (1 T/A×10-+ (T 8/0×10-" (T -8,0×10-4 (4 ۱۰۸- برای تهیهٔ ۱۰۰mL محلول ۲۵۰۰٫۰ مولار سدیم هیدروکسید، چند میلی گرم از آن لازم است؟  $(NaOH = f \circ g.mol^{-1})$ Fo (1 To (T To (T 10 (4 ۱۰۹ کدام عنصر با عدد اتمی داده شده، در همهٔ ترکیبهای خود، یک فلز دو ظرفیتی است؟ TT (F 48 (1 -۱۱− اگر از واکنش فلز آلومینیم با هیدروکلریک اسید برای تهیهٔ گاز هیدروژن استفاده شود، برای تولید ۵ لیتر گاز هیدروژن، چند گرم آلومینیم لازم است؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش ۲۵L است. ۱-Al = ۲۷g.mol) D/F (1 T/F (T T/8 (T 4,7 (4

بيوشيمي باليني ـ كد ( ١٥٠٩) 926A

111- كدام گزينه نشان دهندهٔ يک مخلوط راسميک است؟

۱) مخلوط مساوی از فرم D و L یک ترکیب

۲) یک مخلوط از فرم L ترکیب و ایزومر چپگردان آن ترکیب

۳) یک مخلوط فرم D ترکیب و ایزومر چپگردان آن ترکیب

۴) یک مخلوط از ایزومر چپگردان نوریلاریزه و راست گردان آن

۱۱۲- در اثر احیای گلوکز با ، H در مجاورت نیکل، کدام ترکیب به دست می آید؟

۱) گالاکتوز ۲) سوربیتول ۳) فروکتوز ۴) گلوکاریک اسید

۱۱۳- کدام ترکیب می تواند ایزومرهای R و S داشته باشد؟

$$CH_{\tau}$$
 $CH_{\tau}$ 
 $C$ 

۱۱۴ از ترکیب آمینهای نوع اول با کدام یک از ترکیبات زیر، مولکولی حاصل می شود که حاوی پیوند ایمین

(-N = C-) است؟

١) آلدئيدها

٣) اسيدهاي آلي ۴) فنلها

۱۱۵ - واکنش آیینه نقره برای شناسایی کدام دسته از مواد کاربرد دارد؟

۱) تیواسترها ۲) آلدئیدها

۳) الكلهاى نوع اول ۴) اسيدهاى كربوكسيليک

۱۱۶- محصول رنگی حاصل از واکنش نینهیدرین با یک آمینو اسید، دارای کدام قسمت از مولکول آمینو اسید است؟

۱) گروه ایمین ۲) نیتروژن آمینو

۳) گروه کربوکسیل ۴

۱۱۷ از اکسیداسیون الکل نوع دوم، کدام ماده بهدست می آید؟

۱) کربوکسیل ۲) آلدئید

۳) انیدرید ۴

۱۱۸ در کدام مولکول، عدد اکسایش کربن متصل به اکسیژن بیشتر است؟

۱) اتانول ۲) متانول

۳) اسید استیک (۴

926A صفحه ۱۴ بيوشيمي باليني - كد ( ١٥٠٩)

۱۱۹ در مولکول زیر، کدام گروه شیمیایی وجود ندارد؟

٣) آمين

-۱۲۰ مولکول زیر دارای چه تعداد ایزومر فضایی است؟

# مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

ا 926A صفحه ۱۵

بیوشیمی بالینی ـ کد ( ۱۵۰۹)

# مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

926A صفحه ۱۶

بیوشیمی بالینی ـ کد ( ۱۵۰۹)