

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

کد کنقول

319

F

صبح پنج شنبه  
۱۳۹۹/۵/۲



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فناوری و منابع خاک - کد (۱۳۰۸)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	شمی و حاصلخیزی خاک	۲۵	۳۱	۵۵
۳	فیزیک و حفاظت خاک	۲۵	۵۶	۸۰
۴	بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک	۲۵	۸۱	۱۰۵
۵	پیدایش و رده‌بندی خاک و ارزیابی اراضی	۲۵	۱۰۶	۱۳۰
۶	فرسایش و حفاظت خاک	۲۵	۱۳۱	۱۵۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...)، پس از پذیرایی آزمون، برای نمایمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجلز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

## آخرین اخبار و اطلاعات کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فتافوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- I omitted all the extraneous details while explaining the ----- of the matter to him.  
1) breach                  2) distinction                  3) qualm                  4) gist
- 2- While his brother writes in an unclear and clumsy way, Sam himself is known for his ----- style of writing.  
1) lucid                  2) verbose                  3) dull                  4) feasible
- 3- Poultry farms place the eggs into incubators to ----- the growth of the embryo into chicken.  
1) conquer                  2) hasten                  3) outline                  4) elude
- 4- With as many as three witnesses giving evidence against her, the ----- of her claim that she was innocent was in serious doubt.  
1) demonstration                  2) paradigm                  3) veracity                  4) empiricism
- 5- I did not like her way of teaching because her lecture had too many digressions; she kept on wandering to various subjects, most of them not ----- to the central idea of her topic.  
1) vulnerable                  2) peripheral                  3) pertinent                  4) loyal
- 6- With the advent of electric bulbs and emergency lights, the use of gas lamps became -----.  
1) imprecise                  2) repetitive                  3) idealistic                  4) obsolete
- 7- The employee did not believe the implausible story that Janet ----- to justify her absence from work.  
1) concocted                  2) scrutinized                  3) manipulated                  4) reassured
- 8- The doctor has advised him to ----- adhere to the prescribed regimen; otherwise, there is a danger of relapse of the illness.  
1) sequentially                  2) strictly                  3) ineptly                  4) selectively
- 9- The ----- in her speech can put off almost anyone; she urgently needs to tone down the harsh words she uses.  
1) explicitness                  2) enigma                  3) shortsightedness                  4) acerbity
- 10- He is so wasteful; he has ----- all the money that he had borrowed from me, and is now back again asking for more.  
1) allocated                  2) neglected                  3) depleted                  4) accumulated

## PART B: Cloze Passage

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Good learners work hard. A few things may come easily to learners, but most knowledge requires effort (11) ----- to put in the time. They talk with others, read more, study more and carry around when they don't understand, (12) ----- about it before they go to sleep, at the gym, on the bus. Good learners are persistent. When they fail, they carry on, (13) ----- that they will figure it out eventually. (14) -----, they learn from their mistakes. Good learners recognize (15) ----- always fun. But that does not change how much they love it.

- |     |                                   |                                  |                       |                       |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11- | 1) which is good learners willing | 2) and good learners are willing |                       |                       |
|     | 3) that good learners willing are | 4) willing are good learners     |                       |                       |
| 12- | 1) thinking                       | 2) to think                      | 3) they think         | 4) by thinking        |
| 13- | 1) are confident                  | 2) who are confident             | 3) they are confident | 4) confident          |
| 14- | 1) Although                       | 2) In the meantime               | 3) A case in point    | 4) Whereas            |
| 15- | 1) learning not be                | 2) that learning is not          | 3) to learn not to be | 4) learning it is not |

## PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

### PASSAGE 1:

Edaphology is one of two main divisions of soil science, the other being pedology. Edaphology is concerned with the influence of soils on living things, particularly plants. It includes the study of how soil influences humankind's use of land for plant growth as well as man's overall use of the land. General subfields within edaphology are agricultural soil science (known by the term agrology) and environmental soil science. (Pedology deals with pedogenesis, soil morphology, and soil classification.) Agricultural soil science is the application of soil chemistry, physics, and biology dealing with the production of crops. In terms of soil chemistry, it places particular emphasis on plant nutrients of importance to farming and horticulture, especially with regard to soil fertility and fertilizer components. Physical edaphology is strongly associated with crop irrigation and drainage. Soil husbandry is a strong tradition within agricultural soil science. Beyond preventing soil erosion and degradation in cropland, soil husbandry seeks to sustain the agricultural soil resource through the use of soil conditioners and cover crops. Environmental soil science studies our interaction with the pedosphere on beyond crop production. Fundamental and applied aspects of the field address vadose zone functions, septic drain field site assessment and function, land treatment of wastewater, stormwater, erosion control, soil contamination with metals and pesticides, remediation of contaminated soils, restoration of wetlands, soil degradation, and environmental nutrient management. It also studies soil in the context of land-use planning, global warming, and acid rain.

- 16- Environmental soil science addresses all the following fundamental /applied aspects except -----.
- 1) fertilization of croplands                            2) environmental nutrient management  
3) restoration of wetlands                            4) land treatment of wastewater
- 17- It is stated in the passage that -----.
- 1) pedology is a branch of pedosphere                    2) horticulture is physical edaphology  
3) edaphology is similar to pedology                    4) agrology is a branch of edaphology
- 18- All of the following about ‘soil husbandry’ are correct, according to the passage, except that it -----.
- 1) emphasizes large-scale horticultural practice                    2) focuses on soil conditioners and cover crops  
3) has deep roots in agricultural soil science                    4) deals partly with soil erosion in cropland
- 19- The passage mentions that, as far as soil chemistry is concerned, agricultural soil science focuses particularly on -----.
- 1) soil contamination with heavy metals                    2) soil degradation in plains and wetlands  
3) soil morphology, and soil classification                    4) soil fertility and fertilizer components
- 20- The word ‘pedogenesis’ in the passage (underlined) is closest to the ----- of soil.
- 1) ‘division’    2) ‘fertility’    3) ‘forming’    4) ‘destruction’

## PASSAGE 2:

Biochar is charcoal used as a soil amendment. Biochar is a stable solid, rich in carbon, and can endure in soil for thousands of years. It is recognized as offering a number of benefits for soil health. Many benefits are related to the extremely porous nature of biochar. This structure is found to be very effective at retaining both water and water-soluble nutrients. Biochar is very suitable as a habitat for many beneficial soil microorganisms. When pre-charged with these beneficial organisms biochar becomes an extremely effective soil amendment promoting good soil, and in turn plant, health. Biochar has also been shown to reduce leaching of E-coli through sandy soils depending on application rate, feedstock, pyrolysis temperature, soil moisture content, soil texture, and surface properties of the bacteria. For plants that require high potash and elevated pH, biochar can be used as a soil amendment to improve yield. Biochar can improve water quality, reduce soil emissions of greenhouse gases, reduce nutrient leaching, reduce soil acidity, and reduce irrigation and fertilizer requirements. Biochar was also found under certain circumstances to induce plant systemic responses to foliar fungal diseases and to improve plant responses to diseases caused by soilborne pathogens. Studies have reported positive effects from biochar on crop production in degraded and nutrient-poor soils. The application of compost and biochar under FP7 project FERTIPLUS has had positive effects in soil humidity, and crop productivity and quality in different countries. Biochar can be designed with specific qualities to target distinct properties of soils. In savanna soil, biochar reduces leaching of critical nutrients, creates a higher crop uptake of nutrients, and provides greater soil availability of nutrients.

- 21- It is stated in the passage that -----.
- 1) project FERTIPLUS may do away with biochar
  - 2) savanna soil produces very high-quality biochar
  - 3) target-specific biochar can be developed for soil
  - 4) biochar adds to crop productivity through humidity
- 22- The passage mentions that biochar can -----.
- 1) keep water-soluble nutrients
  - 2) grow in carbon-rich stable soil
  - 3) be developed as a soil microorganism
  - 4) pre-charge beneficial organisms
- 23- The passage points to the fact that biochar is -----.
- 1) high in both potash and pH levels
  - 2) ineffective in nutrient-poor soils
  - 3) an inexpensive soil amendment
  - 4) of low systemic value in some crops
- 24- According to the passage, biochar can reduce all the following except -----.
- 1) nutrient leaching
  - 2) taproot fungal diseases
  - 3) soil acidity
  - 4) irrigation requirements
- 25- The word 'pyrolysis' in the passage (underlined) refers to a chemical change brought about by ----- temperatures.
- 1) 'high'
  - 2) 'freezing'
  - 3) 'sub-freezing'
  - 4) 'low'

### **PASSAGE 3:**

Terra rossa is a well-drained, reddish, clayey to silty clayey soil with neutral pH conditions and is typical of the Mediterranean region. The reddish color of terra rossa is the result of the preferential formation of hematite over goethite. This soil type typically occurs as a discontinuous layer that ranges from a few centimeters to several meters in thickness that covers limestone and dolomite bedrock in karst regions. The high internal drainage and neutral pH conditions of terra rossa are a result of the karstic nature of the underlying limestone and dolomite. Terra rossa is also found associated with Mediterranean climates and karst elsewhere in the world. Compared to most clayey soils, terra rossa has surprisingly good drainage characteristics. In pedology, red Mediterranean soil, also known as terra rossa ("red soil") is a soil classification that has been formally superseded by the formal classifications of systems such as the FAO soil classification, but that is still in common use. The terra rossa classification was still, as of 1997, a part of the national soil classifications of countries such as Italy. The UNESCO/FAO World map equivalents are the chromic luvisols (a sub-order of the luvisols), and the USDA soil taxonomy equivalent is the rhodustalfs (a sub-order of the ustalfs). The classification denotes red-coloured soils ("red rendzinas") which develop in or on the karstic landscape of the limestones of the Miocene and earlier periods, as well as calcretes in regions where the modern Mediterranean climate is predominant. The most accelerated development of red Mediterranean soils occurred from the Miocene to the Late Pleistocene, due to the large amount of climate fluctuation in those periods.

- 26- We may understand from the passage that -----.
- 1) dolomite bedrocks were developed in the Pleistocene
  - 2) karstic landscape are often only formed of rendzinas
  - 3) dolomite forms the underlying structure of limestone
  - 4) the chromic luvisols and the rhodustalfs are similar

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فتاوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- 27- It is stated in the passage that -----.
- 1) Mediterranean soils have mildly acidic pH conditions
  - 2) the climate would hardly stay the same in the Miocene
  - 3) the typical Mediterranean soil is either clayey or silty
  - 4) the USDA soil taxonomy follows the FAO World map
- 28- The passage points to the fact that -----.
- 1) discontinuous layers of soil are usually a few meters thick
  - 2) terra rossa provides better drainage than most clayey soils
  - 3) karstic landscapes are special to Miocene and earlier periods
  - 4) Mediterranean soils are considered as ‘new’ soil in pedology
- 29- The passage mentions that -----.
- 1) the ustalfs and the luvisols are both used in Italy
  - 2) some red-colored soils are called ‘red rendzinas’
  - 3) Mediterranean climate is predominantly semi-arid
  - 4) ‘red soil’ is still used today as a soil classification
- 30- The word ‘karst’ in the passage (underlined) is best a geological term related to certain irregular ----- regions.
- 1) ‘gochite’      2) ‘mud and silt’      3) ‘limestone’      4) ‘hematite’

## شیمی و حاصلخیزی خاک:

- ۳۱- در مورد کانی‌های دای اکتاهدرال، گزینه درست کدام است؟

(۱) دو سوم حفرات ورقه هشت‌وجهی توسط  $Mg^{2+}$  پر شده است.

(۲) دو سوم حفرات ورقه هشت‌وجهی توسط کاتیون‌ها پر شده است.

(۳) همه حفرات ورقه چهار‌وجهی توسط  $Si^{4+}$  و  $Al^{3+}$  پر شده است.

(۴) همه حفرات ورقه هشت‌وجهی توسط کاتیون‌های دو ظرفیتی اشغال شده است.

- ۳۲- چرا در اندازه‌گیری ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) در مرحله شستشو از الكل استفاده می‌شود؟

(۱) ثابت دی‌الکتریک بالای آن که از پراکنده شدن ذرات خاک جلوگیری می‌کند.

(۲) ثابت دی‌الکتریک بالای آن که سبب پراکنده کردن ذرات خاک می‌شود.

(۳) ثابت دی‌الکتریک پایین آن که از پراکنده شدن ذرات خاک جلوگیری می‌کند.

(۴) ثابت دی‌الکتریک پایین آن که سبب پراکنده کردن ذرات خاک می‌شود.

- ۳۳- میزان کربنات کلسیم معادل خاکی برابر با ۱۰ درصد است. بررسی نشان داده است که در این خاک فقط کربنات

کلسیم و کربنات منیزیم وجود دارد و مقدار سایر کربنات‌ها ناچیز است. اگر میزان کربنات کلسیم این خاک برابر

با ۵ درصد باشد، درصد کربنات منیزیم این خاک چند درصد است؟

$$(Ca = 40, Mg = 24, O = 16, C = 12 \frac{gr}{mol})$$

۸ (۴)

۵ (۳)

۶/۴ (۲)

۴/۲ (۱)

- ۳۴- در بلور سدیم کلراید، عدد کوئردیناسیون هر یک از یون‌های سدیم و کلر، کدام است؟

۶ (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۳۵- میزان قطبیت کدام پیوند کم‌تر است؟

N-O (۴)

H-O (۳)

H-N (۲)

C-O (۱)

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- ۳۶ - در سیلیکات‌های اولیه، تعداد گوشه‌های چهاروجهی به اشتراک گذارده شده از زیاد به کم به ترتیب کدام است؟

(۱) آمفیبول > پیروکسین > فلدسپار


(۲) فلدسپار > پیروکسین > آمفیبول

- ۳۷ - گزینه درست در مورد فراوانی کانی‌های رسی در خاک‌های مناطق گرم و مرطوب کدام است؟

(۱) رس‌های ۱:۱ و رس‌های اکسیدی

(۲) رس‌های ۲:۱ و رس‌های اکسیدی

- ۳۸ - دو محلول A و B با ترکیب زیر تهیه می‌کنیم:



اگر μ علامت قدرت یونی و ( ) علامت فعالیت یون و A و B علامت محلول باشد، گزینه درست کدام است؟

$$\frac{(Na)_A}{(Mg)_A} = 1, \mu_A = \mu_B \quad (۲)$$

$$\frac{(Na)_A}{(Na)_B} = 0.02, \mu_B > \mu_A \quad (۱)$$

$$\frac{(Na)_B}{(Mg)_B} < 1, \mu_B > \mu_A \quad (۴)$$

$$\frac{(Na)_B}{(Mg)_B} > 1, \mu_B > \mu_A \quad (۳)$$

- ۳۹ - کدام یک از اجزای هوموس در کمپلکس کردن عناصر کم مصرف و جلوگیری از رسوب آن‌ها در خاک دارای اهمیت است؟

(۱) اسید فولویک      (۲) اسید هماتوملانیک      (۳) اسید هیومیک      (۴) هیومین

- ۴۰ - عصاره اشباع خاکی با  $\frac{dS}{m}$  درصد نمک بر حسب  $(SP = 47\%)$  تقریباً چقدر است؟

۵ (۲)      ۳ (۱)

۱۰ (۴)      ۶ (۳)

- ۴۱ - نسبت مولی  $\frac{H}{C}$  در مواد هومیک خاک تقریباً چقدر است؟

۰/۵ (۲)      ۰/۲۵ (۱)

۲ (۴)      ۱ (۳)

- ۴۲ - pH دو خاک A و B به ترتیب اسیدی و قلیاً است. اگر مقدار یکسان و زیادی از کود پتابسیم به این دو خاک که

هر دو دارای ظرفیت تثبیت پتابسیم هستند، اضافه شود، گزینه درست کدام است؟

(۱) میزان تثبیت پتابسیم در خاک A بیش از خاک B است.

(۲) میزان تثبیت پتابسیم در خاک B بیش از خاک A است.

(۳) CEC خاک B بیش از خاک A خواهد شد.

(۴) CEC خاک A بیش از خاک B خواهد شد.

- ۴۳ - اگر ثابت هیدرولیز  $Al^{3+}$  برابر با  $10^{-5}$  باشد، کدام گونه آلومینیوم در محلولی با  $pH = 4$  غالب است؟

$[Al(OH)_4(H_2O)]^+$  (۲)       $[Al(OH)_4(H_2O)]^0$  (۱)

$[Al(H_2O)_6]^{3+}$  (۴)       $[AlOH(H_2O)_5]^{2+}$  (۳)

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- ۴۴- در کدام شرایط نیترات سازی سریع‌تر اتفاق می‌افتد؟

- (۱) رطوبت ظرفیت زراعی و دمای  $۲۰^{\circ}$  درجه  
(۲) رطوبت اشباع و دمای  $۱۵^{\circ}$  درجه  
(۳) رطوبت ظرفیت زراعی و دمای  $۳۰^{\circ}$  درجه  
(۴) رطوبت  $۸^{\circ}$  درصد اشباع و دمای  $۳۰^{\circ}$  درجه

- ۴۵- در فرایند جذب فعال یون‌ها، کدام جزء سلولی نقش اصلی را دارد و عامل تأمین انرژی کدام است؟

- (۱) پلاسمالما - مولکول ATP  
(۲) پمپ پتاسیمی  
(۳) میتوکندری - پمپ هیدروژن  
(۴) میتوکندری - مولکول ATP

- ۴۶- اگر کود نیتروژن به جای این که پخش سطحی شود با خاک مخلوط شود، هدررفت کود از کدام طریق کاهش می‌باید؟

- (۱) آبشوئی از طریق رواناب  
(۲) آبشوئی یون نیترات  
(۳) تضعید به شکل گاز نیتروژن  
(۴) تضعید به شکل آمونیاک

- ۴۷- برای تهیه یک مخلوط کودی  $۹۵$  کیلوگرم آمونیوم سولفات  $\text{NH}_4\text{SO}_4$  و  $۱۲۵$  کیلوگرم TSP با  $۲۰/۵$  درصد فسفر استفاده شده است. اگر  $۳۰$  کیلوگرم فیلر به مخلوط اضافه شده باشد، فرمول نهایی کود تهیه شده بر مبنای کدام است؟ N-P-K

- (۱)  $۸-۸-۰$   
(۲)  $۸-۱۰-۰$   
(۳)  $۱۰-۵-۰$   
(۴)  $۱۴-۳۰-۰$

- ۴۸- کدام موارد شامل عناظر غذایی مؤثر در ذخیره انرژی و حفظ ساختار سلول‌ها در گیاه هستند؟

- Mg, Mn, P (۲)  
Ca, B, S (۱)  
P, Si, B (۴)  
Mn, Si, Fe (۳)

- ۴۹- سه شرط اصلی برای بهینه‌سازی تأمین گوگرد مورد نیاز گیاه در خاک، کدام موارد هستند؟

- (۱) بافت سنگین، مواد آلی، pH مناسب  
(۲) بافت سبک، N/S بالا، باکتری‌های احیاکننده  
(۳) حضور گچ، مواد آلی، باکتری‌های اکسیدکننده  
(۴) رطوبت کافی، مواد آلی، باکتری‌های اکسیدکننده

- ۵۰- ضریب هدررفت فسفات از طریق آبشویی از لایه سطحی خاک‌های معدنی و آلی به ترتیب در کدام ترتیب درست است؟

- (۱) زیاد و کم  
(۲) زیاد و زیاد  
(۳) کم و زیاد  
(۴) کم و متغیر

- ۵۱- در مورد معادله میچرلیخ، گزینه درست کدام است؟

- (۱) ضریب معادله میچرلیخ با تغییر نوع خاک تغییر نمی‌کند.  
(۲) این معادله برای عملکرد نسبی  $۱۰۰$  درصد یا بیش تر قابل استفاده نیست.  
(۳) اگر یک واحد بال (Baule) کود مصرف شود، مقدار ضریب میچرلیخ  $۵/۵$  خواهد بود.  
(۴) با افزایش ضریب میچرلیخ، کود مورد نیاز گیاه برای دستیابی به بیشترین محصول افزایش می‌باید.

- ۵۲- قابلیت هدایت الکتریکی در محلول کدام مورد بیش تر است؟

- (۱) مواد آلی اشباع شده با کلسیم  
(۲) مواد آلی اشباع شده با آهن  
(۳) مواد آلی اشباع شده با منیزیم

- ۵۳- اگر خطای دستگاه فیلم فتوомتر  $L/2 \text{ mg} \pm ۰$  باشد، خطای اندازه‌گیری غلظت پتاسیم در دو عصاره با غلظت پتاسیم

(۱)  $۴۰/۴$  و  $۴۰/۴$  میلی گرم در لیتر به ترتیب چند درصد خواهد بود؟



- (۲)  $۴۰/۴$  و  $۴۰/۴$   
(۳)  $۵/۵$  و  $۵/۵$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) 319F

- ۵۴- برای تعیین فسفر قابل جذب گیاه در خاک‌های آهکی ایران، از کدام عصاره‌گیر استفاده می‌شود؟



- ۵۵- در شرایط تنفس خشکی و شوری، اثرات از دست دادن آب گیاه منجر به کدام واکنش در گیاه می‌شود؟

(۱) نسبت پتانسیم به سدیم سیتوپلاسمی افزایش می‌یابد و سمیت سولفات منجر به کاهش غلظت پروتئین می‌شود.

(۲) نسبت پتانسیم به سدیم سیتوپلاسمی کاهش می‌یابد و سمیت کلر منجر به کاهش شدید غلظت پروتئین می‌شود.

(۳) تعادل نسبت پتانسیم به سدیم سیتوپلاسمی از بین می‌رود و سمیت سدیم منجر به کاهش غلظت پروتئین می‌شود.

(۴) نسبت پتانسیم به سدیم سیتوپلاسمی به تعادل می‌رسد و سمیت پتانسیم احتمالاً منجر به افزایش پروتئین می‌شود.

## فیزیک و حفاظت خاک:

- ۵۶- کدام گزینه ارزیابی درست‌تری از وضعیت تهویه‌ای خاک می‌دهد؟

(۱) تخلخل تهویه‌ای (fa) خاک یک روز پس از آبیاری یا توقف بارندگی

(۲) تخلخل کل خاک (f) یک روز پس از آبیاری یا توقف بارندگی

(۳) ضربیت هوگذری خاک (Ka) یک روز پس از آبیاری یا توقف بارندگی

(۴) مکش ورود هواخ (he) یک روز پس از آبیاری یا توقف بارندگی

- ۵۷- در کدام حالت با اعمال یک نیروی معین، فشرده‌گی خاک بیشتر خواهد بود. فرض بر این است که توزیع اندازه

ذرات اولیه در هر حالت مشابه باشد؟

(۱) خاک با ساختمان مکعبی بدون گوشه

(۲) خاک بدون ساختمان تکدانه‌ای

- ۵۸- عمق نفوذ یا میرش گرما در خاک در یک دوره تناوب (روزانه یا سالانه) رابطه ..... با ..... دارد.

(۱) عکس - طول دوره تناوب

(۲) مستقیم - گرمای ویژه خاک

(۳) مستقیم - گرمای ویژه خاک

- ۵۹- با افزایش مکش در یک نمونه خاک مرطوب، گزینه درست کدام است؟

(۱) تهویه خاک افزایش می‌یابد.

(۲) تهویه خاک کاهش می‌یابد.

(۳) جرم مخصوص ظاهری خاک کاهش می‌یابد.

(۴) جرم مخصوص ظاهری خاک افزایش می‌یابد.

- ۶۰- کدام عامل باعث کاهش هدایت حرارتی خاک می‌شود؟

(۱) آبیاری

(۲) تراکم خاک

(۳) شخم

- ۶۱- مقدار هدایت الکتریکی (EC) در دو خاک A و B به ترتیب ۵ و ۲۰ دسی‌زیمنس بر متر است. اگر از تانسیومتر

برای اندازه‌گیری پتانسیل این دو خاک استفاده شود، در صورت یکسان بودن رطوبت و سایر ویژگی‌های فیزیکی

دو خاک، کدام گزینه درباره عدد قراتت شده تانسیومتر در این دو خاک درست است؟

(۱) عدد تانسیومتر در هر دو خاک یکسان است.

(۲) عدد تانسیومتر در خاک B یک‌چهارم خاک A است.

(۳) عدد تانسیومتر در خاک B چهار برابر بیشتر از خاک A است.

(۴) با توجه به شور بودن خاک‌ها، تانسیومتر در این خاک‌ها قابل استفاده نیست.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- ۶۲- کدام گزینه در مورد هدایت هیدرولیکی خاک درست است؟

(۱) هدایت هیدرولیکی خاک عمداً تحت تأثیر حجم منافذ (تخلخل خاک) است.

(۲) هدایت هیدرولیکی خاک شنی در  $\Psi_m = -2\text{cm}$  از هدایت هیدرولیکی خاک رسی در همین پتانسیل کمتر است.

(۳) هدایت هیدرولیکی خاک شنی در  $\Psi_m = -1000\text{cm}$  از هدایت هیدرولیکی خاک لومی در همین پتانسیل بیشتر است.

(۴) هدایت هیدرولیکی اشباع و نزدیک اشباع در خاک درشت بافت بیشتر از خاک ریز بافت است.


- ۶۳- منحنی مشخصه رطوبتی سه خاک به صورت زیر است، کدام جمله درست است؟

(۱) تخلخل خاک A بیش از خاک B و خاک C است.

(۲) قدرت نگهداری آب خاک C از خاکهای A و B بیشتر است.

(۳) منافذ درشت خاکهای A و B بیشتر از خاک C است.

(۴) منافذ ریز خاک C بیش از خاکهای A و B است.



- ۶۴- ضریب یکنواختی ( $C_u$ ) خاک اول ۴ و خاک دوم ۱۵ است، گزینه درست کدام است؟

(۱) توزیع اندازه ذرات خاک اول وسیع‌تر از خاک دوم است.

(۲) تراکم‌پذیری خاک دوم بیش‌تر از خاک اول است.

(۳) گستردگی توزیع اندازه ذرات خاک اول بیش‌تر از خاک دوم است.

(۴) یکنواختی توزیع اندازه ذرات خاک دوم بیش‌تر از خاک اول است.

- ۶۵- پایایی یا استواری خاک در حالت خشک چه کاربردی دارد؟

(۱) استعداد خاک برای تورم و چروکیدگی در مقابل اعمال نیرو

(۲) استعداد خاک برای فشردگی در مقابل اعمال نیرو

(۳) آسیب‌پذیری خاک در مقابل فرسایش بادی

(۴) مطلوب بودن یا نبودن خاک برای شخم یا خاک‌ورزی

- ۶۶- کاربرد حدود آتریوگ، برای تعیین کدام مورد در خاک است؟

(۱) رطوبت حداقل تورم خاک

(۲) رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی خاک

(۳) محدوده رطوبت پروکتور خاک

(۴) محدوده رطوبت کارپذیری یا شخم‌پذیری خاک

- ۶۷- با افزایش پتانسیل ماتربیک خاک، کدام ویژگی آن افزایش می‌یابد؟

(۱) سرعت نفوذ آب به خاک

(۲) ضریب هوایگذری

(۳) هدایت حرارتی

(۴) هدایت هیدرولیکی اشباع

- ۶۸- با فرض کروی بودن ذرات خاک، اگر قطر ذرات خاک نصف شود، سطح ویژه خاک چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) چهار برابر می‌شود.

(۲) دو برابر می‌شود.

(۳) نصف می‌شود.

- ۶۹- اگر در تمام نقاط یک ستون عمودی خاک پتانسیل ماتربیک برابر با  $30\text{-سانتی‌متر}^3$  رطوبت خاک برابر با

$\frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^3}$  باشد، علت و جهت جریان آب به ترتیب کدام است؟

(۱) گرادیان پتانسیل ثقلی - بالا به پایین


(۲) گرادیان پتانسیل فشاری - بالا به پایین

(۳) تحت شرایط فوق جریانی اتفاق نمی‌افتد.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- ۷۰- شدت جریان آب در ناحیه انتقالی در حین نفوذ آب در خاک برابر با کدام است؟
- (۱) سرعت نفوذ پایه  
(۲) شدت جریان در شروع نفوذ  
(۳) هدایت هیدرولیکی اشباع  
(۴) هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع
- ۷۱- کدام گزینه درست است؟
- (۱) هدایت هیدرولیکی غیراشباع تابعی از مقدار رطوبت در خاک است.  
(۲) هدایت هیدرولیکی غیراشباع در یک خاک مشخص مقدار ثابت است.  
(۳) در خاک‌های غیراشباع پیچیدگی بررسی جریان آب در خاک کمتر است.  
(۴) سرعت جریان اشباع در خاک به دلیل زیاد بودن پیچ خوردگی مسیر کمتر از جریان غیراشباع است.
- ۷۲- در شکل رو به رو، یک سیستم در حال تعادل اشباع نشان داده شده است، مقدار پتانسیل فشاری در نقطه B چند سانتی‌متر است؟
- (۱) ۲۰ (۲) -۲۰ (۳) ۲۵ (۴) -۲۵
- 
- ۷۳- اگر سطح ایستایی در پروفیل خاکی همان سطح مبنا پتانسیل ثقلی فرض شود و در عمق ۲۰ سانتی‌متری سطح خاک در حالت تعادل قرار گرفته باشد، در حالت تعادل پتانسیل هیدرولیکی نقطه A که در عمق ۱۰ سانتی‌متری سطح خاک قرار دارد، چند سانتی‌متر است؟
- (۱) صفر (۲) ۱۰ (۳) ۲۰ (۴) ۳۰
- ۷۴- برای این‌که باغچه‌ای به عمق ۴۰ سانتی‌متر، طول و عرض ۵ متر را با یک خاک به‌گونه‌ای پر کنیم که چگالی ظاهری آن  $1/5$  تن بر مترمکعب شود، چند کیلوگرم خاک نیاز است؟
- (۱) ۱۵۰۰ (۲) ۱۵۰۰۰ (۳) ۳۰۰۰ (۴) ۳۰۰۰۰
- ۷۵- در مزرعه‌ای به وسعت نیم هکتار اگر بخواهیم تا عمق ۲۰ سانتی‌متری دمای خاک از ۶ به ۱۰ درجه سانتی گراد برسد، چند مگاژول انرژی گرمایی لازم است؟ (گرمای ویژه حجمی خاک ( $C_v$ ) برابر ۳ مگاژول بر مترمکعب بر درجه سانتی گراد است.)
- (۱) ۲۴۰۰۰ (۲) ۲۴۰۰ (۳) ۱۲۰۰۰ (۴) ۱۲۰۰
- ۷۶- در سلسه‌های تشکیل خاک‌دانه‌ها، خوشی یا کلاستر از اتصال کدام مورد حاصل می‌شود؟
- (۱) خاک‌دانه‌های درشت  
(۲) خاک‌دانه‌های درشت و ریز  
(۳) ذرات رس  
(۴) دومین‌ها
- ۷۷- مکش ورود هوا در منحنی رطوبتی خاک در کدام بافت به‌وضوح قابل مشاهده است؟
- (۱) رسی (۲) شنی (۳) لوم رسی (۴) لوم رسی سیلتی

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- ۷۸ - شکل مدل بروکس - کوری در دو خاک A و B به ترتیب  $S_e = \left(\frac{\Psi}{15}\right)^{-c/5}$  و  $S_e = \left(\frac{\Psi}{50}\right)^{-c/25}$  است. با توجه به این مدل ها گزینه درست کدام است؟

(۱) با توجه به معادلات، ساختمان خاک قابل پیش‌بینی نیست.

(۲) خاک A یک خاک ریزبافت و خاک B یک خاک درشت بافت است.

(۳) خاک A دارای ساختمان مناسب و خاک B یک خاک متراکم است.

(۴) مکش ورود هوا در خاک B بزرگ‌تر از خاک A است.

- ۷۹ - در صورت افزایش درصد رس در خاک، کدام گزینه درست است؟

(۱) تأثیری بر مقدار رطوبت بهینه برای خاک ورزی ندارد.

(۲) دامنه‌ای از رطوبت که در آن خاک رفتار پلاستیک دارد، افزایش می‌یابد.

(۳) حد سیلان (Liquid Limit) افزایش اما حد پلاستیک (Plastic Limit) کاهش می‌یابد.

(۴) حد پلاستیک (Plastic Limit) با شدت بیش‌تری نسبت به حد سیلان (Liquid Limit) افزایش خواهد یافت.

- ۸۰ - اگر جرم مخصوص ظاهری خشک توده خاکی به حجم  $1000 \text{ cm}^3$  برابر با  $1/5 \text{ g cm}^{-3}$  باشد و با افزودن آب به آن

رطوبت خاک  $1/2 \text{ gg}^{-1}$  باشد، جرم خاک مرطوب چند کیلوگرم است؟

(۱) ۲

(۲) ۱/۸

(۳) ۳

(۴) ۱/۵

## بیولوژی و بیونکنولوژی خاک:

- ۸۱ - ۱۰ mmol گوگرد (غلظت در حدود  $k_m$ ) در اختیار باکتری اکسیدکننده گوگرد قرار داده می‌شود و در مدت ۲ ساعت نصف آن اکسید می‌شود. ثابت سرعت واکنش آنزیمی در این فرایند چقدر است؟

(۱) ۰/۲۳۱      (۲) ۰/۳۴۶      (۳) ۰/۶۹۳      (۴) ۱/۳۸۶

- ۸۲ - کدام ترکیب آلی در مقابل تجزیه میکروبی مقاومت بیش‌تری دارد؟

(۱) اسید آمینه      (۲) همی سلولز      (۳) گلوكز      (۴) سلولز

- ۸۳ - قند موردنیاز در محیط کشت ریزوپیوم‌ها (YEMA)، کدام است؟



(۱) آرابینوز      (۲) ساکاروز      (۳) گلوكز      (۴) مانیتول

- ۸۴ - مهم‌ترین جزء دیواره سلولی باکتری‌ها که عامل استحکام آن به حساب می‌آید، کدام است؟

(۱) غشاء خارجی      (۲) لایه لیپوپلی ساکارید      (۳) لایه پیتیدو گلیکان

(۴) لایه لیپوپروٹئین

- ۸۵ - کدام واکنش توسط آنزیم نیتروزناز انجام می‌شود؟



# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

-۸۶- فلاونوپیدهای رها شده از ریشه لگوم‌ها چه کارکردی دارند؟

- (۱) سبب کاهش غلظت اکسیژن در پیرامون ریشه گیاه لگوم می‌شود.
- (۲) سبب کاهش پتانسیل رداکس در گره‌های ریشه می‌شوند.
- (۳) سبب بیان شدن ژن گره‌زایی ریزوپیوم‌ها می‌شوند.
- (۴) سبب شناسایی ریزوپیوم هم‌زیست گیاه لگوم می‌شود.

-۸۷- هر چه مقاومت ماده آلی در برابر تجزیه بیشتر باشد، مقدار نیتروژن متوقف شده ..... می‌شود و هر چه درصد کربن هاده آلی تجزیه‌پذیر بیشتر باشد، مقدار نیتروژن متوقف شده ..... می‌شود.

- (۱) بیشتر - کمتر
- (۲) بیشتر - بیشتر
- (۳) کمتر - بیشتر

-۸۸- نمودار تغییرات دنیتریفیکاسیون زیستی در دمای بین صفر تا  $15^{\circ}\text{C}$  و بالاتر از  $15^{\circ}\text{C}$  به ترتیب کدام است؟

- (۱) خطی - خطی
- (۲) خطی - نمایی
- (۳) نمایی - نمایی
- (۴) نمایی - خطی

-۸۹- راندمان سوخت‌وساز و نسبت  $\frac{C}{N}$  در ریز جانداران تجزیه‌کننده مواد آلی به ترتیب  $40$  و  $10$  درصد است. مواد آلی

چه نسبتی از  $\frac{C}{N}$  داشته باشند تا نیازهای نیتروژنی ریز جانداران تأمین شود؟

- (۱) ۱۵
- (۲) ۲۰
- (۳) ۲۵
- (۴) ۴۰

-۹۰- در مرحله برقراری هم‌زیستی ریزوپیوم - لگوم، واژه اندوسیتوز به کدام معنا است؟

- (۱) احاطه شدن باکتری‌های ریزوپیومی در حال تکثیر با دیوارهای از جنس دیواره سلولی گیاه و تشکیل رشته آводگی
- (۲) احاطه شدن باکتری‌های ریزوپیومی با غشاء پری باکتروئیدی پس از آزاد شدن باکتری‌ها از رشته آводگی
- (۳) اشغال فضای سمبیوز با ماده قرمز رنگ از نوع هموگلوبین به منظور کنترل فشار اکسیژن
- (۴) تکثیر هسته سلول‌های کورنکس از طریق میتوز و تشکیل سلول‌های تترالپلولوئیدی

-۹۱- هنگام تجزیه زیستی کامل نشاسته در تنفس هوایی، عدد اکسیداسیون کربن چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) از صفر به دو مثبت می‌رسد.
- (۲) از صفر به چهار مثبت می‌رسد.
- (۳) از منهای چهار به دو مثبت می‌رسد.
- (۴) از منهای چهار به چهار مثبت می‌رسد.

-۹۲- کدام باکتری در ثبت کربن و نیتروژن نقش دارد؟

- (۱) از توباکتر
- (۲) آنابنا
- (۳) ریزوپیوم
- (۴) کلبسیلا

-۹۳- در مشاهدات میکروسکوپی، باکتری به فرم Cyst و Gram<sup>+</sup> و Gram<sup>-</sup> و filamentous. به ترتیب از شاخصه کدام باکتری‌ها است؟

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Actinobacteria - Pseudomonas (۲) | Actinobacteria - Azotobacter (۱) |
| Bacillus - Rhizobium (۴)         | Bacillus - Azospirillum (۳)      |

-۹۴- کدام باکتری دارای فضای پری‌پلاسمی کوچک‌تر است؟

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| (۱) انتروباکتر | (۲) آزوسپیریلوم |
| (۳) باسیلوس    | (۴) سودوموناس   |

-۹۵- وظیفه آنزیم هیدروژناز در ثبت هم‌زیستی نیتروژن کدام است؟


- |                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| (۱) احیاء نیتروژن | (۲) باز چرخه هیدروژن                 |
| (۳) مصرف ATP      | (۴) هیدرولیز $\text{NH}_4^+$ مولکولی |

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

۹۶- در صورت عدم محدودیت نیترات و آمونیوم در خاک، کدامیک از نمودارها، درست است؟ (تغییرات رطوبت خاک از خشک تا اشباع)



۹۷- کدام مورد، نتیجه افزایش نسبت جمعیت قارچ به باکتری در خاک است؟

- (۱) تجمع کیتین      (۲) تجمع پکتین      (۳) تجمع لیگنین      (۴) تجمع پکتین

۹۸- در باکتری کمولیتوتروف تیوباسیلوس که فتوسیستم II وجود ندارد، الکترون لازم برای احیای  $\text{CO}_2$  از کجا تأمین می شود؟

- (۱) اکسیژن مولکولی      (۲) کربن آلی      (۳)  $\text{H}_2\text{O}$       (۴)  $\text{S}^\circ$

۹۹- کدام یون بیشترین اثر بازدارنده بر فعالیت کرم‌های خاکی دارد؟

- (۱) آمونیوم      (۲) سولفات      (۳) فسفات      (۴) نیترات

۱۰۰- در فرایند تثبیت بیولوژیک نیتروژن، حضور نیترات چگونه سرعت تثبیت را کاهش می‌دهد؟

- (۱) افزایش پتانسیل ریداکس      (۲) انحراف مسیر الکtron از  $\text{N}_2$  به  $\text{NO}_3^-$       (۳) اثر بازدارنده بر آنزیم نیتروزناز

- (۴) تبدیل  $\text{NO}_3^-$  به  $\text{NH}_4^+$

۱۰۱- تنفس نیتراتی غالباً توسط کدام باکتری انجام می‌شود؟

- (۱) هوازی اجباری      (۲) بی‌هوازی اجباری      (۳) هوازی و بی‌هوازی اجباری

- (۴) هوازی و بی‌هوازی اختیاری

۱۰۲- در واکنش تثبیت نیتروژن توسط باکتری‌های دی آزوتروف، در صورت کند بودن شدت جریان الکtron و یا کافی تبودن ATP، محصول غالب کدام است؟

- (۱)  $\text{NH}_3$       (۲)  $\text{H}_2$       (۳)  $\text{Pi}$       (۴)  $\text{ADP}$

۱۰۳- شبیه فازهای لگاریتمی و مرگ، در منحنی رشد باکتری‌ها در محیط مایع حاوی سلولز به عنوان تنها منبع کربن، به ترتیب به کدام حالت ظاهر می‌شود؟

- (۱) تند - تند      (۲) تند - کند      (۳) کند - تند      (۴) کند - کند

۱۰۴- اکثر باکتری‌های آبزی و خاکزی به ترتیب در کدام محدوده دمایی و فشار اسمزی (ضریب فعالیت آب) زندگی می‌کنند؟

- (۱) محدوده سایکروفیلی - ۵٪ الی ۷۷٪      (۲) محدوده ترموفیلی - ۶٪ الی ۹۹٪

- (۳) محدوده مزوفیلی - ۵٪ الی ۷۷٪      (۴) محدوده مزوفیلی - ۶٪ الی ۹۹٪

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- ۱۰۵ - کدام گزینه درمورد میکرووارگانیسم‌های اوکسوتروف (Auxotroph) صدق می‌کند؟
- ۱) نیازمند به فاکتور انرژی کمکی
  - ۲) عدم نیاز به فاکتور انرژی کمکی
  - ۳) نیازمند به فاکتور رشد
  - ۴) عدم نیاز به فاکتور رشد

پیدا بیش و رده‌بندی خاک و ارزیابی اراضی:

- ۱۰۶ - در تشکیل خاک «Argidurid» کدام فاکتور خاک‌سازی، از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
- Relief (۴) Parent material (۳) Organism (۲) Climate (۱)

- ۱۰۷ - کدام ویژگی برای کاربری کلی کشت دیم محدودیت ایجاد می‌کند؟

- ۱) عمق آب زیرزمینی غیرشور بیش از ۲ متر، در طول سیکل رشد
- ۲) عمق آب زیرزمینی غیرشور کمتر از ۷۵ سانتی‌متر، در طول سیکل رشد
- ۳) عمق آب زیرزمینی غیرشور بین ۷۵ و ۱۲۰ سانتی‌متر، در طول سیکل رشد
- ۴) عمق آب زیرزمینی غیرشور بین ۱۲۰ سانتی‌متر و ۲ متر، در طول سیکل رشد

- ۱۰۸ - تشکیل کدام راسته، عمدتاً متأثر از اقلیم است؟

- ۱) مالی سولز ۲) آلفی سولز ۳) ژلی سولز ۴) ورتی سولز

- ۱۰۹ - خاکی با رژیم رطوبتی Aridic، افق‌های سطحی Ochric و Argillic در داخل ۱۰۰cm در کدام زیر رده قرار می‌گیرد؟

- Durids (۴) Calcids (۳) Cambids (۲) Argids (۱)

- ۱۱۰ - در شرایط گرم و مرطوب، احتمال وجود کدام کانی رسی در خاک بیشتر است؟

- ۱) ورمیکولیت ۲) کاتولینیت ۳) مونت موریلینیت ۴) میکا (ایلیت)

- ۱۱۱ - کدام مورد درباره خاک‌های «Aridisols» نادرست است؟

- ۱) اشباع بازی پایین
- ۲) آهک متوسط تا زیاد
- ۳) رنگ روشن
- ۴) ساختمان ضعیف

- ۱۱۲ - خاکی در رژیم رطوبتی زریک با افق سالیک در ۷۵ سانتی‌متری از سطح خاک و یک افق سولفوریک بلافضله در زیر آن قرار دارد. این خاک در بیشتر سال‌ها به مدت یک ماه در عمق ۱ متری از آب، اشباع است. رده‌بندی صحیح آن کدام است؟

- Salids (۴) Cambids (۳) Aquepts (۲) Aquents (۱)

- ۱۱۳ - در مورد نسبت  $\frac{Al}{Si}$  در آلوفان‌ها، کدام گزینه درست است؟

- ۱) بیش از ۵ ۲) بین ۲ تا ۳ ۳) بین ۱ تا ۲ ۴) کمتر از ۱

- ۱۱۴ - ظرفیت تبادل کاتیونی در یک خاک با ۱۸ سانتی‌مول بار بر کیلوگرم است، رس غالب در آن کدام است؟
- ۱) اسماکتایت ۲) ایلات ۳) کاتولینیت ۴) ورمیکولایت

- ۱۱۵ - حداقل میزان کانی‌های قابل هودیدگی را در کدام تحت رده پیش‌بینی می‌کنید؟ (مواد مادری خاک‌ها را مشابه فرض کنید).

- Orthents (۴) Udlts (۳) Xerepts (۲) Cryalfs (۱)

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فتاوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

۱۱۶ - کدام گزینه، معرف رگولیت است؟

- ۲) مجموعه سنگ بستر و مواد ناپیوسته سطحی  
۴) مجموع مواد ناپیوسته خاک و ساپرولیت

- ۱) مجموع سولوم خاک و افق C  
۳) مجموع سولوم و سکوم خاک

۱۱۷ - کدام گزینه جزو ویژگی‌های افق سومبریک است؟

- ۱) یک افق A مذفون شده است.  
۲) افق تجمعی ماده آلی در سطح خاک است.  
۳) در مناطق حاره و نیمه حاره در ارتفاعات سرد و مرطوب تشکیل می‌شود.  
۴) در مناطق خشک و نیمه خشک یافت می‌شود و از مواد مادری به ارث می‌رسد.

۱۱۸ - «Lixivation» به کدام فرایند گفته می‌شود؟

- ۲) خروج آهن از ساختار کانی‌های آلی  
۴) تجمع املاح در سطح خاک

- ۱) حرکت املاح به بیرون از پروفیل خاک  
۳) حرکت املاح در خاک

۱۱۹ - در یک منطقه بهتر ترتیب با رژیمهای رطوبتی و حرارتی Aridic و Thermic خاکی با ایپ پدون Ochric و افق‌های تحت‌الارضی Argillic و Salic با مرز بالایی در داخل ۱۰۰ cm از سطح خاک مطالعه شده، رده‌بندی این خاک در سطح زبرده کدام است؟

Salid (۴)

Orthent (۳)

Cambid (۲)

Argid (۱)

۱۲۰ - خاکی با افق سطحی «Ochric» واقع در رژیم رطوبتی «Aridic» و حرارتی «Mesic» فاقد افق نکامل قرار گرفته روی رسوبات رودخانه‌ای، نام این خاک تا حد گرده بزرگ کدام است؟

Torriorthens (۲)

Aquifluvents (۱)

Torripsamments (۴)

Torrifluvents (۳)

۱۲۱ - وجود مقادیر زیاد کاتولینیت و اکسیدهای آهن و آلومینیم و همچنین ظرفیت تبادل کاتیونی پایین خاک‌ها را در کدام مجموعه از تحت‌رده‌های خاک انتظار دارید؟

Ustepts – Uadults (۲)

Cryolls – Udoxs (۱)

Udox – Uadults (۴)

Uadults – Xerolls (۳)

۱۲۲ - ساختمان خاک خوب و ظرفیت تبادل کاتیونی بالا از مشخصات کدام تحت‌رده است؟

Xerepts (۴)

Uadults (۳)

Udalfs (۲)

Udolls (۱)

۱۲۳ - در خاک‌های «Turbels» و «Xeralfs» کدام گروه از فرایندهای خاک‌سازی بهتر ترتیب غالب است؟

Bioturbation , Illuviation (۲)

Cryoturbation , Leaching (۱)

Cryoturbation , Eluviation (۴)

Argiturbation , Eluviation (۳)

۱۲۴ - به کدام دلیل، اکسیداسیون آهن موجود در کانی‌ها، موجب فروپاشی کانی‌ها می‌شود؟

۱) افزایش حجم ناشی از اکسیداسیون  
۲) برهم خوردن تعادل بار الکتریکی در درون کانی

۳) خروج آهن از ساختمان کانی

۴) عدم احیاء مجدد آهن

۱۲۵ - برای تعیین خاصیت اندیک در خاک، کدام شکل آهن موجود در خاک باید مدنظر قرار گیرد؟

۲) آهن کل

۱) آهن آزاد

۴) آهن کمپلکس شده با هوموس

۳) آهن بی‌شکل

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۷

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

- ۱۲۶ - مفهوم سولودی شدن (Solodization)، معادل کدام گزینه است؟
- ۱) افزایش سدیم تبادل خاک  
۲) اسیدی شدن خاک  
۳) آبشویی سدیم از افق ناتریک  
۴) تغییر ساختمان عمقی خاک
- ۱۲۷ - کدام ترکیب، نشان‌دهنده درجه اهمیت خیلی زیاد یک کیفیت اراضی است؟
- ۱) اثر کیفیت شدید، پراکنش آن در منطقه زیاد و دسترسی به اطلاعات وجود دارد.  
۲) اثر کیفیت شدید، پراکنش آن در منطقه کم و دسترسی به اطلاعات وجود دارد.  
۳) اثر کیفیت متوسط، پراکنش آن در منطقه متوسط و دسترسی به اطلاعات وجود دارد.  
۴) اثر کیفیت متوسط، پراکنش آن در منطقه زیاد و محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد.
- ۱۲۸ - در سیستم طبقه‌بندی قابلیت اراضی به روش آمریکایی، واحد خاک به کدام مورد اطلاق می‌شود؟
- ۱) زمین‌هایی که دارای محدودیت اقلیمی مشابه هستند.  
۲) زمین‌هایی که در یک کلاس قرار دارند و دارای محدودیت‌های مشابه هستند.  
۳) زمین‌هایی که در یک زیرکلاس قرار دارند و دارای باروری پتانسیل یکسان هستند.  
۴) زمین‌هایی که دارای محدودیت مشابه در منطقه ریشه‌دهی و باروری پتانسیل یکسان هستند.
- ۱۲۹ - خاکی با افق‌های سطحی «Ochric»، تحت‌الارضی «Gypsic» و «Calcic» با مرز در داخل ۱۰۰cm از سطح خاک و رژیم‌های رطوبتی و حرارتی Aridic و Cryic در کدام مورد صدق می‌کند؟
- ۱) Cryids (۱)  
۲) Clacids (۲)  
۳) Cambids (۳)  
۴) Gypsids (۴)
- ۱۳۰ - در یک منطقه، مرتفع‌ترین نقطه ۱۳۵۴m و پست‌ترین نقطه آن ۱۳۴۷m است. که در روی نقشه با مقیاس ۱:۱۰۰۰ از هم‌دیگر با فاصله ۹ سانتی‌متری قرار گرفته‌اند. در این منطقه شبیه چند درصد است؟
- ۱) ۰٪/۰۷۷  
۲) ۰٪/۷۷  
۳) ۷٪/۷۷  
۴) ۷٪/۷۷
- فرساش و حفاظت خاک:
- ۱۳۱ - کدام گزینه، از پیامدهای فرسایش زمین‌شناسی نیست؟
- ۱) افزایش شوری آب دریاها  
۲) تغییر نیم‌رخ طولی رودخانه  
۳) تخریب اراضی کشاورزی  
۴) تسطیح عمومی زمین
- ۱۳۲ - انسان با تغییر کدام عامل، بیشترین تأثیر را در ایجاد فرسایش تشیدی داشته است؟
- ۱) بهم‌خوردگی خاک  
۲) پوشش گیاهی  
۳) تغییر نیروی فرساینده  
۴) تغییر توپوگرافی
- ۱۳۳ - کدام گزینه، اثر برون منطقه‌ای (off – site) فرسایش خاک است؟
- ۱) تغییر بافت خاک  
۲) کاهش عمق خاک  
۳) کاهش حاصلخیزی  
۴) یوتربیکاپسیون با غنی‌شدگی
- ۱۳۴ - از بین رفتن لایه سطحی خاک در اثر فرسایش، اثر کم‌تری در تغییر میزان کدام عنصر دارد؟
- ۱) پتانسیم  
۲) فسفر  
۳) کربن  
۴) نیتروژن

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

۱۳۵- اگر سرعت تشکیل خاک در منطقه‌ای  $1/0$  میلی‌متر در سال باشد، مقدار فرسایش مجاز، چند تن در هکتار در سال

$$\left( BD = 1/35 \frac{g}{cm^3}, PD = 2/65 \frac{g}{cm^3} \right)$$

خواهد بود؟ (۱)  $0/265$  (۲)  $0/265$

(۳)  $0/125$  (۴)  $1/35$

۱۳۶- قدیمی ترین روش تعیین اندازه قطرات باران در مطالعات فرسایش پاشمان، کدام روش است؟

(۱) استفاده از روغن (۲) روش آرد

(۳) روش رادیویی (۴) کاغذهای جاذب الرطوبه

۱۳۷- با افزایش شدت بارندگی تا  $75$  میلی‌متر در ساعت، میانگین اندازه قطرات..... و در شدت‌های بالاتر..... می‌یابد.

(۱) افزایش - افزایش (۲) کاهش - کاهش

(۳) ثابت - افزایش (۴) کاهش - افزایش

۱۳۸- به کدام دلیل، معادله ویشمایر برای تخمین انرژی جنبش باران در مناطق حاره مناسب نیست؟

(۱) تفاوت در شدت بارندگی آن مناطق با مناطق معتدل

(۲) تفاوت در مقدار بارندگی آن مناطق با مناطق معتدل

(۳) تفاوت در پوشش گیاهی آن مناطق با مناطق معتدل

(۴) تفاوت در نوع خاک آن مناطق با مناطق معتدل

۱۳۹- اگر فرسایش سالانه در یک زیرحوضه  $2000$  مترمکعب در سال و جرم مخصوص ظاهری خاک  $1/4$  گرم بر

سانتی‌متر مکعب نسبت تحويل رسوب حوضه  $4/0$  باشد، رسوب خارج شده از حوضه چند تن در سال خواهد بود؟

(۱)  $820$

(۲)  $1120$

(۳)  $5000$

(۴)  $7000$

۱۴۰- در بارندگی با خصوصیات جدول زیر، مقدار  $1 > KE$  چند  $Jule/m^2$  است؟

مقدار باران (mm)				
شدت بارندگی (mm/h)				
انرژی جنبشی واحد ( $Jule/m^2 \cdot mm$ )				
۳	۶	۱۵	۱	
۱۵	۳۹	۷۶	۱۰	
۲۲	۲۶	۲۸	۲۰	

(۱)  $54$

(۲)  $96$

(۳)  $576$

(۴)  $662$

۱۴۱- زبری سطحی در حدود چه ارتفاعی (بر حسب سانتی‌متر) بیش‌ترین اثر را در کاهش فرسایش بادی دارد؟

(۱)  $2-1$  (۲)  $30-20$  (۳)  $10-5$  (۴)  $100-50$

۱۴۲- چند درصد انرژی قطرات و چند درصد انرژی جريان آب، به ترتيب صرف فرسایش خاک می‌شود؟

(۱)  $4-3, 0/2$  (۲)  $4-3, 2$

(۳)  $2, 4-3$  (۴)  $0/2, 4-3$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

۱۴۳- در حوضه آبخیز سدی به مساحت ۲۰ هزار هکتار، مقدار فرسایش سالانه، ۲۰ تن در هکتار در سال است، اگر در طول ۴۰ سال عمر مفید سد با حجم اولیه ۲۰ میلیون مترمکعب به نصف کاهش یابد، ضریب تحويل رسوب حوضه کدام است؟ (چگالی رسوب داخل سد ۱/۲ گرم بر سانتی متر مکعب)

- (۱) ۰/۲۵
- (۲) ۰/۴
- (۳) ۰/۵
- (۴) ۰/۷۵

۱۴۴- فاکتور C در کدام شرایط بیشتر است؟

- (۱) جنگل طبیعی دست نخورده
- (۲) کشت یونجه
- (۳) کشت ذرت
- (۴) مراع طبیعی کم متراکم

۱۴۵- زمان اوج شدت رواناب و حداکثر غلظت رسوب در خروجی یک حوضه آبخیز نسبت به هم چگونه رخ می‌دهد؟

(۱) زمان اوج غلظت رسوب و رواناب برهم منطبق هستند.

(۲) زمان اوج غلظت رسوب دیرتر از زمان اوج حداکثر رواناب رخ می‌دهد.

(۳) زمان اوج غلظت رسوب زودتر از زمان اوج حداکثر رواناب رخ می‌دهد.

(۴) زمان اوج رواناب و حداکثر غلظت رسوب به طور تصادفی جایه‌جا می‌شوند.

۱۴۶- اگر مقدار فرسایش فعلی مزرعه‌ای ۳ برابر فرسایش قابل قبول باشد و بخواهیم تنها با تغییر C و P فرسایش را کاهش دهیم، کدام گزینه در تغییرات C و P نمی‌تواند فرسایش را به حد قابل قبول کاهش دهد؟

- (۱) مقدار P ثابت و مقدار C  $\frac{1}{3}$  شود.
- (۲) مقدار P, C هر دو  $\frac{2}{3}$  شود.
- (۳) مقدار C  $\frac{2}{3}$  و مقدار P نصف شود.
- (۴) مقدار C ثابت و مقدار P  $\frac{1}{3}$  شود.

۱۴۷- اطلاع از کدام ویژگی خاک برای برآورد عامل فرسایش پذیری خاک (K) در مدل USLE ضروری نیست؟

- (۱) اندازه و شکل ساختمان خاک
- (۲) توزیع اندازه ذرات خاک
- (۳) چگالی ظاهری خاک
- (۴) سرعت نفوذ آب به خاک

۱۴۸- کدام مورد برای کاهش مقدار عامل عملیات حفاظت خاک (P) در مدل USLE مؤثر نیست؟

- (۱) تناوب زراعی
- (۲) تراس بندی
- (۳) کشت نواری
- (۴) کشت روی خطوط تراز

۱۴۹- در عملیات حفاظت خاک، کدام عامل مؤثر در فرسایش خاک باید در اولویت قرار گیرد؟

- (۱) پوشش گیاهی
- (۲) ساختمان خاک
- (۳) طول شیب
- (۴) نفوذ پذیری

۱۵۰- دیواره سازی یا احداث حائل برای مبارزه با کدام نوع فرسایش کارائی کمتری دارد؟

- (۱) کناری رودخانه‌ای
- (۲) تونلی
- (۳) واپریزهای
- (۴) زمین لغزش

۱۵۱- اپی (EPi) یکی از روش‌های کنترل کدام نوع فرسایش است؟

- (۱) خندقی
- (۲) شیاری
- (۳) کنار رودخانه‌ای
- (۴) زمین لغزش

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک (کد ۱۴۰۸) ۳۱۹F

صفحه ۲۰

۱۵۲ - اثر بادشکن نفوذپذیری در میزان کاهش سرعت باد ..... از باد شکن متراکم (غیر قابل نفوذ) و طول محافظتی آن است.

(۱) بیشتر - بیشتر  
(۲) بیشتر - کمتر

(۳) کمتر - کمتر  
(۴) کمتر - بیشتر

۱۵۳ - کدام عامل به طور نسبی اثر بیشتری بر میزان فرسایش بادی دارد؟

(۱) بافت خاک  
(۲) رطوبت خاک

(۳) شکل ذرات  
(۴) ماده آلی

۱۵۴ - در فرسایش بادی کدام اندازه ذره خاک به طور تقریبی بهترین مرز ذرات فرسایشپذیر و غیر فرسایشپذیر به حساب می آید؟ (بر حسب میلی متر)

(۱) ۰/۸۴  
(۲) ۰/۴۶

(۳) ۱  
(۴) ۲

۱۵۵ - سرعت آستانه فرسایش بادی در یک منطقه به کدام عامل بستگی ندارد؟

(۱) پوشش گیاهی منطقه

(۲) سرعت باد غالب منطقه  
(۳) محتوای رطوبتی خاک منطقه